

**ALBERTI HALLER ...
ITER HELVETICUM ANNI
1739 ET ITER
HERCYNICUM ANNI
1738**

Albrecht : von Haller

2.4.

ALBERTI HALLER.
M. & Ph. D.
ARCHIATRI REG. ET ELECTOR.
MED. ANAT. BOTAN. ET CHIR.
IN ACAD. GEORG. AUG.
P. P. O.
SOC. REG. ANGL. ET SUEC. SOD.
ITER HELVETICVM
ANNI MDCCXXXVIII.
ET
ITER HERCYNICVM
ANNI MDCCXXXVIII.



GOTTINGÆ
SVMTV REG. VNIVERS. OFFIC. LIBRARIÆ.
1740.

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.

THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.



THE
OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
NAVY
WASHINGTON, D. C.

VIRO
GRAVISSIMO SAPIENTISSIMO
AVGVSTO JOHANNI
de HVGO.

ARCHIATRO REGIO ET ELECTORALI
SOC. REG. LOND. SOCIO

S. P. D.

ALBERTVS HALLER.

ALBERTUS HALLAN

AVGUSTO JOURNAL

1870

ALBERTUS HALLAN

ALBERTUS HALLAN

ALBERTUS HALLAN

Quantis me beneficiis adfeceris VIR
ILLVSTRIS, neque modestia Tua
permittit ut enumerem, neque
destinata hujus adloquii brevitās. Id
unum excito, quod cum hac mea
opera propius conjungitur, Te nempe
thesauros Tuos Botanicos uberri-
mos omnes mecum communicasse,
rarissimas demum & desideratas stirpes
quam plurimas donasse, & cum stir-
pibus pulcherrimorum librorum fecis-
se participem, quibus instructior & hanc
dissertationem, & majores meos labo-

res felicius perficere potui. Quem
ergo multis adjuvisti modis, eum li-
bellum comis accipe, & homini fave,
qui Tuas virtutes gnarus veneratur.
Ex Georgia Augusta die 31. Octo-
bris 1739.

LECTV.

LECTVRIS S.

Tota aestate anni 1739. abfui, neque ullo munerum meorum defunctus, non mediocriter adfectus sum, quod Academia, cui totum me debeo, nihil omnino præstitissem officii.

Supererat, ut aliquam temporis, quod perierat, rationem redderem. Id hoc libello feci, quo ea continentur, quæ in itinere meo præcipua observavi, plantæ nempe in Alpibus, in Jura monte, & in Emmia valle collectæ, quarum aliquæ novæ sunt, aliæ neque novæ neque obscuræ, sed pulchræ tamen & rariores inventu.

Libelli exiguitas minus decora visa est Bibliopolæ. Ergo addidit alterius itineris descriptionem.

ptionem, quod anno 1738. in Bruſterum. M.
ſuſceperam, ſimilis argumenti, etiam ideo ido-
neum nupero itineri ſocium, quod ex utrius-
que collatione floram Helveticam cum Hercy-
nica utcunque comparare liceat.

Superſunt multa hujus generis itinera, ſed
ea maturiores curas exſpectabunt. Dabam in
Georgia Auguſta die 31. Octobr. 1739.



§. I.



quando eo vere, quod proximé elapsum est, ad patriam urbem iter feci, nondum adultum ver erat, & nimbosa hyems plantas, etiamsi floruisse, legi vetabar. *Bernae* me alia, & quæ mihi quidem majori momenti essent, detinuerunt. Non potui, tamen ferre aspectum eorum montium, qui patriam urbem coronant, absque dulci desiderio stirpium, quas in iis toties, innocentissima voluptate perlusus, junior legeram. Eripui me quantum licuit, urbanioribus negotiis, & quam primum humiliores montes nix deseruit, ad eos raptim iter feci. Ergo colles illos, si cum alpinis conferras, ipsis *Juræ* culminibus humiliores, qui ultimam *Emmiam* vallem a *Lucernensium* ditione separant, nondum visos, & ipsa novitate gratiosos, adii die IX. Junij: comite amico optimo, & amantissimo bonarum literarum *Niccolao Emanuel Gatschet*, ad cuius avita & laxissima pascua, præcipuum iter nostrum fuit.

§. II.

Circâ Bernam passim sylvas abiegnas præterivimus, muscolasque atque cavas semitas; amatas muscorum sedes,
A hy-

hybernos olim labores , nunc steriles , & aestivo sole ex-
ultas. Neque montosa illa regio , quam communi no-
mine *Wislen* vocant, plantarum quidem feracitate se com-
mendavit, animum vero mirifice recreavit dulci imagine
felicitatis, quae a libertate nascitur. Latifundia cultissima
omnes eos colles occupant, quos rustici homines, omni
stipendio, omni imperio (nisi legum) liberi, laeti, divi-
tes, & si hominibus ea fors potest contingere, felices ha-
bitant. Solitudines avias, & anfractus reductarum vallium,
perstrepunt purissimi rivi, frequentant armentorum opi-
mi greges, exhilarant sparsa tuguria, omni commeatu,
& rusticae vitae commodis ditissima.

§ III.

Poeticum plane iter hoc fuit, herbae enim vulgares
omnino erant, & ubique obviae. Trans eos colles *Emmani*,
auriferum fluvium superavimus. In ejus arenosis syrti-
bus, ad ipsum insulae caput, quod adfluentes aquas
primum excipit, solent accolae aurum arenis permistum
legere. Neque prius cum quaestu lavantur *Arolae* are-
nae, licet ubique aureis micis avariciam hominum invi-
tent, quam postquam *Emma* aquas suas immisit *Arolae*.
Sed & ipsa *Emma*, non ab ultimis fontibus auritera est,
debetque praecipuas divitias torrenti cui *Goldbach* no-
men est, de cujus uberrimo metallo fabulae potius
quam historiae passim narrantur. Id mirum videri po-
terit, plerosque Helvetiae fluvios aureas arenas miculas-
que vehere, aurea metalla tamen nullibi certa fide repe-
riri. Certe *Rhenus* ad ipsos Batavos, (a) ad Gallos *Rho-*
danus,

a) Novam aurifodinam in arenosis montibus Bataviae osten-
tabat olim *ORDINIUS FOLDERATIS* JOACHIMUS BESCHER. Et

danus b) ; glebulas aureas de fert, quas Helvetiae debent. In *Arola* ad *Aarnungen*, & in commitatu *Badensi*, ubi vadosae arenosaeque insulae frequentiore sunt (*bey der Stille*), non absque quaestu lavantur arenae ; & conflatas ex iis massas purissimi auri, percussos nummos videre, id apud nos non rarum est.

§. IV.

Parum laetus his divitiis, qui omne desiderium posueram in thesauris valde minus invidiosis, suavisissimis nempe plantulis, per vallem *Emmtiam*, ad ductum illabentis fluvioli *die grüne*, inter lactissima praedia, beatique mapalia hominum ultra sortem suam divitium, perveni ad sedem Praefecti *Sumtswald* ubi majores paulatim montes vallem constringere, & altius herbosa culmina erigere incipiunt. Omnes enim hujus tractus montes, absque rupium tristi horrore, absque praecipitium scopulorum metu, ex sola lactissima gleba, & confusis collium vertilium acervis congeruntur. Inter eos montes, est *M. ARNI*, satis apud vicinos celebris uberrimo lactis proventu & caeseorum immensam mole, antiquissima familiae *GATCHETIAE* possessio. Is itineris no-

A 2

stri

experimentum, si non sufficebat sumtibus, nobis tamen sufficit.

- b) Vide de ejus arenis crystallinis, gemmisque, quales omnino sunt arenae *Arolae*, cultissimum virum *REAUER Comment. Acad. Paris.* 1718. Crystalli moles immensae ad fontes *Arolae* nuper repertae sunt, & glebam 695. librarum ipse vidi omnium, quas vel voto mortales attigerunt, maximam. An similes ibi gemmarum, aurique venae, quarum minuta ramenta flumen avehit? de Rubineis certe verum est, & smaragdinis aliisque fluoribus *SEURICHEN Jt. IV. p. 341. 342.* Sed nihil in hisce spei est avaritiae nostrae, molles enim sunt & plebejae, neque supra crystallorum classem.

stri prima die terminus fuit, post quam per collis satis arduos, deinde per montosam planiciem, silentesque sylvas, jam solis abietibus umbrosas, per sesquihoram adscenderamus.

§. V.

Stirpium Alpinarum prima nos salutavit *Bellis media*, frequens in Helvetia c), etiam planiori, locis umbrosis, & in sylvarum uvidis recessibus. Ejus figuram adeo exquisitam dederat GERNERUS d), adeo conspicuam caractere suo, ut fere adulare liceat TOURNEFORTUM e), & multo quidem severius VAILLANTUM f), quod contra suas leges, pappiferam plantam immiscuerint stirpibus, quibus solida sunt, nudaque semina. Sed ingrati fuerit viros, qui tanta praestiterint, ideo culpae, quod non praestiterint omnia. Et ea quidem mente volo ut sciant lectores me scripsisse perpetuo, quoties ab his & ab aliis doctis viris dissensero, ut ignorationem aliquam, imo errorem, aut plusculos lapsus, nolim vel minimam partem demere earum laudum, quas grati ipsis decernimus, siue eos mors extra invidiae metum posuerit, siue nunc quoque laboribus suis de nobis bene mercantur. Nemo me certe, si recte me novi, melius cupit iis, per quos profecerit. Verum ad *Bellidem* nostram redeo. Non

c) Bernae in *Eymatten* supra stagnum. Circa *Augustam Rauracorum* &c.

d) In *compendio Mattbioli* CAMERARIANO p. 654.

e) *Bellis sylvestris media caule carens* L. R. H. p. 424.

f) Cui est *Bellis media nudicaulis non ramosa*. *Comment. Acad. Reg. sc. Paris.* 1720. p. 318. Nam is quidem censor perpetuus TOURNEFORTI, nullam errorum suorum impunitatem sperare poterat, in classe, quam sibi selegerat submovendam penitus ex imis sedibus, novasque ad leges ordipandam.

penitus certum est, num VAILLANTIUS nostram viderit, quando *Bellidem monanthon autumnalem* g) RAII addidit *Tussilaginis*, quod & papposa esset, & scapo uniflora. Nam in eo ipso opere, in quo sedulo elaboravit PONTEDERA h), *Bellidem* eandem RAII, nudo semine describit, ut omitam quod nostra verna sit omnino. Ut verum fatear tamen videtur, & RAIUS i) & VAILLANTIUS k), de nostra dixisse. MICHELIIUS l) denique, vero caractere *Bellidis mediae* cognito, novum genus ipsi creavit *Bellidastri* m), felici connubio certe nominis ex *Astere*, cujus characterem habet, & *Bellide* cujus faciem refert, cujusque nomen gesserat antiquitus. Mihi enim nihil viderur intercedere, quin *Aster* dicatur, isque caule nudo uniflorus. Namque flos, qui amicissimo LINNAEO n) calyce visus est differre ab *Astere*, is equidem, & squamis & pappo seminum rufis, proxime accedit ad *Asteres* illos Alpinos, quibus ipsis *Bellidis* folia sunt, licet caulem non gerant aphyllon, & per hos intermedios *Asteres*, cum *coeruleo acris*, multisque omni-

A 3 no

g) *Caule nudo tenui praelongo flore albo rubente Hist. III. p. 221.*

h) In plantis flore composito. vid. *Dissert. p. 277.*

i) Ob summam similitudinem descriptionis, & quod vix fieri possit, ut, plantam adeo vulgarem, ignoraverit perpetuo, nostra enim & altior est, & folia quam vulgaris majora habet, & pappum in semine.

k) Cui est, *Tussilago Bellidis* folio l. c. 375.

l) *Nov. plant. gen. p. 32. Tom. 29.*

m) *Bellidastrium alpinum foliis brevioribus hirsutis caule palmari flore albo.*

n) Nempe eam praecipue ob notam, quod calyx esset squamis nonnisi duplici ordine ad basin usque scissis, videtur eam addidisse *Doronicis*, nomenque secisse *Doronicum caule nudo simplici uniflora* Hort. Cliforti. p. 500. REYEN *Flor. Bat. p. 160.*

no speciebus conjungitur, quibus omnibus non plurimorum ordinum squamae sunt. Caeterum, ut non-
dum dimittam stirpem nostram, facit synonymorum obs-
curitas. Nempé & MENZELIUS o) nostram videtur non
tuo p) novo nomine proposuisse; & dubium esse pot-
est, num ea *Bellis media*, quam pictam a MATTHIOLO q)
pene omnes Botanici receperunt, omnino sit a vulgari
minore diversa. Certe MATTHIOLUS r) *mediam* suam
non alpibus, aut editis umbrosisque locis, sed pratis tribu-
it indigenam, & *hortensi* opponit *spontaneam*. Nihilque
a MATTHIOLO discrepant LOBELIUS s) DODONAEUS t),
LUGDUNENSIS HISTORIA u) TABERNAEMONTANUS v)
alique veterum. BAUHINI x) certo nostram plantam de-
scri-

o) *Bellis caule bipedali nuda, foliis magnis latis, floribus rubris & albis* (uti & nostra solet *Alpina*) *Fugill.* Tab. 8. Quam VALL-
LANTIUS habet l. c. p. 358. & MORISON III. p. 30. & RA-
JUS in *hist. plant.* p. 349. & TOURNEFORTIUS in l. R. H. & TIT-
LIUS, *hort. pisav.* p. 22. de quo dudum miror, qua felicitate
in horto suo pene omnes ex ordine TOURNEFORTII plantas
alere potuerit, & eas saepe, quas ego satis certe novi, nun-
quam distinctas extitisse.

p) *Bellis foliis parvis floribus albis alpina* MENZEL. *Fug. Plant. rar.*
T. 8. vix videtur differre.

q) In *Dioscorid.* cum magn. fig. p. 911.

r) In iconibus nempé p. 478. quae ad DODONAEANAM facta est.
In *adversariis* vero videtur nostram indicare, siquidem eam
PENNIO tribuit in sylvis Germaniae lectam p. 199.

s) Icon enim *Bellis sylvestris* ex MATTHIOLO exscripta est.
t) p. 264. *Pemptadum*.

u) p. 854. ex MATTHIOLO, eodem etiam nomine.

v) eodem nomine 319.

x) IOHANNES quidem iconem usus est GESNERIANA III. p. 1. p. 114.
CASPARUS verò & locum natalem indicavit, & in herbario
vivo veram stirpem habuit.

scripserunt, de recentioribus, & ipso TOURNEFORTIO y), dubitari potest. Unicum addo, ex argumento calycis villosi omnino videri ad nostram pertinere *Bellidem*, quam novo nomine dicit SCHEUCHZERUS z), *alpinam minorem sylvestri minori similem*. Est autem hoc genus *Bellidis*, *Asteris*ve, foliis *Bellidis* vulgarissimae majoribus, scapo altiori dodrantali & pedali, flore majore, & calyce aperto magis hirsutulo ex bina serie squamarum ad basin sectarum virentium factus, semine, uti dictum est, papigero, tum in semiflosculis, tum in disco.

§. VI.

Altera die, operibus primum lactariis adsuimus, atque ex mensuris lactis opimi quadringentis, quae paulo plus quam duodecies centena pondo efficiunt, unum cascum compingere vidimus librarum fere octoginta. Solent etiam majores fingere, quando gramen adultius est. Atque eam lactis copiam ferè septuaginta vaccae suppeditant quotidie. Opima verò ejus lactis pinguedo his in montibus debetur fere unice *Alchimillae vulgari*, in editioribus pascuis *Plantagini angustifoliae*, & in editissimis *Muttellinae*, stirpibus adeo, quae blando cum morfu adstringunt.

§. VII.

Inde per anfractus montium in altiora cacumina divagatus, stirpes quaecumque, sed eas paucas certe inveni, cum anni praecox tempus esset, & hi montes in univèrsùm alpinum ingenium non satis exprimant, qui hortorum etiam frugumque non omnino expertes sunt. *Gentiana* qui-

y) vide notam c.

z) It. VI. p. 453. neque alia est *Bellis sylvestris minor*. It. V. p. 424.

quidem *Asiopia* folio uberrima ubique adfuit, sed flores nondum ostentavit, quos Augusto mense demum expandit. Ea planta, si quidem GESNERUS a) noster civis mei ARETHI nomini eam consecrasset, uti constituerat animo, fuisset ex antiquissimis, quae Botanicorum nomen gerunt. Sed & ubique obvium *Geum rotundifolium majus*, per sylvas humentesque scrobes, cornubus ovarii modo ad se mutuo converlis, modo per aetatem divaricatis, punctis rubris per petala in tres lineas dispositis, calyce ex ambitu imi ovarii exeunte. Deinde *Valeriana* copiose apparuit in editioribus, cujus historiam extricare, atque optimorum scriptorum sententias faciliores reddere explicando, id quidem & necessarium visum est, & difficile.

§. VII.

Duas nempe *Valerianas* communius alunt Alpes nostrae, licet neque *Celtica Spica* b) careant: sed has quidem frequentius. Et altera quidem in Alpibus ubique frequens, in *Jura* Monte mihi nondum visa est, eaque quam

a) *Epistolar.* p. 120. b) Admodum placebat optimo viro id institutum, quo stirpes, grato quasi animo motae, certam immortalitatem reddunt tuis, per quos innotuerunt, conf. *epist.* p. 73. & p. 41. ubi *Adolpbiam*, aut *Oeconiam*, & *Achilleam* (pro GASSERO suo) serio offert amicis. VAILLANT-ius idem secutus consilium, mutavit in posterioribus operibus, quod nihil veri nexus esset inter stirpes & nomina clarorum virorum. Neque tamen placet, quod ejecto verissimi amici nomine, BORNEAVIAM voce sesquipedali dixerit *Antaniphyllo*. Nam & nomina ficta ad similitudines raro effugiunt ambiguitatem, & male poenitentis videtur, auferre quod dederat.

b) Quam nomine *Waldschleben* enumerat inter plantas *Nessi*, civis noster ARETIUS, p. 235.

quam nunc in *M. Hengst* decerpimus, perenni, odorata, lignosa radice repit, alba quidem, sed fusco cortice. Folia ex radice profert ex longis pediculis, tenera, glabra, virentia, acuto mucrone, acute serratis oris, non dissecta tamen. Verum ad caulem, quales plures ex una radice pedales, & cubitales fistulosi eriguntur, perpetuo una conjugatio media est foliorum duorum, sed ternatorum, quorum medium latius est, bina acuminata subjacent, familia medio sed minora. In *Umbella* nihil novum invenio, nam & tripartita procedit divisio, & flosculi odorati, infundibuli forma, in umbellam congregantur, & terna stamina alba ex tubo floris proveniunt. *Tuba* bicornis in semine, cujus contorta corona per aetatem plumosos radios explicat. Praecipuam notam dant folia ad caulem perpetuo terna, nunquam aut pinnata ut in vulgari, aut integra, ut in ea de qua proxime dicemus, §. VIII. Haec *Valerianae* species variis nominibus innotuit variis Botanicis, neque semper eadem cum ubertate notarum. Et *Phu* quidem saxatile GESNERI c) huc refero, quod in Alpibus legerit, ubi aliqua quidem est *scrophulariae folio Valeriana*, sed rarior d). Deinde CLUSII *Valeriana sylvestris alpina l. latifolia* e) cum nostra eadem videtur, cum folia ad caulem in duastresve crenas dissecta describat. A CLUSIO ad CASPARVM BAVHINVM neminem invenio, qui ejus mentionem fecerit. Is autem stirpem nostram egregie cogni-

c) Hort. Germ. p. 272, tab. collect. p. 96. *Petracum* vero dicit in append. ad Hort. German. p. 295.

d) In Rhaetia legit D. HUBER, ego vero in *M. Obergurnigel*. sed in *Jura M.* frequentissima est (xxviii).

e) *Histor. stirp. rarior.* LV. cum iconc, quae divisionem foliorum ad caulem non satis exprimit. In *Pannoniis* vocat *Alpinam l.* p. 512. figuram vero non addit.

cognitam habuit, foliorum ad caulem binas alas esse sollicite monuit, iconem etiam dedit, quo id exprimeretur f). In eo, ut saepe solet, non prospexit nobis, quod CLVSIANAM plantam g), proprio nomine a sua sejunxerit, quae adeo certo erat eadem. Ab eo tempore nihil novae lucis accessit. CLVSIANAM plantam repeterunt JOHANNES BAVHINVS, h) sibi etiam visam, PARKINSONVS i), RAIVS k). Nomen aut CLVSII aut CASPARI dederunt AMBROSIVS l), MORISONUS m), TOVRNEFORTIVS n), MAGNOLIVS o), PLVKNETIVS p), TITA q), SCHEVCHZERVVS r), VAILLANTIVS s) ita

- f) *Valerianam montanam primam dixit in Phytopinace p. 192. alpinam primam in Prodromo p. 86. & Pinace. Synonymum nullum addidit. Legerat autem in m. Wasserfall. Cat. plant Basf. p. 50.*
- g) *Eam enim dixit Valerianam alpinam alteram in Pinace, nam in Phytopinace idem nomen dat illi folio scrophulariae.*
- h) *Dixit Valerianam alpinam, III. p. 208. neque Fratris novam cognitam habuit, descriptam pridem in Phytopinace. Ex eo CHABRAEVS p. 411. Icon autem melior est CLUSIANA.*
- i) *In descriptione major sive latifolia est p. 120. in icona minor id p. 121. Icones enim mutatae sunt.*
- k) *Descriptio cum nomine Alpinae Hist. p. 390. bona est, neque tamen potuit homonymiam extricare, cum ad CLUSIANAM etiam eam voluerit referre, quae est scrophulariae folio. Solennis asteriscus indicat, quod hanc quidem, non viderit. Nostram in M. falcet legerat. vid. Syll. plant. extra Brit. nasc. p. 258.*
- l) *Merus, ut solet, nomenclator. Phytograph. p. 554. Usus vero est nomine CLVSII.*
- m) *Hort. Blef. p. 214. & Hist. Oxon. III. p. 112. eodem nomine in Umbelliferis vero p. 51. solam habet CLUSIANAM, quam vocat Nardum montanam alteram & XI. loco ponit. Primam CASPARI utrobique omittit.*
- n) *Valeriana alpina prima, ex CASPARO Schol. Bot. p. 153. & L. R. H. Solam excitavit BAVHINI stirpem.*
- o) *Eodem nomine H. R. M. 201. & in Cbsr. plant. p. 149.*
- p) *Almagest. p. 380. eodem nomine.*
- q) *Hort. Maurocen. p. 178. & in Itinere, ubi alpestrum prima m dicit.*

s); ita ut eorum nemo moneat nihila CLUSIANA stirpe differre BAVHINIANAM, utramque etiam distinctis nominibus & TOVRNEFORTIVS r), & TITA u) expresserint. Neque tamen fieri poterat, ut lateret penitus Botánicos stirps adeo non rara. Ergo pro nova planta descripta est a BARRELIERO w), qui cum nomine *alpinæ saxatilis minoris flore albo* egregiam dedit iconem, licet ei nomen addiderit *scrophulariæ folio* EDITOR, hic certe non felix. Sed & *Val. alpina minor planta palmaris* PLVKNETH x), & ejusdem *Valeriana minima planta ut plurimum uncialis* y) manifesto ad nostram pertinent, quod & VAILLANTIVS perspicax intellexit. De MENZELIANA z) & CAESALPINIANA aa) & LOBELIANA bb) stirpe non ita certo constat. Reliqua synonyma hujus capit, nisi fallor, omnia pertinent ad hanc nostram *Valerianam, foliis ad caulem tripteris*.

§. VIII.

Alia est, & haud paulo obscurior, *Valerianæ species*, cui *radices fusæ, lignosæ, repentes, plerumque inodoræ.*
Cau-

r) *Valeriana alpina* Jt. I. p. 51. cum certa descriptione nostræ.

f) Eodem nomine C. B. *Comm. Acad. Paris.* 1722. p. 252.

t) Qui CLUSIANÆ peculiare nomen dedit, post CASPARUM, *Valerianæ alpinæ alterius*.

u) *Hort. Maurocen.* l. c.

w) *ib.* 742.

x) *Almag.* p. 380. & *Phytograph.* T. 231. f. 7.

y) *Almag.* ib. & *Phytop.* ib. f. 8. Nomen repetiit RAIUS *hister. plant.* III. p. 242.

z) *Valeriana saxatilis foliis* Trachelit in pug. nomen utique nostram videtur exprimere.

aa) *Valeriana inodora* J. L. IV. c. 5. conjectura est utriusque BAVHINI. Nostra odora est, sed reliqua conveniunt.

bb) *Valeriana montana* Peliterii. *Illustr. stirp.* p. 145. Descriptio non recedit.

Caules, praeter umbellam, non ramosi, ex una radice saepe plures, erecti, pedales, & ultra. *Folia* ad terram, pedicellis etiam nixa, levia, & virentia, sed figurae diversae, & imae quidem ex rotunda ellipso acuminata, ut fere violae folia imitentur: deinde alia, nam multa ad terram sunt, longiora, & ex ellipso lanceolata, plicata ora, & aliquando vagis incertisque dentibus non acute exsculpta. Ad caulem una conjugatio foliorum sessilium, quae longiore mucrone sunt, & *Alfines* altissimae similia, nunquam terna, neque dissecta. Flos, stamina, Tuba, semen, simillima. In *Juræ* nemoribus ubique reperitur; supra *Dornach*, in *M. Nodz*, *Chasferal*, *Grandvi*, & alibi frequentissimam legi, in alpibus, uti dixi §. 7. not. e. rarior est. Haec planta, uti ex herbario CASPARI BAHINI, & icone LVGDUNENSII certior factus sum, sollicita cura impensa, primum dicta est a LVGDUNENSIS *Valeriana montana*, a) cum icone, quae ima folia nostrae, ruditer, sed proxime exprimit. Ex canata est *Valeriana montana subrotundo folio* CASPARI BAHINI, b) ejusdemque *montana alfinis folio*, c) utcunque ad diversissimam d) stirpem hoc nomen usurpaverit VAILLANTIIUS. Deinde PINACIS nomen repetiit TOURNEFORTIUS e) & TILLIUS. f)

Haec

a) *Hist. gener. plant.* p. 1127.

b) in *Pinace*.

c) *Phytopiu.* p. 193. ubi similem esse suae, sed diversam tamen adserit, contra praefens proprii herbarii testimonium. Sed amabat CASPARIUS stirpium multipliciter, & saepissime eandem bis tradidit, quando eam & viderat ipse, & in alio descriptam tegerat. Ab eo vicio JOHANNES longe erat alienior.

d) 1722. l. c. refert ad *Nardis Celicae similem inodoram*, quae planta, in herbario siccio CASPARI BAHINI conservata, diversissima est, *Nardis* affinis, longo folio lingulae effigie, habitu stricco duro, Umbellae exiguae, foliis ad caulem longis & stricissimis.

e) l. R. H.

f) *Hort. Pisau.* p. 170.

Haec prima est classis nominum, quibus nostra dicta est. Deinde CASPAR BAUHINUS ex vicinis montibus g) lectam stirpem a LUGDUNENSI separavit, & pro nova descripsit, *montanae alterius h)* primum nomine, deinde *alpinae scrophulariae folio i)*, quae certe appellatio minus apta est, cum nostra, neque adeo acuta, neque acute serrata folia habeat, uti ipsa BAUHINI fidissima icon satis demonstrat. Id nomen, & CASPARI BAUHINI descriptionem retinuit FRATER, k) deinde, ex ordine, planta plerumque non visa, neque cognita satis RAIUS l), MORISON m), TOURNEFORT n), MAGNOL o), PLUKNET p), TILLI q), VAILLANTIIUS r), & SCHEUCHZERUS s), sed is gnarior, & cum ipsa notarum mentione. MUNTINGII t) & MENZELII u) nomen, & alterum, quod SCHEUCHZERO w) elapsum est, ex nomine CASPARI corrupta sunt. Haec secunda est nominum series,

g) Conf. *Catal. plant. circa Basl. nasc. p. 50.*

h) *Phytopin. p. 292.*

i) *Prodrom. Tabatr. Botan. p. 87. & Pin.*

k) *Hist. univ. plant. III. p. 208.*

l) *Hist. plant. p. 350.* (cum fatali asterisco, inde dubitatio num diversa a CLUSIANA) *Syll. plant. extrâ Brit. nasc. p. 350.*

m) *Hist. oxon. III. p. 102.* In *Umbelliferis* non habet.

n) *Schol. Botan. p. 153. & I. R. H.*

o) *Hort. Reg. Monsp. p. 201.*

p) *Almagest. p. 380.*

q) *Hort. Pisani. p. 170.*

r) l. c. p. 252. ubi conjungit, forte seductus a *Phytopinace*, *alpinam alteram C. B.* Ea vero, repetitio est CLUSIANAE, quae dicta est §. VII.

s) *It. Alp. I. p. 51.*

t) *Val. folio scrophulariae; waarsceffen. van de plant. p. 545.*

u) Eodem nomine in pugillo plantar. rarior. si quidem nostram vult.

w) *Salix alpina scrophulariae folio It. Alp. V. p. 428.*

series: Sed tertiam inchoat denuo BAUHYNUS x) minor, quando *Valerianae montanae inodora* ex Monte *Wasserfall* lectae meminit: nam de ea, quam suae conjungit, CAESALPINIANA y) *Valeriana*, nondum liquet, an nostrae sit eadem. Id nomen apud AMBROSINVM z) & TILLIVM aa) existat.

Quarto loco est *Valeriana alpina foliis integris radice repente inodora*, quam RATVS bb) in Helvetiae montibus lectam, pro nova stirpe egregie descripsit, & ex eo repetierunt MORISONVS, cc) PLUKNETVS dd), TOVNEFORTVS ee) Quinto demum eadem nostrae videtur BARRELERII *Valeriana saxatilis alpina minor, integris foliis Italica ff)* quam & TILLIVS ut omnia habet gg). Toties pro diversa descripta, eadem semper est *Valeriana foliis omnibus integris ex ovato acuminatis, levissime dentatis*.

§. IX.

Adscendebamus per herbosa pascua *die Lausbütte*, & jam prope culmen eramus, juxta praecipitem rupem, quales rarae sunt his in locis, quando frequentissimum offendimus

x) in herb. viv.

y) *Valeriana inodora altera hist. plant. l. IV. c. 5.* Brevissimus est CAESALPINIVS, ut nihil definire liceat. Huc pertinet *Valeriana annua ex silva CAMERARII in horto Med. 176.*

z) *Phytograph. p. 554.*

aa) *Hort. Pisav. p. 173.*

bb) *Topographical observations p. 438. Syllog. stirp. extra Brit. nascunt. p. 259. Hist. plant. p. 389. ex saleva M.*

cc) *Hist. Oxon. III. p. 102.*

dd) *Almag. p. 380.*

ee) I. R. H. VAILLANTII cum ea, quae *Nardo Celticae similis est inodora*, perperam conjunxit.

ff) Ic. 868. non optime nostrae respondens.

gg) L. c. p. 169.

dimus *Petafiten monanthón* dictum VAILLANTIO a). In eius flore *flosculos hermaphroditicos* numeravi multos ad 28. cum tubo stamineo, & bicorni *Tuba*. Circumstabat eos corona *flosculorum seminarum*, numero fore decem, quibus bicornis *Tuba*, & rudimentum campanulae bifidum fuit. Quae certe & DILLENII b) observationi, & doctae LINNAEI c) emendationi conveniunt. Vicinos dumos late occupabat *Chamaecerasus alpina* fructu gemino duobus punctis notato, jam tunc delapsis floribus, ut valde praecocem esse appareat, & *Cacalia*, de qua alibi dicemus.

§. X.

Ibi ad oram praecipiti frequens provenit *Cervaria* illa ARETHID), & GESNERI e), deinde, JUNGHII f), quam ad *Caryophyllatas* primus revocavit MORISONVS negligenter admodum relictam cum *Chamaedry*. Eandem, quod calycis segmenta petalis non plura habeat, petala vero vix unquam pauciora habeat senis, a *Caryophyllata* separandam esse jam ante

a) *Mém. de l. acad. des sciences* 1719. p. 403.

b) *Hort. Elthamens.* p. 310. non alium, praeter vulgarem, *Petafitem* habere flosculos uniformes.

c) In *flor. Lapon.* & *Hort. Clifort.* p. 411. Is enim *Petafitem* cum *Tussilagine* conjungit, quod dentur *Petafitis* species thyrsiferae radiato flore, & aliae *Petafitis* species facie *Tussilaginis*, mediae ergo inter *Tussilaginem* & *Petafitem*. BOERHAAVIUS nostrum inter *Tussilagines* reliquerat. *Ind. alt. hort.* L. B. p. 101. PONTEDE-RA ob alienum a *Petafite* habitum minus feliciter junxerat *Senecioni*, non observatis flosculis semininis *dissert.* p. 155.

d) *Defer. Ness. & flokk.* p. 235. & in GESN. *Epist.* p. 116. b.

e) *Desc. mont. fracti* p. 63.

f) In *doxolog. phyr. minor* inter *homonymias plantar.* Vir acutissimus facile vidit non esse *Chamaedryn*, etiam ante MORISONI *praeludia*, quae anno demum 1669. produerunt. Eorum vid. p. 390.

ante aliquot annos g) monui. Sed idem ex propria observatione, excusatus est LINNÆUS h), deditque stirpi in *Laponia* non infrequenti *Dryadis* nomen. Quod nomen, etsi a *quercu* desumptum sit, nostra vero stirps, supra omnes sylvas, apricis, asperisque locis amet provenire, a similitudine vero foliorum, nomina imponere ipse nolit LINNÆUS, servari tamen poterit, ne dissensiones in infinitum crescant.

§ XL.

In scrobibus editis *Acetosa* montana maxima provenit, quae, contra consuetudinem stirpium montanarum, longe altior est, & toto habitu laetior quam vulgaris a) illa, quae in pratis nascitur. Sexus visa est eandem habere differentiam, nostrae enim omnes meros femininos flosculos habuerunt, uti pridem observaveram, sed ante me VAILLANTIUS b) & PONTERA c). *Vitis Idaea sempervirens fructu rubro*, & ea quae *myrtillus grandis* etiam dicitur, & vulgaris *foliis crenatis* ubique per ericeta proveniunt, & *Ranunculus montanus aconiti folio albo flore* & aliae, sed vulgaris notitiae montanae. Ergo ultima vice oculos ex ea specula per subjectos agros urbesque late dimisimus, & in *Lucernensem* primum pagum, cuius caput *Lucerna* & lacus conspicitur eminus, & lacus *Sursee*, & vallis *Endlibuch* altioribus montibus separata a pago *Subsylvano*; deinde per late patentem *Argoviam*, magnumque illum *Juræ* sinum, quo omnis *Helvetia* terminatur ad septentrionem, lacusque

g) & *Cervariae* quidem nomine, quod antiquissimum est, It. in *Temp. Helvetic* Tom. I. S. IV. p. 5; 7.

h) *Flor. Lapon.* 215. *Cbar. gener.* 419. & *Hort. Cliffort.* p. 155.

a) Cui conjungitur a LINNAEO in *flor. Laponic.* 130. & *Hort. Cliffort.* 131.

b) VAILL. in *botan. Parisin.* p. 3.

c) *Epist.* ad TILL. p. 179. post *hortum Pisanum*.

que a *Bienna Morato*, & *Neocomo* nomen habentes, pulcro certe, & vario spectaculo: Descendimus deinde, & protinus in aquosis frigidis que locis *Pinguiculam albam* frequentem legimus, Alpinam fere stirpem & excelsam amantem. In ea, quod, praeter morem sui similium, duo tantum gerat stamina, visum est floris partes curiosius inspicere. Et calycis quidem tria superiora segmenta subrotunde excisa sunt, duo inferiora, quae intervallo distant a superioribus, acuta magis. *Ovarium* nunc subrotundum, per floris perforati fundum emitit *Tubae* loco infundibulum, album, plicatum, & fimbriatum. Fundus vero floris retrorsum recurrit in breve calcar conicum, acuto mucrone flavescens, & per siccitatem rufescens. Anterior vero floris rictus superiora duo segmenta subrotunda reflectit, inferiora tria majora, quorum medium pube maculisque flavis late distinguitur. Sub extremum fimbriatum finem *Tubae* recondunt se duo apices staminum bicornium, quorum duo cornua superna disciformes apices, inferiora fungosa flavaque corpuscula gerunt, apicum quaedam quasi imitamenta. Ea vero corpuscula, quae LINNAEUS industiam fugisse videntur, conjungunt *PINGUICULAM* tetraestemonibus, uti bicornia stamina *Scelerae*, *Salviae*, & *Hormini* plantas suas uniunt *Verticillatis*, licet nonnisi duo earum apices capsulas habeant, bini vero imperfectiora tamen & fungosa corpuscula.

§. XII.

Et haec fere sunt, quae prima haec excursio dedit. Valediximus enim monti *Arni*, cujus varios districtus late per colles herbosos dispersos obiveramus. Reduces ad ripam fluvioli, qui ad pedem montis *Arni* oritur, frequentem eam speciem *Geranii* vidimus, quam alibi descripsi-

scripsimus a), in *Dessio* verò monte & *Neocomensum* dumetis montanis crebro legimus. *Gratiam Dei* vero *Germanorum*, *Basilæe* nasci, in pratis circa ipsa munimenta urbis prope *S. Petri* aedem, didicimus ab amicissimo *STÆHELINO*.

§. XIII.

In palustribus torfaceis uliginosisque dumetis & pratis inter *Gumhigen*, & pagum, cui antiquissimum nomen est *Muri*, creber est proventus *Vitis Idææ* magnæ & *Oxycocci* & *Thyffelini* *Plinii*, & *Andromedæ* foliis subrus albensibus, *Pedicularis palustris elatioris*, *Trifolii* demum *Lupulini*, quod exquisitè distinxit vir solidæ eruditionis *DILLENIUS* b) *minoris alterius* nomine a *minimo* c) de quo alibi diximus, in universum simile, sed foliis non ita cordatis, neque striatis, flosculis reflexis plusculis ad duodecim, habitu in universum ampliori. *GMELINI* etiam, veteris sodalis, qui nunc ex *Itinere Kamtschadkalensi* redit, observationem d) facile oculorum iudicio confirmavimus, torfam nempe congeriem esse radicularum *Sphagni molliissimi candicantis*, putrescentium, & cum terra palustri intime commistarum. *Pentaphylloides palustre rubrum* ibi frequens est, & ex rogorum sede renascens *Jacobaea I. Panonica*, & difformi flore *Chamaenerion*, cuius pulcherrimam iconem dedit de *BRY* e).

§. XIV.

a) *H. Hercyn. XIV.*

b) *Synopr. Ratis. edit. III. p. 330. cum iconē.*

c) *H. Hercynic. p. 5.*

d) In *Commerc. Liter. Phys. techn. Med.* 1731 p. 348.

e) *Florileg. ic. 42.*

§. XIV.

Diebus aliquot elapsis, ad *Biennensium* & *Neocomen-*
sum montes, illos dudum notos, hos nondum visos, iter
 suscepi exeunte mense junio. In prima sylva, Bernae
 vicina, quae a *Ruborum* copia dicitur *Bremgarten*, non solum
Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachiana f),
 & *Helleborinen angustifoliam purpurascentem*, & *Gallium*
montanum latifolium provenit, sed elegans etiam *Gros-*
sulariae varietas *rubro flore*, cujus aliquot stirpes juxta
 viam regiam in dumeto florere vidi, fructus vero matu-
 ros non inveni. Ejus, sed in hortis cultae, meminit CLU-
 SIUS g), deinde IOHANNES BAUHINUS h), & RAIUS i),
 & BOERHAAVIUS k), neque facile ullus eorum, qui *floras*
 scripserunt. Est autem, uti recte LINNAEUS l), vari-
 etas vulgaris *Ribesii* hortorum fructu acido, cui cor-
 tice suo rubente, & omni habitu convenit. *Alpinus* au-
 tem *Ribes*, qui frequens in sylvis *Helvetiae*, & planiori-
 bus, & *Juræ* montosis, & ipso *M. Wasserfall* prove-
 nit, dulces aut insipidas baccas ferens, cortice est albo
 floreque virente m). Ejus, quod diversi saporis bac-
 cas generet, duas species facit CASPAR BAUHINUS n),

C 2

&

f) I. B. II.

g) *Ribes vulgaris rubro flore*, Pennon. p. 119. Hist. p. 119.

h) Hist. plant. II. p. 98. dicitque *Ribem flore rubente*.

i) *Ribes fructu rubro majore* hist. plant. p. 1486.

k) Cum nomine I. B. Ind. alt. II. p. 254.

l) Hort. Cliffortian. p. 82.

m) Si quidem satis ab hortensi diversus est. Cortex differt, et sapor
 baccarum, qui in sylvestri, si ejusdem esset plantae, deberet
 non mitior esse. Deinde, racemi in sylvatico erecti sunt; in
 hortensi pendent LINNAEUS l. c.

n) Aliam *Grossulariam hylloferam rubram*, aliam *Grossulariam vul-*
garem fructu dulci, in *Pinace*.

& ad eam, cui fructus dicitur acidus esse, refert *Ribem sylvaticum* GESNERI o). Sed is, cum tulli dicatur mederi, ad dulcem videtur pertinere, neque differre ab eo, quem in sylvis Austriæ, Silesiæ, Thuringiæ, Saxoniae, Laponiæ, nascentem decerpserunt CLUSIUS p), SCHWENKFELD q), RUPP r), BUXBAUM s), & LINNAEUS t), in ipsa denique Helvetia IOHANNES BAUHINUS u). Ut adeo possit expungi id genus *Grosulariæ*, cui *sylvestris rubræ* nomen fecit CASPARUS. Ea vero species, cui folium multo est amplius, & odore ingrato, fructus niger, tingens & olidus, eam uti Tiguri GESNERUS v), ita ad statum ego haud procul urbe patria reperi.

§. XV.

In sylva Frienisbergenſi frequens est utraque *Pyrolæ* vulgarior species, *pistillis rectis*, & *mucronato serratoque folio*. Ad sepes circa Belmont, *Barba Capræ* foliis oblongis. In fossis circa Nidoviam, *Ranunculus aquaticus* folio circinato tenuissime diviso, & *Sagittæ* in Helvetia non frequentis angustiore folio varietas. In pratis humidis inter Nidau & urbem Biennem plurimum *Silaum flore luteolo*, & *Thalictrum majus* siliqua angulosa striata. Est ea urbs, lac-

o) Hort. Germ. app. p. 195 b. & *Ceanothus* levæ genit p. 252 l. c. Consentientem habemus IOHANNEM BAUHINUM.

p) *Ribes vulgare fructu dulci* PAVON. p. 119. *hist. rar. plant.* p. 119.

q) *Stirp. Siles.* p. 182. vocat *Ribes insipidum*.

r) *Flor. Jenens.* p. 40.

s) *Enum. plant. circa Hal. nasc.* p. 284.

t) *Flor. Lapp.* 97.

u) In *Salve*, Thuri, & circa Basileam. II. p. 38.

v) *Anemum falsum*, de Hort. Germ. p. 245.

lactissimo loco, ut meo quidem iudicio utar, sita ad radicem vitiferam humiliorum montium, qui e *Juræ* altissimis floribus producti, simili decursu, sed propiores plantitiei ad occasum vergunt. Lacus ante portas est, vineis late septus. Ad meridiem planissima prata vicinum oppidum *Nidau* conjungunt *Biennæ*, terminata in lenes & umbröfos colles. Aquarum purissimarum benigna copia, ex fonte omnium, quos unquam vidi, sed vidi plurimos uberrimo, & purissimo, qui in cavos rupium recessus inmensa profunditate se demergit, & unus fere singulis civibus suum fontem præstat.

§. XVI.

In durissimas rupes, passim ubi aliquid mollioris glebae adpersum habent, vitibus consitas, quæ urbi ad septentrionem imminet, cum certa spe non inutilis laboris adscendi, comite adgnato, & vetere amico SALOMONE SCHOLL M. D. Prötinus *Mabaleb* se nobis obtulit, odorato ligno frutex, longis & rectissimis virgis, folio duro Mali sylvestris, fructu nigro, ossiculum & nucleum Cerasi habente, sed, macriori, &c. solitariis pediculis. Is ubique supra vineas, per universum *Juræ* tractum, & similibus in *Valesia* locis, plurimus nascitur. Deinde *Iris Germanica*; & *Sedum majus* vulgare spontaneum, & *Kna-mel* perenne albis calycibus, & vulgaris *Globularia* caule folioso, *Veronica recta* spicata, & suavissimi odoris *Achillea*, floribus ochroleucis, latiori folio, & magis ad indolem *Tanacetii* pinnato, & *Emerus*, & *Gramen avenaceum* lanuginosum, quod modo rarioribus plumis est, modo densioribus: & *Oreoselinum minus*, & quæ multe gravior fuit, *Saxifragia multifida*, folio *Pannonica*. CLUSII. Ea quidem tunc non florebat, sed in *Dola* M. alio tempore cum flore legi, siquidem, ut videtur, erat eadem.

Ro-

Radix effossa, conica, alba, resinosa, aromatica, ramos multos ex praecipuo capite spargit. Ad terram frequens capillitium *folia* nascentia ambit. Ampla hinc folia, & fere pedalia, cum viriditate glauca, striatis costis *Biennae* quidem & viridiora, & magis multiplici divisione, quam quae in *Dolaz* legi. Costae primariae pinnarum edunt pauca paria, haec secundas pinnae, eae, tertia divisione alias, quarum fere trifida est divisio, non remota a *Peucedani* indole, sed longe minor, ut vix unius tertiae partis lineae latitudinem aequent. In primis cujusvis alae foliolis saepe bifida tantum folia sunt, alias simplicia. *Caulis* sulcati, in *Dola* M erant semipedales, multi, *Umbellae* sparsae in cacumine multae sunt, & singulares, neque arcuatus in unam majorem congregantur. Sub iis ramis vaginae non magnae longae, & strictae, in foliola laciniata terminatae. *Umbellae* exiguae nullum vel universale involucrium, vel partiale habent. *Flores* albi, tunc quando i. Julii *Dolam* conscendi, nondum se explicuerant, ut longe minus *semen* maturum viderim. Ab *Hippomarthro* Rivini facile differt, cui habitus robustior, dura folia, vaginae ad caulem adeo crebrae, & turgidae, ut vel solo eo habitu dignoscatur, demum latis ex albo & viridi variis foliis, quae umbellis partialibus sunt pro involucrio. Id addo, ut adpareat non recte conjunctam esse plantam nostram cum RIVINIANA x), quae *Selinum* est montanum pumilum CLUSII y), a RUPPIO z), LINNAEO a) & humanissimo ROYENIO b). Nostra planta tria apud plerosque Botanicorum nomina habet. Namque prima de-

x) Cuius eximia icon est VAILLANTH, *Bst. Paris*, T. IX. f. 4.

y) *Pannon.* 701. 702. *hstor.* CXCI.

z) *Flor. Jenens.* p. 226.

a) *Hort. Cliffort.* p. 103.

b) *Flor. Lugd. Bat. Prodr.* p. 112.

descriptio est CLUSII c), qui *Saxifragam Pannonicam* dixit, iconemque dedit non malam. Inde CASPARI BAUHINI *Daucus montanus multifido folio* in *Phytopinace* d), *multifido brevique folio* in *Pinace* e); *Saxifraga multifido folio Pannonica* IOH. BAUHINI f), CHABRAEIG), RAII h), PLUKNETII i), *Daucus montanus Pannonicus* PARKINSONII k), *Saxifraga montana minor multifido folio Pannonica* MORISONI l), *Seseli, quae saxifraga Pannonica* BOERHAAVII m). TOURNEFORTIUS non habet, & modeste facit, satis enim adpāret, neminem eorum, quos auctores citavimus, CLUSII stirpem aut vidisse aut cognovisse. Sed eadem & CLUSIANAE & nostrae planta est, *Aleum aliud* LUGDUNENSIIUM n), quod in Allobrogum frigidis montibus lectum, etiam natali loco cum nostra montis Dolaz, sed figura foliorum, umbella radice & habitu praeterea convenit. Ea est *Aleum Dauci Cretici*

fac-

- e) In icone *Pannou.* p. 698, lobos nimis multos integros aut bifidos fecit, & qui trifidi, si non ad basin usque, uti par est, secti sunt. Habitus omnino umbellae adest, in *bislor. ray. plant.* p. CXCVI. Idem nomen est apud AMMONIUM *phytegr.* p. 481.
- d) p. 260.
- e) Ex *herbarii viis* inspectione certus adfirmo. Idem nomen habet *flora Batav.* p. 10. & MORISON in *Umbellif.* p. 84. ubi jubet a *Daucis* auferri, ob semen striatum.
- f) III. p. 2. p. 19. nihil addit iis, quae a CLUSIO habuerunt, neque sibi vilam dedit.
- g) *Sciograph. stirp.* p. 383.
- h) *Hist. plant.* p. 461. cum asterisco.
- i) *Almagest.* p. 333.
- k) *Tetrat.* p. 896.
- l) *H. Oxon.* III. p. 273.
- m) *Ind. alb. hort. Lugd. Bat.* p. 50.
- n) *Hist. gener.* p. 759.

facie CASPARI o) & IOHANNIS BAUHINI p), & RAILQ),
Meum aliud minus PARKINSONI r), *Saxifraga montana mi-*
nor humillima sive palmaris MORISONI s). Quam plantam
denuo, ut sibi non visam, sapienter omisit TOURNEFORT-
IUS, nemo enim eorum, qui ex LUGDUNENSIBUS eam
repetierant, aliquid addidit ejus historiae, aut stirpem uni-
quam vidit. Sed tertio denique loco, convenire vide-
tur nostrae plantae; ex brevi unius descriptione *Daucus*
petraeus glauco folio IOHANNIS BAUHINI t), & eo magis
crediderim intellexisse nostram, quod minime in *Juræ*
asperis rara, ejus diligentiam vix potuerit effugisse. Eam
ex IOHANNE BAUHINO repetit RATVS u) & ad *Anani* re-
fert MORISONVS w), nihil addens descriptioni, ex quo
videatur eam cognovisse. TOURNEFORTIUS denuo non
habet.

§. XVII.

Circá *Biennam* passim elegantes plantulae visae sunt.
Raphanistrum genus recte dictum KNAUTIO a) ex MORISONI
ob-

- o) In *Pinace*, ejus varietatis, quae longiori, & laxiori folio in *M.*
Wasserfall provenit, cuius folia omnino simillima sunt. In *Phy-*
topinace Meum alterum umbellula alba p. 214.
- p) L. c. III. p. 2. p. 19. & CHAM. p. 383. Quaerit, an sit *Daucus*
brevissimis foliis in *M. Pilati* visus GESNERO, sed ea videtur *Dau-*
cus fuisse.
- q) L. c. p. 460. cum asterisco.
- r) L. c. p. 888.
- s) L. c. p. 273. qui in *Umbelliferis* p. 76. remouet eam a *Meo*,
sed ex sola, ut fatetur, descriptione DALECHAMPTII.
- t) L. c. III. p. 58.
- u) *Hist. p.* 460. cum asterisco, quo videtur distinxisse omnes
plantas sibi non visas neque certae notitiae.
- w) L. c. p. 295.
- a) *Enumer. plant. circa Hal. nascent.* p. 21.

observatione, *dispermon*, cum *BAUHINI* non ignoraverint quidem duos siliquae articulos, sed negligentius dissimulaverint, dicendo *monospermon*; & *Turritis Leucoji folio*, *Germaniae*, magis quam *Helvetiae* frequens, denique *Alyssi* elegans species fructu rugoso *Coriandri monospermo*. Ita voco plantam, quae ad *Alysson arvense folio auriculato acuto* I. R. H. ex naturali caractere proxime pertinet, ipso fatente LINNAEO b), habitu toto, foliis & luteis flosculis, & siliculis erectis in longis pedicellis, & earum permanente Tuba. ita simile, ut etiam absque VALLANTH.c) observatione, a *Rapistris* ad *Alysson segetum* debuerit revocari. Nunc & fructum novimus consentire, rugosum equidem, & rotundum, qui glaber est & compressus *Alyss*o, sed pariter medio septulo divisum, licet omnino unum loculum in omnibus, quos multos aperui, vacuum habeat, alterum majorem, uno triquetra semine foetum. Habitum fructus rugosum, neque inventoris GESNERII d), neque CASPARI BAUHINI e), neque LOESELII f), neque MORISONI g), icon exprimit. *Paronychia* vero *secunda* TABERNAEMONTANI h), si quidem huc pertinet, ut visum SCHWENCKFELDIO i), omnino male pin-

- b) Quo *Myagra* veterum, ex *Alyssi*, *Rapistris*, et *Myagri* generibus in unum revocavit, consentia fructus diversitate Hort. Cliff. p. 328. consentiente ROVENO. Flor. Lugd. p. 330.
- c) Qui septum in media silicula observavit Bot. Paris. p. 171. & ad *Myagra* iussit referri.
- d) Apud CAMERARIUM in Epit. Matib. p. 902. nomen additum est *Pseudo-Myagri* alia minor species vasculis rotundioribus.
- e) *Myagra* similis siliqua rotunda Prodr. p. 12.
- f) *Alyssagrum Monosperman* siliquis rotundis Flor. Pruss. p. 174. ic. 56.
- g) Sect. III. T. 23. n. 5.
- h) p. 804.
- i) p. 36.

pingitur: sed calyces ad basin silicularum certo persuadent, pertinere eam ad *Alysson campestre minus*, & verba SCHWENCKFELDI fere ea sunt, ut de eodem dixisse videatur, licet nostrae plantae nomen ex CAMERARIO exciderit. Idem *Alysson* ex comitatu *Neocomensi* habuimus a D. D. DIVERNOI.

§. XVIII.

In iisdem rupibus elegans illud *Phalangii* genus provenit, parvo flore non ramosum dictum c. BAUHINO, quod florem *Allobrogico* illo *Phalangio* minorem gerat. Non bene fecit MORISONUS a), quod id *Phalangium* suadet conjungere cum ramoso parvo flore paslim in *Helvetia* frequente. Nam id foliis quidem & habitu non humilior, flore & fructu triplo est minore, licet pinguiori; quam alterum; & planiori loco nasci amet. Deinde ad ripam lacus, in lapidoso littore serpit *Ranunculus*, quem ante aliquot annos MORATI decerpfi, eo omnino loco; ubi primum a BURSERO b) lectus est. Eum pro nova planta proposuit in *flora Laponica* LINNAEUS c); varietatum perpetuus hostis, & cum nova icone denuo AMMANVS d). Sed, nisi omnino fallor, hic ipse varietas est vulgaris *longifolii palustris*, maligno solo reptans, quae frequentes juxta caulem radículas extrudit. Namque per continuos gradus, vidi recedendo a lacu, versus uliginosa prata, majorem fieri, & latiori folio, & denique a vulgari non ultra

a) *Hist. Oxon.* II. p. 333.

b) *Ranunculus longifolius minimus reptans* in *Catal. hort. sicc. BERN-SENIANI*, qui exstat in *Act. suecic.* 1724. p. 50.

c) *Ranunculus foliis linearibus caule repente flor. Lapon.* 236. cum nitida icone T. III. f. 5.

d) In *Iconibus plant. Rusbenicar.* p. 80. T. XIII. f. 1. Nomen fecit *Ranunculus repens graminis foliis e singulis geniculis radicular agens.*

tra differre. An idem est *flammeus angustifolius* LON-
LIE? In Lacu frequens est elegans *Potamogeton*, nimis
angustis foliis pictus a JOHANNÉ BAVHINO f), lucidis, ner-
vois *Plantaginis* foliis g), qui ex imo lacu, ex orgyar-
um plurium profunditate caules et folia erigit. Pro-
ximus est, si foliorum habitum & fabricam spectes,
Potamogetoni foliis latis splendidibus. Incolae vocant
hechtenkrant, quod in sylvis hujus herbae perpetuo sub-
mersis udisque lucis sibi placeant *Lucii* pisces. Denique cre-
ber proventus est in vineis ad orientem sitis, *selenitis*
rhomboidalis quem *Pierre de Berne* h) vocaverunt acade-
mici Galli. Idem in *Stokhornio* M reperitur, & in omni
Helvetia non rarus est.

§. XIX.

Bienna profectus die 29. Junii comitem habui eum-
dem D. SCHOLLIVM, cujus come sodalicium in aliquot per
Juræ culmina itineribus, anno 1731. & 1734. alioque
per alpes suscepto anno 1732. expertus fueram. Supra vi-
neas ericetum sequitur dumosum, plurima *Rosa pim-
pinellæ folio* impeditum: deinde adscenditur per sylvam
quernam, in qua & alias montanas plantas legi, & *Pe-
dicularis* illam varietatem, quae cum nomine *Cristae galli*
angustifoliae montanae describitur a CASPARO BAVHINO a).
Est utique folio perquam angusto, habitu alto, & ramoso,

D₂

foliis,

- c) *Illustrat.* 136. in tanta brevitate vocum definiri non potest.
- f) *Fontalis lucens* major III. p. 777.
- g) Recte dictus TOURNEFORTIO *Potamogeton alpinus plantaginis*
folio L. R. H. nisi quod in omnibus, etiam ab alpinis remo-
tissimis Helvetiae lacubus reperitur.
- h) *Histoire de l'acad. des scienc.* 1724. p. 84.
- a) *Prodrom.* p. 86.

foliis, quae inter flores sunt, in caudas quasi productis; Nam quod rictu sit coeruleo, in eo nihil differt a vulgatissima *Crista Galli* calyce levi, quae & in *Germania* & in *Helvetia* fere semper coeruleis barbulis, vix aliquoties pallentibus visa est, loto palustri, prope *Bernam*. Sed, ut verum fatear, folii nervi & crenae, calyx, flos ipse, ita se habent, ut non possim recedere a priori b) sententia, et confirmator nunc hanc *Cristam Galli* ramosissimam pro varietate vulgaris *pratensis* habeam.

§. XX.

Ea sylva superata, prata sequuntur acclivia, late patentia, & fertilissima, quae multum habent de alpina indole. Sparsa per ea dumeta viam reddunt obscuriorem, quae ex *Corylis* aliquando congregantur, plerumque vero ex *Aria Theophrasti*. Ea etiam nunc nomine *Mälbaum* venit accolis. Primus inventor *GESNERUS* a *Sorbum alpinam* fecit, quo nomine bona exstat descriptio *IOHANNIS BAVHINI* b), nam icon nulla placet. *LOBELIANA* c) folia neque serrata satis, neque oblonga habet. Eam *TABERNAE-MONTANUS* d) suam fecit. *LUGDUNENSIVM* e) flores quadrifidi pinguntur, folia meliora sunt: Multa ibi *Linofyris*, *Thesium* dicta *LYNNAEO*, & *Lilium montanum* floribus reflexis, cujus petala, quando primum flos se explicat, repanda

b) *Dissert. de Pedicul.* §. IV. p. 15. 16.

a) *De hort. German.* p. 281. b.

b) l. p. 1. p. 65.

c) *Adversar.* p. 425. *Sc.* Tom. II. p. 167.

d) *Sc. omn. stirp.* p. 1021.

e) p. 202.

anda sunt, uti albi *Lilii*, paulatim vero retorquentur donec mucrone fere basin attingant f). Id vario colore aderat, etiam *album*, punctis ferrugineis adspersum.

§. XXI.

Passim ibi *Melampyrum flore minore flavo* a), mistum vulgari, & *Pyrola tuba incurva*, b) & *Dentaria* folio quino, aut septeno, neque enim veram diversitatem invenio; & coeruleo flore *Aconitum* c) sive *Napellus*, quem, nihil formidantes vulgi fabellas, & decerpimus, & nuda manu absque noxa gestavimus d): & *Geranium batrachioides montanum folio Aconiti*, & *Cacalia*, tunc in primis florem explicans. Ea autem ibi nascebatur varietas, cui folia subtus albo tomento rariori pubescent, qualis etiam in alpinis frequentior est. Altera varietas, folio utrimque glabro, in sylvis *Montis Falconarii* post aliquot dies & ipsam legi. Varietates voco, quod nihil veri discriminis, quale quidem CLUSIUS e) proposuit, in folii figura aut omni planta reperiam, tomentum vero, modo densum, & album, modo rarum &, colorem folii vix

f) Uti in *Oxycoeco* observat LINNAEUS.

a) Conf. *It. hercynt.* IX.

b) *ibid.* III.

c) Imo vero in *Britannia minore* innoxium esse, des LANDES *recueil d'obs. phys.* p. 98. uti neque alterum *Aconitum* in *Laponia* noxium est LINN *for. Lapon.* 221.

d) Nam neque gustasse venenosas plantas unquam nocuit GESNERO, non semel temerariis exprobrationem passus *Epist.* p. 57. neque demum etiam adhaesisse noxia *Epist.* p. 71. b.

e) Quod antea non ita coeant, & pediculos non striatos habeant, sed teretes, *Pannoy.* p. 501. *hist. rar. plant.* CXV. Sed in utraque invenio, modo subito mucronem inf. cordis speciem exire, modo longum esse. & triangulare folium.

vix mutet, modo foli nervi pubescant, donec glabrities perfecta varietatum seriem claudat. Nihil ergo differre puto *Cacaliam foliis crassis hirsutis*, eamque quae *foliis cutaneis acutioribus & glabris* dicitur. Ut eo minus curiofum esse oporteat in extricandis utriusque varietatis synonymis, neque CLUSIUM carpere, quod pro varietate glabra iconem dederit LOBELII f), desumptam ex stirpe du CHOUILLANA, montis nempe *Pilati*, quae hirsuta est: neque RAIUM, quod ad *glabram*, quam solam in *Jura* invenerat, ita citaverit ION. BAUHINUM, quasi is non utramque una voce comprehendisset, solam autem *glabram* proposuisset. RAI lapsum g) tamen non possumus dimittere, qui *tomentosam* conjunxit *hirsutae*; & BOECLERI enothem, qui *Cacaliam Alsaticam* proposuit h) nomine *tomentosae*, stirpis summarum alpium, sine dubio de nostra locutus. Fabrica floris ea fuit. *Calycis* quinque folia purpurea: ad basin connexa. *Flosculi* in uno flore non ultra quatuor, pauciores, quam in ulla, quantum novi, congenerum, hermaphroditi: *Tuba* in cincinnatas antennis revoluta. Ut adeo congener sit vulgari *Petasiti*. Cognovisse eam videtur CORDUS, cui *Bechium sylvestre* est i), deinde GRINUS k), eodem *Cacaliae* nomine eam demonstravit MATTHIOLO.

§. XXII.

In iis pratis *Veratrum flore albo subviridi*, & *Rapunculus folio oblongo spica orbiculari* passim exit. Ejus flos non est monopetalos, neque campaniformis, recte id contra

Tour.

f) Ex *Adversar.* p. 255.

g) *Hist.* p. 291.

h) In *HERMANNI cynosur. mat. med.* II. p. 488.

i) *Sylv. observ.* p. 222.

k) Apud MATTHIOLUM, p. 1185.

TOURNEFORTIUM DILLENII C. G. p. 65. Quinque enim ungues albi, ex quibus singulis singulae cyaneae ligulae educuntur, in cornu coeuntes, conglutinati sunt equidem ad basin, sed per maturitatem, & cornu & ungues, in quinque partes dissiliunt. Lati ungues ex quibus stamina longa educuntur, & tres Tubae unius antennae antiquam cum Campanula adfinitatem confirmant. Sili- culae tres rotundae in unum ovarium etiam connascun- tur. Caeterum ab hoc nostro vulgari certe Rapunculo, nihil differt *Rapunculus alpinus petraeus coeruleus foliis flo- ri substratis longis angustioribus* SCHEUCHZERI in *Itin. alp.* VI p. 460. frequentissime enim noster folium sub flore habet unicum. Neque *alpinus corniculatus foliis ab imo caule ad summum angustioribus* id. ib. p. 461. nam & hoc commune est nostro, & praeterea specimina Tiguro missa non differre confirmant. Multa hic *Campanula rotundi- folia alpina* quae a vulgari & habitu molliori, splendente, & foliorum ferris tener oribus, frequentioribus, etiam ad caulem, & flore latiori quasi & magis ventricoso differt, colore variabili. Hic glaucam, & pene albam vidimus, alias etiam albam, sed plerumque saturae coerulea est. Deinde per montanam planitiem, tritico consitam, per pagos *Lamblingen & Dess* versus *Linieres*, in pratis tere montanis iter fecimus. Ibi multa *Gentiana major lutea*, ut in omnibus Jurae & alpium humilioribus passuis. In ea calyx aperto flore dissiliit, spatham efficit ad unum latus hiantem, altero in quinque dentes non profunde sectam, flos ex brevi tubo, ut quasi rotatus aliquando sit, in quinque vel sex segmenta ultra dimidium sectus. Stamina quinque longis rubris apicibus inserta. Ad ortum ovarii tot viridia tubercula, quot floris sunt laciniae. Ab ex- tremo ovario repanda cornua. Semina in fusi formi ovario mul-

multa disciformia. Ergo haec *Gentianarum* certe & ob speciosam magnitudinem, & ob vim medicam princeps, differt a pene omnibus sui generis, flore ultra dimidium tubi inciso, & glandulis sub ovario virentibus; quarum notarum priorem habet SWERTIA a) LINNAEI, posteriorem non eandem, sed nectaria tamen, licet speciosiora sint &c. Ergo, si quidem separandae sunt *Gentianae*, huic principi plantae possit relinqui nomen antiquum GENTII, reliquis tubulosos, & infundibuliformes & campanae effigie flores habentibus nomen inponi CENTAVRII; cum omnino ex rei veritate LINNAEUS b) minus *Centaureum* conjunxerit *Gentianae*. Sed ut verum fatear, nimia est florum *Gentianarum* varietas, qui modo ex lato tubo modice finduntur in quatuor c) & quinque d) laciniis, pene planas, cum ornamentis, aut auricularum similibus e,) aut fimbriatis f), aut nullis g), modo ex tubo gracili ad angulum rectum reflectunt floris segmenta, cum auriculis pene ad *Lychnidum* morem h), ut certe
aut

a) *Char. gener.* 126. *Hort. Clifort.* p. 53.

b) *Char. plant.* 97. & *flor. Lapon.*

c) Brevissima in *crucata*, cui tubus modice latus est, longiora in *Gentiana coerulea* oris pilosa.

d) In *pratensi flore lanuginosa*, quae quatuor & quinque laciniis ludit, & omnibus, quae ad notas e & g recensentur.

e) Et plerumque reduplicata sunt substantia floris, segmenta minora interlicente divisionibus majorum, uti in *Gentiana Alpina magno flore*, ea quae *Asclepiadis* folio est, & angustifolia autumnali majori.

f) In utraque pilosa.

g) In *majori purpurea*, & *majori flore punctato*.

h) In *alpina pumila verna majori*; in elegantissima CAMERARII, in *Gentiana utriculis ventricosis*, in *alpina pumila centaurii minoris* folio.

aut plura genera, aut unum praestet statuere. *Glandulae* verò non ejus videntur dignitatis, ut nostrae genus mutant. *Gentiana* praeterea, cui fauces pilosae sunt, in *Jura* M. mense Junio abunde floret, in Germania demum Septembri. De ea, certe, confusissime a scriptoribus exhibita, alias dicemus.

§. XXIV.

Ad *Neocomensem* comitatum pertinet pagus *Linieres* ex lapideis aedificiis eleganter exstructus, & late patens. Inde per dumeta descendimus ad pagum *Cressier*, qui in valle est *Lacui Neocomensi* & *Biennensi* interjecta; supra quem & *Mahaleb* iterum, & *Trifolium spica longissima rubente* magna copia nascitur. Breve inde iter *Neocomum* fuit; ubi a Medico Regio D. DIVERNOI comiter exceptus, multas elegantes plantas & vidi, & accepti, quas in *Helvetia* vel nasci desperaveram, vel non inveneram ipse, ut *Euphrasiam folio tenuissime dissecto* BOCCONE a), *Valerianoidem*, & *latifoliam* b), & *angustifoliam* c), & alias. Comes ei fuit D. GAGNEBIN, qui in *Ferrariis* officinis vallis *Erguel* Medicinam utramque exercet, multasque & in *Cottiis* Alpibus, & in nostra *Helvetia*, *Juræ* que, quas incolit, vallibus rarissimas stirpes legit. Huic commode ex *Valle Rivaria* (*vaux de Ru*) adlatum fuerat gratissimum donum, *Limodorum Austriacum*, nova civis, quae specioso spectaculo mire mihi placuit. *Scapus* erat squamis temere sparsis obiter vestitus, sed longissima violacea spica ornatior, totus & ipse violaceus. *Siliqua* uncialis, orchidea. Ex ea supremum latum petalum, magnumque. Ad ejus

a) *Mus. di piant.* T. 6a: nascitur in *Creux du vent*.

b) Ad muros arcis *Neocomensis*.

c) Ex *Creux du vent*, ubi invenimus inmatutam,

eius latus duo majora petala; totidemque intercesserunt minora, qualia solent *cucullum* efficere *Orchidum*. Lata *barba*, integra, qua re differt a *Nido Avis*, & facile demonstratur CLVSIVM in *historia rar. plant. d*), non *Limodorum* quod descripserat, sed *Nidum avis* depinxisse, icone delumpta ex LOBELIANIS e). A Barba calcar conicum descendit, eaque ad fauces alba est. In centro floris *staminum* machina semilunaris, fungosa, in qua resident duo apices. Ea fabrica LIMODORVM ab *Orchide* separat, etiam si radices & habitum aphyllon repudies. Nam *Orchidi* perpetuo membranci duo cuculli sunt, in quibus petiolati apices reconduntur. Similis *Nidi avis* fabrica in mentem hic mihi redit, qua non alia evidentius *Tubae* officium demonstrat. Nempe ex suprema ovarii sede, continua erigitur spongiosa firma substantia, ex qua petala proveniunt, cylindrica fere, quae superne brevior crassum & articulatam corpusculum gerit. Id corpusculum ad superiora quidem obtusa rotunditate terminatur, inferius duos *loculos* gerit, polline luteo, plenissimos. Eos sustinet *foliolum* elasticum, paulo longius, linguae figura, terminatum sine fusco & triangulari, ortum ex inferiori sede emarginata spongiosae, quam dixi, cylindrici. Inter id foliolum, & loculos staminum, continuus *canalis* ducit in continuum ovarii *cavum*, conspicuo argumento, viam esse semini masculo staminum ad impraegnanda ova. *Orchides* eam viam habent, sed paulo obscuriorem.

§. XXV.

d) p. 270.

e) ubi certe LOBELIVM immerentem accusat IOHANNES BAHNNUS. Non enim LOBELIVS *Limodori* iconem pro *Nido avis* dedit, sed CLVSIVS *Nidum avis* exhibuit nomine *Limodori*. Potest error PLANTINI fuisse, qui omnes icones LOBELII. DORONAEI & CLVSII possidebat.

§. XXV.

Postridie lacus opportunitate usus sum, ad montis *falconarii* radicem, comitibus iisdem amicis, D. D. DIVERNOI & D. GAGNEBIN, & D. SCHOLLIO, pernoctaturus. Pulcherrima certe hic terrae facies est. Lato aequore & raro minaci lacus *Neocomensis*, separat *Juræ* radices a mollissimis clivis, qui retro se positum habent lacum *Moratensem*. Urbs cultissima, elegantes villae, pagi mundissimi, fabricae omnis generis, vineae, & permisti scopuli, retroque vineas adscendentes herbosi montes, efficiunt certe picturam, in qua vix deficit, quod placere possit. Atque jam adtigeramus plantatas ex ordine *Tiliæ*, quae pulcherrima ambulacra praebent, prope *Colombiers*, praedium celebre olim futurum possessore MURALTO a,) eminus videramus nascens in arenis ad lacum *Glaucium* flore luteo. & speciosum illud *Chamaenerion angustifolium* b), quando resistens venti vis inter Occasum & septentrionem oriunda, quam praecipuo nomine *ventum* c) dicunt, frustra diu contra conatos repulit *Neocomum*, laboris premium id solum nacti, quod paulo propius Montem nostrum conspexissemus.

§. XXVI.

Alterâ die, quae I. erat JULII, molliori jam coelo, denuo lacui nos commisimus, & sereno aëre advenimus

E 2 in

- a) Auctore *literarum de Angliæ, Franciæ & Itineribus*.
- b) *Tournefortius* Alpinum dixit, non apposite. Arenas amat, fluviorum alveos, lacuum littora. Nascitur in *Vallesia*, planissimis locis, ad ripas torrentium & *Rhodani*, in ipso alveo fluvii *Arce*, ad ostium fluvii *Wiese* propè *Basileam* &c.
- c) Athenis ocreatus magno suo merito & aquam fundens pictus est, nomine *Σαῦγυ*, *Spon voyag. en Grèce & en Dalm.* II. p 136.

in pago *S. Aubin*, qui paulo minus leuca distat a monte, quem *Falconarium* IOHANNES BAUHINUS a) vocat, vulgo a celebri *Creux du vent* nomen habet. Neque morati, postquam corpora procuravimus, imminente fine diei cepimus per agros & prata, deinde per sylvam humiliorē, & infidas umbras inclinanti soli apertas ascendere. In ea, ad montis fere radicem frequens fuit *Veronica maxima*, de qua aliqua addere visum est, cum adeo in omnibus *Floris*. rara sit, ut paucos inveniam etiam Classicos auctores, qui certo eam viderint. *Folia* equidem & habitum habet vulgarissimae, cui *folia ima rotundiora* sunt, imo verò & hoc habet commune, unde illa nomen habet. Sed altior est, & fruticosior, ut ad pedes tres, & quatuor ascendat. Deinde *folia atrovirentia*, multo acutiora habet, quam vulgaris, & *urticae urentis* simillima, acutis dentibus, longoque mucrone. Sed floris etiam evidentius est discrimen. Is in similibus racemis ex alis foliorum prodeuntibus nascitur, sed in planta multo majori minor, ut vix duarum linearum diametrum expansus superet, inaequalis equidem, ut maximum segmentum sit supremum, inum minimum, media medio modo se habeant, sed nunquam coeruleus, perpetuo languide carneus, pictus venis, quae ex albo tubo purpureae veniunt. *Stamina*, *Tuba*, *Ovarium*, non evidenter differunt, hoc compressum, emarginatum, & in utroque loculo polyspermon est. In *Helvetia* fere ubique in sylvis frigidis. Prope *Bernam* in sylva *Weilerholz*, ad algida ambulacra, quae toties adii, delectatus remota solitudine: sub clivo *Sandrein* ad *Arolam* in dumetis. Circa balneum *Weissenburg Augustae Rauracorum*, in valle *Emmenthal*, *Creux du vent* &c. *CLUSI-*

a) III. 56.

us a) eam non videtur descripsisse. *Teucrium* enim *Pannonicum* L. quod ad suam non satis dubius refert IOHANNES BAUHINUS, & ex coeruleis floribus, & ex folii figura est *Veronica supina folio Teucrii pratenfis*, qualis altior in herbosis Helvetiae collibus saepè prodit. Sed LUGDUNENSES *veronicam maximam* b) dixerunt, cum icone non mala, uti non incommoda est IOHANNIS BAUHINI c) icon, qui Genevae inventam, absque synonymo, vocat *Chamaedryn falsam maximam*, an *Teucrium* L. sive majus *Pannonicum* Clusio? Ex LUGDUNENSIBUS dixit in pinace CASPARUS *Chamaedryn spuriam majorem latifoliam*. In *Phytopinace* vero *spuriam majorem primam* d). *Chamaedrys* verò mas utraque CAMERARII e) de quarum altera dubitavit CASPARUS, videntur omnino verae *Chamaedryes* esse, non *Veronicae*. Neque *Chamaedrys fruticosa* JUNGEMANNI & HOFMANNI f) huc videtur facere, sed ad CLUSIANVM illud *Teucrium* L. Apud PARKINSONUM quod non invenio, miror. RAIUS LUGDUNENSIVM plantam non vidit g), IOHANNIS BAUHINI nomine vero dixit idem *Teucrium* L. CLUSII, h) neque MORISONUS verbis, quae exscribit, LUGDUNENSIVM, quidquam addidit i). TOURNEFORTI-

E 3 us

- a) Pannon. p. 612, & ic. p. 613. quod in *historia* 1111. est p. 349.
- b) p. 1165.
- c) III. p. 2. 286. si quidem, quod dubium est nostram velit. Eadem est CHABL. p. 428.
- d) p. 474.
- e) Hort. p. 39.
- f) Flor. Altdorf. delic. sylv.
- g) Teste Asterisco, *hiflor. pl.* p. 848.
- h) ib. 849.
- i) *Hist. oxon.* II. p. 322. L. 23. S. III. fig. 18. vocat *Veronicam maximam latifoliam* s. *querens folio*, quae similitudo non a natura desumitur.

ŭsk), GARIDELLUS l), TILLIVS m), MAGNOLIVS n) nomen habent LUGDVNENSIVM, absque ulla distinctionis nota: neque quidquam HERMANNVS o), & PLUKNETIVS p) & BOERHAAVIUS q) & AMMANN r) reliquerunt, ex quo constat, eam ipsis fuisse cognitam. Unus superest BUXBAUMIVS, qui *Veronicam* s) *pratensem omnium maximam*, in Bithynia inventam ita depinxit, ut nostrae sit simillima: neque loci natalis insignis diversitas nos terret, cum *Olympus* s) & *Cappadocia* Alpinas, *Byzantinus* autem ager Pannonicas *CLUSU* ferat, eodem teste t) BUXBAUMIO.

§. XXII.

In iisdem sylvis plurima eleganti spectaculo nascitur *Rosa non spinosa*, ramosissima, folio levi duro, flore odorato, vividissimi coloris Kermesini, centro pallente, fructu raro lenissimis spinis & ad basin solum hirsuto, plerumque levi, uti tota planta glabra est, praeter petiolos florigeros, qui hirsutiem aliquam habent. In ea planta ob-

servo

k) *Veronica maxima* IRH. in *Schol. Bot.* verò nomen habet C. B.

l) *Hist. des plant. qui naiss. aut. d Aix* p. 485. eodem nomine.

m) *Hort. Pisan.* p. 171. Nam is fere nullam *TOURNEFORTII* plantam non habet.

n) *Hort. Reg. Monsp.* 203. eodem nomine.

o) *Flor. Batav.* p. 72. cum nomine MORISONI.

p) *Almagest.* p. 343.

q) *Ind. alt.* p. 225. si quidem nostram intellexerit, nomen enim amicissimi ROYENII appositum plantae BOERHAAVIANAE videtur demonstrare, quod *Teucrium* l. sub nostrae nomine in horto Leydeni alatur. *Flor. Lugd. Batav.* p. 303.

r) *Char. plant. natur.* p. 327.

s) *Cent. I. var. plant.* p. 23. T. XXXIV.

t) *Centur. II.* p. 25.

ferro , I. Omnino huc pertinere ; *Rosam sylvestrem* quae a *Maja* nomen habet , spinis non perinde minacibus GESNERI a). Nam idem *Rosas majales sine spinis* vocat alibi b). Deinde II. *Rosae sylvestris genus tertium* TRASI c) iisdem pene vocibus describi , quibus GESNERVS usus est , & eodem pertinere : Ut adeo *Rosa sylvestris odoratissima rubro flore* CASPARI BAUHINI expungi possit , & ad *Rosam* ejus X. referri , quo & XIX. revocari debet. CORDI certe quarta *Cynobatos* , d) si lanuginosa & incana folia habet , longe utique a nostra distat. Deinde *Rosa saxatilis minima flore ruberrimo* CAMERARII e) cujus icon admista esse videtur aliis *Rosis* in una tabella depictis , satis similis est nostrae. *Rosa Graeca* & *Cynorrhodon leve* ex monte *Pilati* f) odoratum LUGDUNENSIVM nostrae est , & facit , ut nostrae eadem sit *Rosa canina spinis carens biflora* CASPARI BAUHINI. *Rosa alpina pumila spinis carens* , BURSERS g) omnino huc pertinet. Bona vero descriptio est IOHANNIS BAUHINI h) , quae & RAI i) est , uterque , vero in *Jura M.* nostram legit. Nam in *Dolas M.* & in asperis rupibus , qua ex *Vogelberg* descenditur in *Wasserfall* , eandem legi anno 1736. *Rosa Provincialis minor* k) quam

a) *Hort. Germ.* p. 126.

b) *Tabb. coll. stirp.* p. 102. b.

c) p. 988.

d) *In Dioscorid.* I. c. 124.

e) *Epic.* p. 99. GESNERIANAM in *horto Medico* p. 144. *Cinnamomeam simplicem* vocat.

f) p. 126.

g) *At. succic.* p. 535.

h) *Rosa rubello flore parvo simplici non spinosa* II. p. 39.

i) eodem nomine RAI p. 1470. & *Syll. stirp. exter.* p. 219.

k) p. 1085.

quam ad nostram excitat TOVRNEFORTIVS, nihil mutata sententia per reprehensionem IOH. BAUHINI, ea manifesto spinosa est.

§. XXVIII

Paulatim *Aria* & *Ranunculus montanus aconiti folio* frequentius visi. Et hic quidem trium, quatuorve pedum altitudine, semper idem visus est cum Alpino humillimo. Deinde *Thalictrum alpinum aquilegiae folio staminibus floribus, albis, flavis, & purpur ascensibus*: *Cyanus major*; *Oreoselinum majus*; *Christophoriana*: *Prenanthes VAILLANTII latifolius flore purpureo*: *Melissophyllum albo, & carneo flore*. *Valeriana alpina folio scrophulariae*: *Geum rotundifolium majus*: *Polygonatum angustifolium non ramosum, & aliud flore majore odore*: *Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachiana, & aliud asperius Conyzae folio*; *Myrrhis palustris latifolia*; *Dentaria*; *siler montanum*; *Lonicitidis aspera*; *Polypodium angustifolium flore vario, omnino alio genere, & proprio, dignum, cum inter nostras filices solum seminalia folia propria, & diversa gerat a sterilibus a)*. *Laserpitium foliis latioribus lobatis*: *Melanpyrum floribus parvis luteis*; pluresque aliae.

§. XXIX.

Frequens erat ad viam, uti in omnibus Alpium humilioribus pascuis non infrequens est, *Cardui* genus, vulgare, sed obscurissimae notitiae. Ego *Cardium mollem* voco, *foliis rigidis molliter spinosis*; *scapo longo paucifloro*. *Radix longa lignosa est*. *Caulis unus plerumque, aut plures, erecti; cubitales, & ultra, alis foliaceis spinosis passim obducti, quas faciunt foliorum initia, priusquam*

a) RUPPIUS *Spicant* dixit. An LINNAEUS ad *Aerosticha*?

a caule recedant. *Folia* solida, & dura, perpetuo glabra, nervo medio conspicuo, margine omni mollioribus, & perexiguus spinulis aspero, alias pene integro, ut falicina aemulentur, alias dentato, alias profunde, & varie laciniato; Color hinc sature viridis, inde caesius, sive ex glauco pene vires, non sine lutei mistura. *Rami* paucique fere non foliosi, *florem* gerentes, qui erigitur equidem, sed postquam vigor plantae declinavit, pendet et invertitur. Is magnus est, colore ex laeta purpura diluiori. *Calycis* squamae longae, simplices, innocuae, apice non recurvo, virentes, mucrone saepe purpurascente. *Flosculi* numerosi, in quinque lacinias profundissime secti. *Tubus* longus, *Staminum* cylindrus alba eminens, purpurea: *Tuba* simplex; *Semen* striatum, coronatum, pappo simplici, argenteo, in thalamo papposo. Huius, adeo frequentis plantae, antiquam descriptionem nulla reperio. Nam etsi utcumque convenit icon *Cirsii* majoris singularibus capitulis magnis, C. B. quae exstat in *Observationibus* LOBELII a), diversissima tamen est, habitu, & plumoso pappo. Ita *Cirsium Pannonicum primum pratense* CLUSII b) foliis quidem caesiis convenit, & loco natali, & habitu monocloro; sed diversum esse, ex *herbario vivo* CASPARI BAUHINI didici, atque refero nunc ad *Cirsium* simile nostro *Carduo*, sed mollius, quod in altissimis pratis les *Mosses* inter *Aquilegiam* & *Chateau d'Oex* olim reperi. Sed BAUHINORUM prima hic est inventio. Et varietas quidem laciniatis foliis, est *Carduus* dictus *Cirsium*, folio laciniato nigrius IOHANNIS BAUHINI c) lectum in *Wasserfall & Thurni*, Jurae partibus

a) *Cirsium majus* IC. 582.

b) In *Pannon.* 696. & in *hister.* CXLVIII.

c) III. L p. 43.

bus, frequens etiam mihi visum est. Inde RAVVS d), qui prope *Genevam* eandem plantam reperit, historiam non illustravit. MORISONVS e) male retulit ad *Cardium Asphodeli radice*, neque enim tales sunt nostro, neque dixerat IOHANNES BAVHINVS, sed *Hellebori nigri* similes. Verum alter frater, CASPARVS, in eodem *M. Wasserfall* idem invenit, descripsit, dixitque *Cirsium angustifolium* f). Inde *Cirsium angustifolium Germanicum* PARKINSONI g). Recentiores, & princeps TOVRNEFORTIUS, nihil addunt. Sed altera varietas, *foliis integris*, in eodem *M. Wasserfall* lecta est a CASPARO BAVHINO, ibique, & protinus supra *Dornach*, etiam ego inveni. Id nominavit *Cirsium capitulis singularibus parvis* h), & synonyma fecit *Cirsion* DODONAEI i), *Cirsium III. montanum* I. CYNTHII k), *Cirsium alterum* LOBELII l), haec certo, *C. ALPINI* ANVM ex conjectura. Verum id, simile utcumque nostro, in maritimis regionum calidarum provenit, ubi & RAYO visum est, loco certe remotissimo a subalpino, quem nostrum solum amat. LOBELIUS omnem similitudinem excludit, quando caules *teneros* dicit: DODONAEVS autem *Laducae* foliis comparat, cum nostro folia sint duritie *Lauri*, caulisque firmus. Figura, uti in universum non re-

d) *Syll. plant. extra Brit.* p. 85. *hiflor.* p. 305.

e) *III.* p. 151.

f) *Prodr.* p. 155. *Caral. plant. circa Basil.* p. 102. & *Pin.* p. 377.

Idem nomen exilat in *Rau Syllog. plant. extra Brit. nasc.* p. 59. & in I. R. H.

g) p. 962. *Theatri.*

h) *Caral. plant. circa Basil.* p. 102. *Pin.*

i) In *purgant. hiflor.* p. 45. *Pennstad.* p. 737. edit. 1616.

k) *Pannoni.* p. 655. *hiflor.* p. CXLVIII.

l) *Obferv.* p. 314. *Alcorf.* p. 251. *Icon.* p. 382.

recedit, ita nimis ramosa, & frondosa est. Nisi velimus CLUSIANAM plantam cum nostra conjungere, DODONAEI & LOBELII stirpem, utcumque eadem omnes icones sint usi, separare, & a nostro, & a CLUSIANO Carduo. Quod, & si non probabile videtur, forte non esset a vero remotum. Nostram enim plantam CLUSIUS, qua erat diligentia, vix potuit non vidisse. IOHANNES tamen BAYHINUS & RAIUS nullibi ejus in Helvetia inventae meminere, sed exscripserunt eam ex CYSIO.

XXX.

Jamque enixi per sylvam, aliquamdiu delectati pulcherrimo prospectu per lacum *Neocomensem* & pagi *Aventici* magnam partem latissime patente, per angustam vallem, multam sylvis & pascuis, iter nostrum ursumus. In sylvis *Cacalia* glabro folio, & *Campanula* folio *drabae* minoris nascuntur. Erad hanc quidem, quod confusior sit ejus historia, aliquas animadversiones addimus. Radix unus est nappus scaber & teros. Caulis angulosus rectus, ad duos pedes, & ultra. Folia leniter hirsuta, & aliquando glabra a), ora acute denticulata, brevi acumine, & aliqua *urticae* similitudine. Calyx capillaribus segmentis, floris color semper visus est coerulescens intensus. Multi caeterum ex alis foliorum, uno fere versu prodeunt in raram spicam, & in eo, uti toto habitu, *campanulam boetensem* rapunculi radice refert. Ea est *Campanula Drabae minoris foliis* CASPARI BAYHINI b), qui ex *Thermis Valesiis* habuit, ubi copiose eam legi; nam in alpinis pratis, & praetera similibus locis &

F 2 in

- a) Id ideo addo, quod JOH. BAYHINUS suam *serotinatiori* glabram dicat, CASPARUS vero suam, folio *Draba minoris* subasperam.
b) Prodr. p. 36. & in Pinace.

in *Ursaria* valle, & circa *Candersteg*, & in *M. Suchet*, qua parte ad pagum *Baume*, viperarum copia non incelebrem, descenditur, non rarior est. Ex eo PARKINSONVS c), & RAIVS d), & TOURNFORTIVS e) eodem servato nomine. Deinde ipse TOURNFORTIVS huc revocavit *Rapunculi* genus folio serrato rotundiore f) JOHANNIS BAVHINI, quod ex *Stiria* habuit, consentiente SCHEVCHZERO, neque recedente icone JOHANNIS. Erit ergo *Campanula stiriaca* nonnihil hirsuta imis foliis rotundioribus per ambitum profunde crenatis PLUKNETI g), & *Rapunculus* folio serrato rotundiore flore convolvuli MORISONI h), qui JOHANNEM sunt secuti. Sed omnino etiam videtur huc facere *Campanula alpina* urticae foliis minor, floribus reflexis, & unico ordine dispositis flore coeruleo PONTEDERE I), quam pro nova dat, diversam solo colore a *Campanula alpina* glabra flore dilutissime coeruleo JOHANNIS BAVHINI k). Nam & haec, repetita a MORISONO l), TOURNFORTIO m), RAIO n), TILLIO o), nostrae eadem omnino videtur, quam siccam, quod non temere autumno, acceperat

c) *Theatr.* p. 646.

d) p. 733. cum asterisco. *Syll.* p. 81.

e) I. R. H. & *Schöl. Bot.* p. 75

f) II. p. 798. CHARR. p. 261. SCHEVCHZ. *It. alp.* 1. p. 47. Simile nomen est *Campanulae foliis subrotundis* CASPARI BAVHINI, sed eam in nostris meis inventio folio paulo rotundiori a nostra differre.

g) *Almagest.* p. 77.

h) *Hist. Oxon.* II. p. 455.

i) *Comp. Tabular. Botan.* p. 74

k) II. p. 8. 6. CHARR. p. 263.

l) *Hist. Oxon.* II. p. 453.

m) I. R. H.

n) *Hist.* p. 733. cum asterisco.

o) *Hort. Pisan.* p. 49.

rat ab AGERIO BAUHINUS, colore vitiatum, ut solet. Denuo, idem est p) *Rapunculum Teucrii folio BARRELERII* q), qui *Rapunculus* est *alpinus Teucrii folio rhomboidalis* COCCONIS r), & *Campanula alpina Teucrii folio angulato* I. R. H. Tandem eadem omnino videtur nostrae, *Campanula hortensis rapunculi radice* SCHEUCHZERI s) in *valesiorum* altis pascuis lecta, cum ea *Campanula* similis utique nostrae, & maxime calycis latis segmentis diversa, alia loca & alpina non amet, nostra vero, iisdem locis in *Valesia* frequens sit.

§. XXXI.

In pascuis, quae in mediis sylvis pinguiissima offendimus, pulchra *Orchidum* genera proveniunt. *Orchis purpurea spica congesta pyramidalis*, cujus egregiam iconem debemus DILLENIO, a) & *Orchis rotundus DALECHAMPI* b) frequens in *Juræ* pratis, sed & in praecaltis alpium graminis a me repertus in *M. Robtenborn*. Tenuis ejus est memoria. LUGDUNENSES brevem historiam habent, iconem adeo rudem, ut pene sit inutilis. CASPARUS BAUHINUS nihil addidit, praeter falsum epitheton *lutei* floris b), quod (ad emendationem forte FRATRIS) correxit in *PINACE* c). Nihil JOHANNES BAUHINUS d) addidit, nihil RAIUS, praec-

F 3

- p) Consentiente SCHEUCHZERI. l. c.
- q) *Icon. pest. 467.* quae bona est.
- r) *Mus. di Pianto* p. 75. T. 61.
- s) It VII. p. 110.
- a) *Synops. RAJAN. III. T. XVIII.*
- b) p. 1556.
- c) *Phytop.* p. 122.
- d) Ubi dixit *Orchidem globoso flore.*
- d) Nomen retinuit DALECHAMPI. II. p. 765.
- CHARR. p. 450.

præter locum natalem e). PARRINSON f), MORISON g), TOURNEFORTIUS h), & qui nulla stirpe caret, TILLIUS i), non videntur plantam vidisse. VAILLANTIUS k) etiam expungere conatus est. Nomen ejus habent etiam SCHEFFERUS l), KNAUT m) & BUXBAUM n), & THALIUS o) citant auctorem. Sed THALIUS quidem *umbellatum* florem dixit: Ipsi vero nihil addiderunt, ex quo discamus, quod plantam nostram viderint. Sed nimis singularis est fabrica floris, quam quae omittatur. *Testiculi* quidem de more, & *folia* oblonga modice acuminata, conveniunt generi. *Spica* brevior est habitu, & densissima, qualis in nigra est. *Foliola* sub ovarii longula. *Ovarium* longum, & gracile. *Barba* trifida, segmentis lateralibus simplicibus, medio leniter trifido, interjecta divisioni spinula, punctato. *Cuculli* vero petala ab omni alia *Orchide* remotiora, nam omnia in longam caudam gracilissimam producuntur. Eorum duo, quae interiora sunt, puncta etiam habent. *Color* vero ubique roseus. *Calcar* longum. *Machinula* *Staminum* ex more gentis. Possit ergo verissime dici, *Orchis spica brevi densa petalis caudatis*.

§. XXXII.

e) *Hystor.* p. 1216. cum nomine C. B. invenit in montibus circa *Genavam*. In *Syll. plant. exira Brit.* p. 191. *Orchidem* rotundam DAL. vocat & CASPARUM contra FRATREM male defendit.

f) *Cynosorchis capitulo globoso*. *Theatr. Bot.* p. 1345.

g) Cum nomine C. B. III. p. 492.

h) Eodem. I. R. H.

i) *Hort. Pisan.* p. 124.

k) In *Botanic. Parisin.* p. 193. refert ad *Orchidem Pannonicam* LILL. CLUSII.

l) *Orchis rotunda* Dal. *delic. Bot. Halens.*

m) *Orchis rotunda flore paniculo magno*. *Enum. plant. circa Hal.* p. 71.

n) *Enum. plant. curatior.* p. 241. eodem nomine.

o) *Orchidis species flos in umbellam* *Sylv. hercxm.* p. 81. 81.

§. XXXII.

Cum ea & hic, & in pratis *Grandvi*, uberrime provenit *Orchis palmata angustifolia Alpina nigro flore* a), odore non adeo, ut in alpebus eximio, qui oleum-caryophyllorum stillatitium aemulatur. Accolae vocant *Jalouffe*. Planta nota est. Flos singularis, & nifallor, non satis cognitus. Spica densa est & brevis. Foliola sub ovariiis longa, purpurea. Ovarium brevissimum, valde pro portione longitudinis latum. Flos inversus. In angulo nempe acuto, inter ovarium & scapum intercepto, Calcar est brevissimum, ut pene nullum sit, & Barba ad latus duobus dentibus incisa, lata & triangularis, hederæ folio non abfimilis. Sed Calcar & Barba solent sub ovario esse, in angulo ovariiis cum scapo obusto. In eo vero loco in *nigra* Orchide cucullus est, qui quinque fit petalis, quorum duo reliquis angustiora sunt. Haec omnia ex atro purpurascent. Domuncula staminum coccinea, apices lutei, ut in *Orchide fucum referente*, nam in plerisque speciebus sunt virides. Commode itaque diceretur *Palmata angustifolia flore supinato, calcare brevissimo*.

§. XXXIII.

Superata hac valle, per sylvam abiegnam, ingruente nocte, non absque aliquibus erroribus, per tenebras in alpinam calam, sed lautiozem, pervenimus, haud procul *Noiraigne* pago vallis *Travers*, sub ipsa ima valle, quae dicitur *Creux du Vent*. Ibi fragis melle & lacte liberaliter excepti, ut solennis jubet *Helvetiorum* monticolarum hospitalitas, quieti

a) Omnium primo dicta *REPUBLICANO* in *Stachniade*, quae apud *GENÈVÈ* de *M. Fraiss.* profluit, anno 1736.

b) Neque bene descriptus a *SCHREUCHZERO* *It. alp.* IV. p. 332.

ti nos dedimus, nam ante diluculum viam denuo ingressi sumus, die II. Julii. Non *Digitalem* parvo flore, neque *Trollium* valde morati, quae plurimae ibi nascuntur, pervenimus ad scendendo in *caeam* vastissimi amphitheatri, solidis & abruptis ad perpendicularum rupibus in semicirculi speciem cinctam, nova loci facie. Pater vero & ad vallem, unde veniebamur, & ad occasum per difficilem aditum *le pertui de la bise*, ad orientem demum faciliori per sylvam adscensu. Paululum substitimus mirari altissimos quasi muros, nulla mantis opera erectos, falconum, & vulturum tutissimas arces, deinde incumbentes angustae valli aeternas sylvas, ex frequenti ruina, quam dederat venti iamannis faevitia per omnes fere *Helvetiae* sylvas, etiam magis, & horridas & inpeditas. Sed statim porci ex gelidissimo fonte, diversos in calles secessimus, conventuri denuo in pascuis *Grandvi*. Ego ad Orientem adscendi, per salebrosam viam mediasque sylvas. Ibi plurima *Lunaria siliqua longiore*, & *Gardamine hirsutior*, loco subhumido & umbroso.

§. XXXIV.

In iisdem umbrosis & udis, similibusque locis per omnia montana *Helvetiae*, multum provenit *Leucojum vernum perenne album majus* a), cujus non memini, quod aut raram, aut monendum sit, idem esse *Leucojum vernum perenne album minus* L. R. H. b), id enim dudum alii senserunt: sed ut comparem cum *Turritide minore* c) L. R. H. Ab ea enim planta, nae non facile utique distinguet, qui utramque plantam per varias aetates persecutus fuerit. Folia, flores siliquae,

a) *Draba* II. CLUS. Pannon. p. 92. *hiflor.* CXXIV. CXXV. bené.

b) *Draba* III. *succulento folio* CLUSIV. *hifl.* CXXV.

c) ZANICHELLII icon 170. & C. B. *Prodr.* p. 42. nomine *Erysimo similis hirsutae albae*, commodae sunt.

liquae, similia sunt. Ego sollicite comparatis multis utriusque speciminibus, invenio florem *Leucojo* paulo majorem, si quas paulo latiores esse, habitum magis brachiatum, & proerubentem, siliquas a caule majoribus angulis recedentes, folia patulo, sed non multum, profundius serrata. Varietas *Leucoji* incolae luminarum alpium saepe flores habet lividos fere violaceos. Sed & ad *Turritis minor* imitatur. *Nectarja*, quae LINNAEUS d) in *Leucojo* nostro invenit, & tanti facit, ut etiam genere distinguat, ea in meis siliis invenire non potui. An quod de diversis planis loquamur?

§. XXXV.

In iisdem nemoribus, conspicua statura erigitur *Carus* mollis foliis imis laciniatis, superioribus integris, squamis calicis reflexis. Is, quoniam paucissimis cognitus est, meretur describi. Folia ejus ima valde a superioribus discrepant, suntque *Dipsaci* laciniati, aut *Acanthi* foliorum non dissimilia, costa lata, ad quam primo vagae solutaeque pinnae junguntur, deinde latiores, & ipsae non leviter serratae, quarum ultimae in latum quasi urticae folium, longum, mucronatum, acutè serratum conflunt. Omnis margo mollissimis pilis quasi ciliis ornat. Pars cauli obversa subhirsuta est leviter, prona album tomentum ad nervulos habet, sed tenue, & rarium. Suprema folia absque ullis pinnis, uno continuo ambitu terminantur, ex difformiter elliptico productiori, paulo magis tomentosa. Caulis altissimus est, videlicet qui meam statuari superaret, profunde

d) *Char. gener.* 544. *Hort. Cliffort.* p. 335. *Flor. Lapon.* 257. *Humboldtii* ROYENII & ipse ad *Arabiam* select. *ser. Acad. Prodr.* p. 339.

fulcatis, alis spinosis subinde abundans, fragilis. Flores ad caulis & ramorum vertices congesti, & seni septenive ad unum petiolum sessiles, quam primam cum *Lappa* similitudinem habet. Sed calyx & ipse *Lappam* imitatur, gracilibus squamis, quarum apex mutata directione vel ad latus, vel retrorsum etiam, gracili mucrone flectitur, in eo diversus a *Lappae* calyce, quod non brevissimo hamulo, circulariter flexo, sed longo mucrone, eoque utcumque falcato terminetur. Flosculi purpurei profunde disseci. Seminis pappus simplex, quo a *Cirsii* VAILLANTII differt. Passim in Jura provenit, v.g. ad longam illam acclivemque viam, quae ab Orvins versus M. Chasseral ducit; deinde in valle Grindelia in dumis, priusquam pagum subeas; in valle Ursaria, & circa Thermae valesiorum ad sepes. Non est certe noster, *Cavdus mollis latifolius* a CASPARO BAUHINO in *Prodromo* a) descriptus, quem *Lappae capitulo* vocat in *Pinace*. b) Nam folia ei tribuuntur rumicis. Neque *Cirsium acanthoides altissimum polycephalon Lappae capitulis VAILLANTII* c) utcumque nomen conspiret; nostro enim pappus non est plumosus. Sed omnino videtur huc referri debere *Cirsium majus caule alato polycephalon capitulis majoribus personatae aemulis* a SHERARDO lectum in Jura M. prope Geneva d).

XXXVI.

Passim in humidis *Chrysosplenion* provenit, quod in Germania semper alternis foliis provenire, & differre a DODONAEI a) *Saxifragia aurea*, dudum ante PETITUM b) obser-

a) p. 155.

b) p. 377.

c) *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1718. p. 203.d) *In syll. Stirp. extra Brit. nasc.* p. 399.a) *Pemptad.* p. 316. qui conjugata folia pinxit.b) *Lettres d'un Medecin Namur* 1710, lettre III. p. 39.

servavit JUNGIUS c). Deinde & prius, quam penitus ex sylva ad scopulos perveniatur, *Cynoglossum minus folio virgato*. Tum vero paulatim tenuior sylva, graminea spacia relinquit, quibus ad Austrum modicæ rupes opponuntur. Ibi, mutato loci ingenio, subito multæ plantæ proveniunt minuriore, & magis alpinæ.

XXXVII.

Primam memoramus *Bistortam alpinam minimam*, quæ adeo sæpe repetita est apud Scriptores rei herbariæ, ut operæ precium videatur dispersas nomenclationes in unam colligere. Antiquissimum nomen est ARETH a), quæ *Bistortam minimam* uno in caule foliolo legit in *Nesso*. GESNERUS Limonii speciem minorem b) dixit in altis montibus nascentem. Deinde CLUSIUS *Bistortam minorem* c). In ejus icone folium imum ellipticum desideratur, nervi tamen ad oram folii exprimuntur. Sed CAMERARIUS d) iconem eximiam proposuit, quæ folia ima elliptica, nervis ad oras exiguis, egregie exprimit: verum eam a GESNERO habuisse videtur, plantam ipsam parum cognovisse, siquidem alibi e) cultu in vulgarem speciem degenerasse dicit, quod in tanta diversitate feminis folique fieri posse non videtur, CLUSIANAM vero, æque nervosis foliolis, æque longispica & gracili præditam, a sua distinguit. LOBELIUS minoris & minimæ in *Adversariis* f) absque distinctione, in *Illustra-*

G 2

ff

c) De homon. plant.

a) Post CORN. p. 234. b.

b) Add. ad p. 265. de bort. German;

c) Pannon p. 478. bistor. LXVIII.

d) *Bistorta minor* f. *Alpina* Epit. p. 634.

e) Dicitque *Bistortam alpinam minimam* hort. p. 24.

f) p. 121.

tionibus g) vero *Bistortam minimam nostratam* pro nova describit, incertum, qua nota distinctam. JOHANNES BAUBINUS h) ut solet, sapiente consilio usus, CLUSII & CAMERARII plantas conjunxit. Contrario more FRATER CAMERARIANAM in *Phytopinace* i) *minorem*, in *Pinace* *alpinam* PARKINSONIANAM vero illic quidem *minorem alteram*, hic *alpinam minorem*. PARKINSONUS una addita ex LOBELIO tres habet, *minorem nempe nostratam* k) a LOBELIO, *minorem alpinam* l) ex CLUSIO & CAMERARIO, & *minorem pumilam variam* m) ob foliorum diversitatem denuo pro nova. Ab eo tempore etiam aucta est confusio; cum enim MORISON in horrendi stirpe, per ocium observato semine, id rotundum esse inveniret in *Genevensi* & *Wesmorlandica*, PARKINSONIANAM vero, incertum ex qua traditione, existimaret simile semen habere vulgari, tres denuo plantas fecit, *Bistortam minorem seu Alpinam* n) ex CAMERARIO o); *Bistortam pumilam* foliis variis rotundis & longis ex PARKINSONIANA varia p); *Bistortam alpinam minimam soboliferam* q) ex CLUSIO, nam & is suo tempore jam observaverat, ludere *pumilam Bistortam* foliolis loco seminum in spica provenientibus. *Minorem vero nostratam* PARKINSONI omisit, aut tacite junxit *soboliferæ*. Idem in iconibus etiam multiplicavit.

g) p. 80. Semen primum subrotundum describit.

h) *Bistorta minima* III. p. 539. ex M. THURRI CHARR. p. 507.

i) p. 357.

k) p. 392. pro distincta a stirpibus veterum. Id nomen habet MORISON in *Bert. Blaf.* p. 29.

l) *Ibid.*

m) *Ibid.*

n) *Hist. oxon.* II. p. 585.

o) Qui & ipse, si recte video, semen habet gigartinum in iconc.

p) *Ibid.*

q) *Ibid.*

vic errores. Nam pro *maiore radice magis intorta* nostram pinxit, ex crenis marginalibus facile agnoscendam, CAMERARIANAM vero, quam a CLUSIANA in descriptione separaverat, conjunxit in iconē r). RAJUS, sapiens scriptor neque amans specierum inutilium, feminis figura motus, quam vere existimaverat observatam a MORISONO, *Bistortam alpinam punctilam variam* f) PARKINSONI sibi non visam, separavit a sua *Genevensi*, etsi penultimo certitudinis gradu constare videatur non duas, diversissimo semine; *Bistortas* in alpibus nasci, quarum utraque folia ima subrotunda, reliqua longa habeat. Idem RAJUS non ausus est *Bistortam alpinam mediam* t), nempe CAMERARIANAM, conjungere CLUSIANAE siue *minori* u), cum omnino evidens sit, iconem siue GESNERII, siue CAMERARII, nostram exprimere foliis ludentem, oris crenatis, *Juræ & alpium incolam*. Ergo & PARKINSONUS, & MORISON, & RAJUS tres reliquerunt *Bistortas* species, quæ nihil a se invicem differunt. Eadem deinde ratione HERMANNUS w) & *mediam alpinam* ex CAMERARIO habet, & *alpinam minimam subuliferam* x) ex CLUSIO. SUTHERLANDUS y), SIBBALDUS z) VOLCKAMER aa), BOER-

G 3

HA-

r) *Seft. V. T. 28. f. 3. & 5.*

f) *Hist. p. 137. In Synopsi III. p. 147. vocat Bistortam alpinam minimam foliis imis subrotundis, & minutissime serratis, quod nomen, ex PLINIIETIO ortum, fere definitio est nostræ, licet pro nova, & a CLUSIANA & CAMERARIANA distincta exhibeatur.*

t) *Syll. stirp. extra Brit. nasc. p. 77. & Hist. I. c.*

u) *Cat. plant. Angl. p. 42. Hist. 157. Syn. III. p. 147. quo revocat minorem nostratem PARKINSONI.*

w) *Flor. Bat. p. 140.*

x) *Flor. Bat. I. c. Hort. Lugd. Bat. p. 89.*

y) *Hort. Edinb. p. 50.*

z) *Scot. illustr. p. 13.*

aa) *Flor. Norv. p. 64.*

HAAVIUS bb) hoc nomen repetierunt. TOURNEFORTIUS cc) vero, MAGNOLIUS dd), TITA ee), & TILLI ff) *alpinam minorem* vocaverunt post CASPARUM BAUHINUM. Et TOURNEFORTIUS gg), & TILLI hh), *alpinam mediam* distinxerunt, eundem fecuti. PLUKNETUS ii) *alpinam mediam* ab ea separat, quam eo nomine dixit, quo usus est DILLENIUS in *synopsi* III. RAN II). Interim in ultimo septentrione visam vir industrius MARTENS mm) eam depinxit: MENZELIUS nn), ex varietate CLUSIO & MORISONO visa, dixit *minimam spica prolifera sive foliolis ex spica proliferis*, & ob eandem varietatem RUDBERIUS oo) *Bistortam alpinam minimam soboliferam*. SCHEUCHZERUS *alpinam pumilam variam* dixit pp). PONTEDERA observavit, florem plerumque album esse, quod verum est, novum nomen qq) fecit, quod non erat necesse. WEINMANNUS rr) pro more suo, ita depinxit *Bistortam alpinam minimam*, ut nemo agnoscat. LINNAEUS ss) *Bistortam* dicit

bb) *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* II. p. 87.

cc) *Schol. Bot.* p. 7. I. R. H.

dd) *Bot. Monsp.* p. 33 & *H. R. M.* p. 33.

ee) *Hort. Maurocen.* p. 28. & *It. alp.*

ff) *Hort. Pisan.* p. 24.

gg) *Schol. Bot.* I. c. & I. R. H.

hh) I. c.

ii) *Almagest.* p. 68.

mm) *Bist. min. alp. foliis imis subrotundis & minutissime serratis.*

nn) *It. Spitzberg* c. 7. T. I. lit. a.

oo) *Fugil. plantar.*

pp) *Alt. succic.* p. 96.

qq) *Inventam in Rhætiae Alpibus* It. II. p. 130.

rr) *Bistorta minima candida comp. Tab. Botan.* p. 29.

ss) *Phytanthozeiconograph.* T. 245.

tt) *Flor. Lipen.* 152. *Hort. Cliffort.* p. 150. Idem nomen exstat apud ROVENIUM p. 217. cum synonymo CLUSIANO.

dicat foliis lanceolatis, & ad eam refert, post MORISONUM, illam folio minus rugoso radice magis intorta, quam pene certus sum esse varietatem vulgaris majoris, nullas ad oram crenas, neque spicam gracilem habentem, neque folia ad terram elliptica, uti ex iconibus FUCHSII comparatis (r) satis constare potest. Eas notas, cum non habeat *Bistorta montana minima* BARRELERII (uu), ad majorem potius videtur referenda esse. Tandem AMMANUS (ww) *Bistortam* describit in Sibiria lectam, quae procul dubio eadem nostrae est, flore albo, semine subrotundo, sobolifera. Reliqua vero omnia nomina, adeo multa hic recensita, sunt *Bistortae foliis variis ad oram nervosis, semine gigartino*, quae ubique, & in editioribus *Juræ*, & in alperis alpium pascuis provenit.

XXXVIII.

In illis lapidosis plurimus provenit *Ranunculus* ille albo flore minimus, de quo loco opportunitiori dicetur a), & *Saxifragia sedi foliis serratis, & Filicula saxatilis caule tenui fragili*, & pulchrum *Alchimillae* genus folio quinquesolii subtus argenteo a*), in alpibus & *Jura* passim frequens, cujus ideo memini, ut separem ab *Alchimilla alpina quinquesolia* CASPARI BAUHINI b), quae, cum eadem sit cum *Alchimilla alpina pentaphyllea minima lobis fimbriatis* BOCCONE c), nostrae aliquando

re) p. 773. 774. conf. It. *Hercynic.* xii.

uu) Icon. 489.

ww) *Plant. Rutben.* n. 243. p. 199.

a) §. LXXVII. LXXXI.

a*) Cujus egregia icon est Gesneri apud CAMERARIUM *epit.* p. 908; Alibi *Argentariam* dixit, *descr. mont. frast.* p. 61. & *Argentariam petraeam hort. German.* 248.

b) *Prodr.* p. 138. & *Pin.*

c) *Mus. di plantae*, p. 18. T. I.

quando non optime conjuncta est ab eximio LINNAEO c) Haec enim nihil habet villosi, neque argentei, & folia multo minorius. *Ranunculi* quadam forma divisa, summorum alpinum incolae. Character nostrae idem est cum *vulgaris* quamor staminibus, femine. Umbilicus calycis villo expletur, qui saepe fulcus & niger fit, unde singularis plantae habitus oritur.

XXXIX.

Multa etiam ibi *Androsace alpina perennis angustifolia glabra*, quae plerumque flore est multiplici, diversissima a *Diapensia* LINNAEI a), quae mihi incognita & nova stirps visa est. Nostrae enim certe calyx semiquinquefidus, & *Gampanula* calyci similis est, quam praecipuam adfinitatem habet cum *Androsace altera* MATTHIOLI b). Neque enim novi, num ea decem illas nostrae glandulas habeat in centro tubi floris, ubi expanditur, facientes corollam, qualis est in *Scorpiuro palustri*. Calycem vero communem certo nostra non habet, nec peculiaris calycis folia serrata, neque floris segmenta integra d), neque magnam illam calycis ad florem rationem e), ut folia omittam, quae non bene characteri *Androsaces* inmiscuit magnus BOERHAAVIUS f). Caeterum nostrae commodam iconem dedit CLUSIUS g). Tres alias Helveticas, adgnatas nostrae, alias dicemus.

XL.

d) In *for. Laponica* 67. Nam in *herbo Clifortiano* sententiam mutavit.

a) *Flor. Laponic.* 88.

b) Cujus pulchra est icon in *Epist.* CAMERAR. p. 639.

c) TOURNEFORT. I. R. H. T. 46. A.

d) ibi dicitur: *Androsace alpina* plantae gen. 22.

e) Nostrae enim flos facile ultra calycem expanditur.

f) *Hort. Lugd. Bat. Ind. alt.* p. 201.

g) *Sedum alpinum alterum lacteo fere Pannoni* p. 489. 490. *Sedum minus* X. *dist.* LXI. IC. LXII.

§. XL

Multa ibi *Pulsatilla alba*, & *Pinguicula GESNERI*, & *Campanula alpina rotundifolia minima*. Sed in primis, jam a JOHANNES BAUHINO eodem loco lectus, *Daucus Creticus*, cujus hic quidem varietas *rariori folio*, & *longiori* & *pene glabro* nascitur, superius in planitie montis *falconarii*, quæ summa est, altera varietas, *brevi* & *hirsuto folio* & *latiori* frequentior est. Hujus *Dauci*, in omnibus *Alpibus*, & in altioribus *Jurae* pratis non rari, historia confusissima est, ut eam expedire non sit inutile futurum. In *Dauco* ergo, *breviori* & *hirsutiori folio*, *radix* magna conica, perennis, fuscis foliis obducta, plures caules, multaque folia fundit, squamosoque, neque piloso capite terminatur. *Folia* ad terram prodeunt ex longis, latis & striatis vaginis, quarum quaelibet vel unum, vel terna edit denuo divisa *folia totalia*. Horum *maximo*, tria sunt, conjugatarum accedunt alarum non facile ultra sex paria: Harum alarum, quæ primæ, & *maximæ*, denuo quatuor fere tertia divisione pinnas educunt. Quarum denuo, quæ *maximæ*, tria congesta conjugata segmenta habent, quorum prima trifida, aut quadrifida, secunda bifida, tertia simplicia esse solent, ultimo inpare, breviora omnia, vix trium linearum longitudine. Hæc in maximis, reliqua & minores & pauciores divisiones habent. Ultima segmenta semper aliquam latitudinem servant, ad tertiam lineæ partem, nihilque habent de capillari habitu *Mei* vel *Fœniculi*. Omnia hæc præ hirsutie albescunt ex viridi. *Caules* palmares pedalesque multi, similia, sed minora, ex latis magnisque foliis *folia* educunt, hirsuti ipsi, firmique. Sub *umbella involucri universale* quatuor vel quinque fit *foliis* inæqualibus, longis, quorum, quæ latissima, ea lata sunt unam lineam. *Odor* fere *umbellæ minoribus* fit major, aut parum intra eum numerum, aut ultra. Quarum denuo quaelibet calycem habet ex quatuor

H

quin-

quinque, ad septem, latiusculis foliis hirsutis factum, ex albo virentibus, mucronatis. *Semina* hirsuta, striata. *Petala* alba, paulum inaequalia, ita profunde divisa, ut ex duobus sibi adplicatis semicirculis fieri videantur, aut cordis profundius dissecti imagine. *Stamina* alba quinque. Alba etiam placentae duas *Tubae* memoria dignas edit. *Odor* & *sapor* acris & aromaticus. Reperi in M. Scheidek vallis Grindelwald, in M. Dolaz, alibique. In altera varietate, omnia simillima, sed glabra, & segmenta longiora, habinusque laxior. Et de *Daucus* quidem MATTHIOLI a), quem & utraque *Epitome*, *Italica* b), & CAMER. c) repetit, & CASTOR d), & LUGDUNENSES e), & TABERNAEMONTANUS f), de eo nihil lucis habeo, quod adferam. CASPARUS BAUHINUS g) eum diversum existimavit, conjunxit FRATER non sine conjectura, MATTHIOLO suum *Daucum* parum cognitum fuisse. JOHANNEM BAUHNUM plerique recentiorum h) sequuntur, BOERHAAVIUS CASPARUM i). Sed ad nostrum pertinet *Daucus montanus brevissimis & minutissimis foliis* GESNERI k), & certo *Daucus creticus* ejusdem l), cujus etiam iconem habet inter CAMERARIANAS m). *Legitimus daucus Creticus* CLUSII n) *Daucus creticus*

- a) *Daucum* l. 779.
- b) *Daucum* p. 480.
- c) *Ibid* p. 515.
- d) *Herb. novae* p. 155.
- e) *Daucus* l. Matth. p. 716.
- f) *Daucus creticus* p. 45.
- g) Dixitque *Daucum* seniculi foliis tenuissimis Pin.
- h) RAJUS MORISON, TOURNFORT &c.
- i) Qui *Creticum* MATTHIOLI vocat Myrrhidem Orientalem folis angustioribus Pennedani semine villosa *Ibid.* alt. p. 69.
- k) *Disser. m. m. frast.* p. 64.
- l) *Hort. Germ.* p. 272. b & add. ad 256. b ex montibus Rheticae.
- m) *Epit.* p. 35. in *horto vero Creticum* verum dicit. p. 54.
- n) *Pannon* p. 700. *hister.* cXLVIII. absque iconc.

tenfis verus Diofco. LOEBLII o), lectus in *Genevensium montibus*; *αἰγόμερον* THURNEISERI p), si quid in eo homine ferri est; *Daucus Creticus semine hirsuto* JOHANNIS BAVHINI q) ex hoc ipso, in quo versamur, *Falconum monte*. *Daucus montanus umbella candida* CASPARI BAVHINI r), & ejusdem *Daucus montanus multifido longoque folio sive montanus umbella candida* s), in posterioribus operibus, cujus varietatem, longiori & rariori t) legit in *M. Wasserfall*; *Daucus alpinus Cretico similis* PARKINSONI u). Et hæc facile fluunt, primus rem impedit MORISONVS, quando CAESALPINI v) obscuris *Daucis* non satis intellectis, & planta, ut ex ejus verbis adparet, nunquam visa, & solum per descriptiones aliorum sibi nota, nomen c. b. bis repetiit. Inde enim factum est, ut *Daucum nostrum* x) *Saxifragam* dixerit, *multifido longoque folio*, quem ex suis legibus debebat *Myrrhidibus* adnumerasse, quæ ejus etiam in *Umbelliferis* y) fuerat sententia. Idem eundem *Daucum* denuo, conjunctis MATTHIOLI & CASPARI

H 2

BAV-

- o) *Advers.* p. 323. cum icona non bona foliis *Mei* aut *Anethi* & in *observo.* p. 416. Is minime dubitavit huc revocare *Daucum* f. MATTHIOLI.
- p) *Hist. plantar.* LXII.
- q) III. 2. p. 16 CHARRAEUS *Daucum creticum*. *Sciagr.* p. 389. *Dauci* vero *Tiburteni* p. 14. brevissima est descriptio, ut non videam, quomodo de eo definiri queat. RAJUS certe & MORISONUS nostro faciunt eundem.
- r) *Physopin.* p. 260.
- s) *Cat. plant. circa Bafil.* p. 45. *Pla.*
- t) *ibid.*
- u) *Theatr.* p. 896.
- v) *Lanuginoso Cretictis simili* L. VII. c. 15. & *non lanuginoso montano* C. 17.
- x) Cum synonymo C. B. quod nostrum designat, *Hist. Oxon.* III. p. 273.
- y) p. 84.

BAUHINI nominibus, vocat *Myrrhidem tenuifoliam annuam Creticam semine lanugine alba pubescente* 2). Et ex eodem tempore inter *Myrrhides* plurimi muneraverunt. *Myrrhidem* nempe *annuam semine striato villosa incano* vocant, ex eodem MORISONO aa), HERMANNVS bb), TOURNEFORTIVS cc) BOERHAAVIUS dd) MILLER ee) BOECLER ff). RAJVS JOHANNEM BAVHINVM secutus est gg). TOURNEFORTIVS in scripto priori hh), & TITA ii), & SCHEVCHZER kk) nomen CASPARI retinuerunt, PLVKNET ll) & SIEGESBECK mm) JOHANNIS appellationem. MYNTINGII *Daucus Creticus latifolius* & *angustifolius* nn) quid sint, & qua ratione differant, andemum sint duæ nostri varietates, id quidem in ea brevitate definiri non potest. Non video, qua ratione ductus TOURNEFORTIVS nostrum alio nomine, ad aliud genus retulerit *Ligustici* oo), cui semina alata sunt, ita ut in priori nomine, *Myrrhidis*, JOHANNIS BAVHINI nomen, in hoc *Ligustici multifido longoque folio* CASPARI nomen citet, utut duo *Fratres*, non unius generis duas species, longe minus duorum generum plantas, sed eandem certissime descripserint. Oportet

2) Cum eodem omnino CASPARI BAVHINI synonymo p. 230.

aa) *Umbellif.* p. 44. 67.

bb) *Hort. Lugd. Batav.* p. 423. *Flor. Batav.* p. 15.

cc) *L. R. H.*

dd) *Ind. alt.* p. 69.

ee) *Garden. dictionary.*

ff) ad Hermann p. 293.

gg) *Syllog. stirp. extar.* p. 124. *hiflor.* p. 463.

hh) *Schol. Botan.* p. 162.

ii) *Hort. Mauritacen.* p. 62, & in *Itin. Alp.*

kk) *It. alp.* l. p. 14.

ll) *Daucus Creticus semine hirsuto* *Almagest.* p. 129.

mm) *Flor. Petropol. prinit.* p. 40.

nn) *Waare oeffening van den planten.* p. 399.

tet utique, aliam a nostra, & diversissimam stirpem ob oculis veritatem fuisse TOVRNEFORTII. Nihil enim nostra librarum habet in semine. BESNIER pp) *Daucum creticum officinarum* vocat. *Daucum Creticum* DALE qq), LEMERII rr), ZORNII ss), & ALLEYNE tt). LINNAEVS, determinato verissimo, uti solet, caractere, *Meo* punctam *Athamantam* habet, *foliis capillaribus seminibus bifutis uu)*, quod nomen retinet ROYENIUS ww), sed diversam plantam denotans, & ab altera, simili sed latioris folii planta MORISONIANA *Myrrhida nempe annua semine striato villosa incano* separat. BLACKWALLIA denique iconem *Dauci Cretici* xx) proponit, quae ROYENI & LINNAEI *Athamantam* foliis capillaribus exprimere, & a nostra, alto atque laxissimo foeniculi habitu differre videtur. Et revera, si *Dauci* characterem ingrediuntur folia laciniata sub umbella cava, uti visum est LINNAEO yy), non poterit ibi manere. Ex TOVRNEFORTII vero legibus non video, quare debuerit removeri a *Daucis*. *Calycis* ratione habita certe vel *Meo* similis erit, cum quo & habitum communem habet, petalis tamen diversus, quae *Meo* integra sunt, *Dauco Cretico* cordata; vel *Myrrhidibus* & *Cherophyllis*, quibus simillimum habet *calycem* singularem. Tandem mirari licet, stirpis in officinis receptae, neque rarissimae, unam omnino iconem esse, quae

H 3

apud

oo) I R. H.

pp) *Tournef. mater. medic. III. p. 325.*qq) *Pharmacol. p. m. 197.*rr) *Dictionnaire des drog. p. 150.*ss) *Botanolog p. 60.*tt) *Dispensator p. 3.*ww) *Flor. Bat. 97.*xx) *Herb. tab. 472.*uu) *Hort. Cliffort. p. 93.*yy) *Char. nat. plant. 206.*

apud CAMERARIUM est, & aliqua non habet, quæ desiderari possent.

XLI.

Et jam in summum montem eramus enixi, quem late occupant lætissima certe pascua, quibus pinguiora non vidi, infinita florum varietate depicta, & planissima, in lunæ crescentis speciem flexa circa oram horrendi præcipitii, quod ad imam arenam (*creux du vent*) juxta abruptissimos scopulos descendit. In ea ipsa ora *Dryas LINNÆI* plurima provenit, in pratis vero dominabatur *Anemonoides montana hirsuta polyanthos*. Multus ibi, ad rupium supercilia, *Ranunculus minimus albus*, plurima *Pulsatilla alba*, quæ nihil habebat coerulei coloris, qui petala exterius pingere solet in alpibus; & *Gentiana alpina flore magno procumbentibus floribus*, & *pumila verna major*, & *Hieracium montanum latifolium villosum magno flore*, & *Thlaspi folio globulariæ* petalis certe integris & æqualibus, quæ, nescio quam ob rationem, *RUPPEI* a), visa sunt irregularia; *Globularia ipsa montana humillima repens*, cui folia hilum excisum habent. Ejus flores, cum nondum ita viderentur descripti, ut fidum characterem ex Auctoribus decerpere ausus sit veracissimus LINNÆUS b), eam ipsam ob rationem propius contemplatus sum. Sub quovis flore foliolum fuscum est, quorum conjunctione imbricata fit calycis generalis species. Proprius *Calyx* difformis quinquesidus bilabiarus, in duas partes discedens: Superiores duæ angustissimæ, tres inferiores latiores, & minus profunde excisæ sunt. *Stamina* libera quatuor. *Tuba* unica cum globulo, ex ovo, quod nunc in imo calyce minimum est. Hæc omnia cyanea.

TOUR-

a) *Flor. Jenens.* p. 218.

b) *Conf. char. nat.*

TOURNEFORTII c) certe icon, quæ superius labium reſectum habet, inferius trifidum, KNAUTIIUM d), NISSOLIUM e), & LINNÆUM f) ſeduxit, ut florem exiſtimarent unilabium. BOERHAAVIUS g) nihil ſatis definiuit, neque PONTEDERA h), niſi quod poſt NISSOLIUM ſtaminum numerum addiderit. Videtur ergo nobis non longe removenda a *Scabioſis*, ſivè *Aſterocephaliſ*, a quibus ſemine in medio flore, absque vagina radiata, differt, reliquis dotibus, flore, ſtaminibus, tuba, calyce, convenit. Neque ad excludendam a *Dipsaceis* Globulariam videtur ſufficere, quod folia non conjugata habeat, ſemenque intra florem. Neque enim *Caracæron* ſemen habet coronatum, neque aliæ *Dipsacæ* VAILLANTII; folia vero claſſium certe characteres ſubire non debent.

XLII.

Ad lapides non frequentiffime reperi aliam *Dauci* ſpeciem, ſi a ſemine hiriſuto denominetur, quam in *Helvetia* variis locis alias videram, ſupra *Dornacum*, inter *Mummeliſwyl* & *Falckenſtein* ad rupes, ad ipſam etiam arcem *Falckenſtein*. In ea planta aliqua ſunt, quæ merentur animadverſionem noſtram. Eſt ei *radix* acris & aromatica, villo coronata. *Folia* inſigniter varia magnitudine, vix ſui in diverſis plantæ ætatibus ſimilia videntur, modo cubitalia, modo triuncialia, & tunc tenuiter ſerrata, firmaque, adultiora vero & amplius incifionibus, & mul-

to

c) Tab. 265.

d) Char. plant. p. 85.

e) *Memoir. de l'Acad. des ſciens.* p. 446. & ex eo DILLÉN. ſupplem. flor. Gießenſ. p. 162.

f) l. c.

g) *Ind. hort. alt.* p. 122.

h) *Diſſert.* p. 120.

to tenujora, semper tamen eundem characterem servant, quo solo planta, quando non florēt, facile dignoscitur, & quem solum fere *Carvi*, atque *Pimpinella crispa* imitantur. Nempe cujusvis secundarii folii, ad princeps folium coeuntis, prima ala, intervallo distat a reliquis ejusdem secundarii folii alis, & alia directione, ut ad eorum decussum incedendo quaternæ ibi alæ crucem ad costam primarii folii efficiant. Caulis *Julio M.* exeunte florem profert, densissimis Umbellis, quibus singularis habitus globosus efficitur, quadraginta omnino minoribus coalescentibus in unam majorem. *Calyx* uterque aliquot longis, neque divisus ligulis constat. Semen alba hirsutie obductum. Florem non examinavi, cum planta junior esset, visam deinceps in scopulis, non potui attingere, ob loci difficultatem. Huc solent referre *Apii montani* genus in *M. Legerio* prope *Badam* a), brevissime certe descriptum; deinde *Daucum angulosi caulis* *Cordi* b), pariter non satis definitum. Longe minus *Seseli montanum* *II. CLUSII* c) huc facit, quod nostro *Dauco* jungit *CASPAR BAUHINUS*, id enim flores habet pallentes, estque aut verum *Oreoselinum majus*, aut simillima certe planta; Sed verius huc refertur *Libanotis alba minor* seu *amara* *THALII* d), qui diversitatem insignem foliorum non neglexit. Deinde *Apium petracum* sive *montanum albianum* *IOHANNIS BAUHINI* e), qui & eam notam, & semina

a) *Hort. German.* 247. b.

b) *Hist. plantar.* p. 103. b.

c) *Pannon.* p. 691.

d) *Sylv. hercyn.* p. 41.

e) *III.* p. 105, ex *M. Wassetzall, Grenzach.*, & *Bada*, cum iconē non mala. *CHABREUS* p. 397. Ceterum fratrem culpae, quod eum *Daucum* pro tertio *Dioscoridis* dederit, non satis æquus. Eo enim no-

mina hirsuta, & in universum bonam descriptionem dedit, ut spernerit ejus nomen vel eam ob rationem conservari apud RAIUM f), MAGNOLIUM g), & BOERHAAVIUM h). CASPARVS NOS multis difficultatibus implicuit. *Daucus montanus apii folio albicans* i) utique ipse Herbario vivo est noster, de quo scribimus *Daucus*. Nomen CLUSII male huc refertur. Deinde *Daucus montanus apii folio minor*, in *Prodromo* depictus, lectusque in M. WASSERFALL huc pertinet, ex fide horti siccii HAGENBACHIANI, qui CASPARO a manibus fuit, propriæque CASPARI collectionis. Tandem *Libanotis minor apii folio* k), non reperia est inter siccas ejus plantas. Ad eam CORDI & THALII nomina referuntur, non recedentia a nostra stirpe. *Libanotis* verò *Theophrasti minor* LOBELII l) omnino diversa est, itidemque eadem huic & desumpta a LOBELIO *Libanotis panacea* TABERNÆMONTANI l*); Fecit ergo sapienter RAIUS quod huic *Libanotidi minori* CASPARI BAVHINI asteriscum apposuerit m), incaute vero MORISONVS, quod post *Daucum* nostrum alibi descriptum repetierit eandem ex CASPARO *Libanotidem*. PARKINSONUS n) ex CLUSIO *Daucum selinoid-*

nomine in herbario C. BAVHINI planta est *Oreosclini* majoris similis, sed rotundiori & villosa folio.

- f) *Syll. plant. extra Brit.* p. 66. *Hist.* p. 460. *Synops.* III p. 218. Ipse legit in *Jura M.*
- g) *Hort. Reg. Monsp.* p. 20.
- h) *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* p. 59.
- i) *Pin.* p. 150. *Basil.* p. 45.
- k) In *Pin. Libanotis apii folio* in *Phytopin.* p. 277.
- l) *lc.* p. 705.
- l*) Ex edit. C. B. 315.
- m) p. 449.
- n) *Téacat. Bepan.* p. 898.

linoidem maximum dixit, qui a nostro diversissimus est. MORISONUS *Pimpinellam saxifragam minorem Daucoidem friv* *femine lanuginoso o)*, ex quadam cum *Tragoselino crispo* *fimilitudine habitus. PLUKNETIUS* junioris plantae elegantem figuram dedit, nomenque fecit *Daucum montanum Pimpinelle saxifrage hircina nostrae folio p)* *Dubriensem*, in quo nomine & seminis & habitus rationem habuit. RIVINVS r) lectum in *Gigantum* montibus *Libanotidem* dixit, genus constituit peculiare, & iconem dedit ad adultum, & latifolium, specimen, characterem non satis definivit. Id nomen mansit apud RYPPIVM s), BUXBAUMIVM t), WALTHERVM u) & HEUCHERVM w). TOURNÉFORTIUS hac planta omnino caret. An huc facit *Daucum montanum Boemicum* SCHWENKFELDI x). Ea planta denuo, si character *Dauci* est in lacinia-
tis sub Umbella foliis, debet emigrare ad aliud genus. RIVINVS a *Dauco* breviori lanugine seminis videtur distin-
xisse.

§. XLIII.

Inter medios flores, & virentia pascua e longinquo
nivem vidi. Quare memor *Croci Alpini*, nunquam a me
visi, licet in *Jura* frequens sit, & antiquum nomen *Levet-
te* apud incolas conservet, accurri; neque spem sefellit
flos

- o) *Hist. Oxon.* III. p. 285. In *Umbelliferis* p. 84. ejus meminit.
- p) *Almagest.* p. 129.
- r) In *Pentapet. irregul.*
- s) *Flor. Jemens.* p. 226.
- t) *Enumer. plant. circa Hal.* p. 185.
- u) *Ind. hort. sui.* p. 33.
- w) *Prov.* I. p. 69.
- x) p. 61. semen huc facit, descriptio iusto brevior.

flos amabilis, quem toties perreptatis alpinis *Juraeque* tra-
ctibus, non inveneram; neque enim nisi in spongiosa
flavescente terra nascitur, a qua modo ante paucissimos dies
nix defluxit, & brevissimi aevi est. Duplex erat varietas.
Priori ad inum floris tubum violaceus color subnasceba-
tur; segmenta vero petalodea omnino alba erant. *Alteri*
tria petalodea folia exteriora violacea, interiora tria alba,
cum crebris venis violaceis. Utrique cæterum bulbis, &
folia pauca lata, media albicante linea, & *Stamina* tria apici-
bus flavis ex ortu segmentorum floris, & *Tuba apice*
trifido plumoso, qui ad expansionem floris terminabatur,
brevior quam ut emineret. Alias varietates in hortis vidi,
flore ampliori, omnes vero nonnisi coloribus floris discre-
pant. Quare omnem apparatus omitto nominum, quæ
multo cum labore congessebam, ex confusissimis CLVSII at-
que CASPARI BAVHINI *Crocis*, omnesque quotquot sunt *Hel-*
vetiæ cives, SIMLERI a), ut loquitur CLVSIVS, nam sunt ARE-
THI, & JOHANNIS BAVHINI b), & RAI c) & SCHEUCHTZERI d) in
alpinis lectos *Crocos* in unum unio *vernum latifolium*. Au-
ctiorem habeo, quem ubique maximi facio, LINNÆVM e).

§. XLIV.

Per ea pascua, ad lapides tenui gramine vestitos *Of-*
mundam lunato folio, & *selaginoides crispum*, *Graminumque*
1 2 spe-

- a) *Croci montani speciem flore candida, flore caruleo, & ex candido at-*
que caruleo mixto ARETHI in *Ness.* p. 235. & SIMLERI in *Valles.* &
Alp. p. 333. Quorum priorem, & tertium inprimis legi.
- b) *Il.* p. 641.
- c) *It.* IV. p. 333. videtur nostrorum primum esse.
- d) *Latifolius vernus flore purpureo minori in Sylloge stirp. extra Brit.*
p. 109. in *Jura* lectus, est secundus ARETHI.
- e) *Hort. Clifort.* p. 18.

species, *typhoides spica densa brevi & villosa*, aliudque *ghimis variis*, tum aliud *panicula speciosa variegata*, aliaque, nunc non dicenda reperi; & bene onustus plantulis pedem retuli, conventurus socios in pascuis *Grandvi*, quæ sola in *Helvetia* a) *Meum* mihi dederunt; Sed id non obicuri est, neque quidquam habet difficultatis. Neque diu morati, in casa alpina, mundiiori ut solent in *Jura* esse, reduces adtulerunt stirpes in *pertuis de la bise*, sive *orientali exitu* lectas, admodum elegantes. Aderat *Bupleuri* species, olim cognita GESNERO b), & inter CAMERARIANAS c) picta; aderat *Valerianoides angustifolia* VAILLANTII, sed immaturior. *Tozzia* etiam adferebant, quam olim in *Biennensium* montibus d) legeram mediis in sylvis, deinde in M. *Stockhorn* lapidoso loco. Hanc ita pulchre depinxit MICHELIVS e), ut nihil desit præter *flamina*, omnino quaterna, diversæ longitudinis, uti solent in floribus, quibus quatuor femina nuda subsunt, vel ovarium uniloculare, vel biloculare, paucis exceptis. *Tuba* cylindrica simplex. *Barba* trifida maculata, & lineata, cum superius labium duobus, brevioribus & immaculatis flavis segmentis fiat.

§. XLV.

Adtulerunt etiam *Hesperidis* genus suavissimi odoris. Et dissimile videri poterat ejus, quod a CLVSIO *sylvestre* a) dictum

- a) GESNERVS, sed ex relatione pastoris, narrat in *Pilati M.* nasci. Ego nuli ibi in alpihus, aut *Jura* vidi.
- b) *Perfoliata montana* f. *perennis* Epist. p. 110. b.
- c) *Perfoliata montana* hort. p. 38. ic. XXXVIII.
- d) Vnde primum adlata est ad CASPARVM BAVHINVM inventorem, qui *Euphrasiam luteam radice squamata* dixit *Proderem*, p. 111. acque debuerat præteriri a MICHELIO.
- e) *non. plant. gen.* p. 20. T. XVI.
- a) *Pannon* p. 337. *lilher*. p. 299.

dictum, in *Valefia* provenit, supra *Leucam*. Nam multa folia penitus obtusa habet, omnia vero valde latiora, ut sint, quæ semuncia latitudinem habeant & excedant, margine modo obiter, modo profundius serrato, flos vero multo major est angustifolio CLVSII, & sativorum autæqualis, aut major, pallidus, longo etiam pallidoque calyce. Sed collatis multis speciminibus utriusque, iis etiam, quæ in M. *Chasseral* lecta dono dederat D. *Schub* V. D. M. plantarum amantissimus, nimis adparuit, continua serie, & angustissima folia dari, illa *Valefie*, & quæ prope *Acidulas Mauritanas* legerat D. *HYBER*, mediocria, aliquando vagis dentibus serrata ex *Chasseral*, lata, profundeque dentata ex monte *Falconario*. Ut nunc fidentius asseram nihil adesse veri discriminis. Cæterum, huc omnino refero, etsi nostrum apprime odoratum sit, *Leucojum sylvestre* inodorum flore parvo pallidore HORTI AICHSTETTENSIS a) *Leucojum luteum sylvestre Pannonicum serrato folio obtuso* & acuto JOHANNIS BAVHINI b) *Leucojum luteum sylvestre hieracifolium FRATRIS CASPARI* c), etsi nostrum quidem constanter glabrum sit. Huc etiam pertinet *Hesperis sylvestris hieracii folio hirsuta GARIDEL* d) ex CASPARO BAVHINO. *Hesperis Leucoji folio serrato siliqua quadrangula TORNEFORTII*, non absque ratione adeo vicina CLVSIANÆ, deinde TILLII e), BOERHAAVII f), VAILLANTII g). *Keiri sylvestre folio hieracii RUPPII* h). Et hæc omnia nomina cum

- a) *Aest. ord.* II. T. 13. f. 2. bona ic. RAI p. 781. cum asterisco.
- b) II. 872. cum iconc; Suo jam tempore dubius fuit, annon esset varietas.
- c) *Prodr.* p. 101. *Pin.*
- d) *plant. aut d' Alex* p. 229.
- e) *hort. Pisan.* p. 79.
- f) *Ind. alt. hort. L. Bat.* II p. 20.
- g) *Botan. Paris.* p. 101.
- h) *Flor. Jemens.* p. 61.

sua planta merito migrant ad *Leucojum sylvestre* CLVSII. Plantæ vero ZANONI, & BARRELERII k) a variis huc relatae, diversæ sunt, & ZANONI quidem angustifoliam plantam, nihil a CLVSIANA nisi floris magnitudine diversam, describit. BARRELERII *Leucojum montanum angustifolium pallido flore* folia utrunque nostri habet, sed floris petala angusta & incisa, quæ nostro integra, lata, & rotunda sunt. SIEGESBEKII *Hesperis Leucoji folio angusto dentato flore minore luteo* l) ad nostram, flore magno, referri non potest. De PONÆ altissimo orgyali *Leucojo* non liquet. THALIANVM *Leucojum luteum sylvestre* m) ita describitur, ut vix possim cum BAVHINO definire, nostrum esse, distinguere vero ab ipsissimo *Leucojo* CLVSIANO.

§. XLVI.

Adtulerunt etiam *Quinquefolii albi* speciem, quam anno 1728. cum ultimo vitæ discrimine in M. Leitern *Valesia* legi, in angustissima semita super præcipitium pendente, sæpe gradibus in rupe excisis, sæpe ponticulis ex rudibus Abjeribus interrupta; deinde ad *Agaunum*, asperimis etiam in rupibus. Ejus historia vix sola tradi potest, quæ utique difficilis est, & duobus affinis *Quinquefoliis* ita implicatur, ut neutrum sine altero queat intelligi.

Maximum nempe Germanicum illud *Quinquefolium album* FUCHSII non valde caulescit, folia vero amar educere ex propriis pediculis, hirsutis iis, & longis, quina perpetuo

i) *Istor. Botan.* p. 110. ic. 59. similis nostræ stirpi ex *Géofferal*: vocat *heiri alpinum foliis dentatis flore parvo odorato*. Ex eo RAJVS p. 783.

k) ic. 884.

l) *Prim. flor. Petr.* p. 53.

m) *Syl. hercynic.* p. 69.

petuo, nullis alis accedentibus digitata, quorum medium maximum est, integris oris, folis apicibus & parte, quæ apici proxima est, rectis & non profundis denticulis sex septem, neque multo pluribus, inciso. Pars altera folii viridis, & glabra est, averia tota sericea lanugine candicat. *Flores* ex petiolis parum foliosis, quinque petalis cordatis constant, sub quibus *calyx* est decem in alterno ordine segmentis, de more, constans. *Stamina* multa. *Semina* nuda oblonga pappum ex vertice undique fundentia, quem & placenta plurimum delapsis floribus retinet, brevent, & argenteum. Talis in *Germanie* sylvis provenit, eamque prope arcem *Tu- bingensem* ante plures annos legi.

§. XLVII.

Alia species *caulifera* pedalis & ultra, ramoso caule & folioso. Huic *folia* quina ex brevioribus cauliculis, apice tribus majusculis dentibus inciso, hinc glabra, inde ora & nervo sericea pube albicante, reliqua folii parte, aut non hirtuta, aut leviter, *flore* majusculo ejusque petalis integris, longis, distantibus, venosis. *Semina* pari modo papposa a). Hæc in *herbario vivo* CASPARI BAVHINI fuit nomine *Quinquefolii erecti albi majoris*.

§. XLVIII.

Tertia a nobis lecta in *M. Leitern*, & *Agauni*, & in *Creuse du Vent*, folia habet ad terram primæ similia, apice multis denticulis inciso. Sed & caules ramosos & foliosos profert. Flores petalis ovatis lactei, simillimi. Deinde folia differunt, non adeo sericea pube villosa, sed hinc quidem gla-

a) Villi in floribus hujus *Pentaphylli* RAO & JOHANNI BAVHINO vis sunt,

glabra, inde hirsuta, ita tamen, ut nihil decedat herbaceo colori, quo utrinque obducuntur. Pyriformia semina simillimum pappum educunt. Id ergo cum secundo (xlvii) petalis foliis & caule consentit, differt utcunque statura, foliis majoribus, & frequentius incis. A primo distinguitur folio & caulescente habitu, florisque petalis. Caterum in hujus speciminibus *stamina* luculentius vidi, latis planisque barbatis foliolis, non cylindricis stylis; *Tubae* verolongas, cylindricas, non plumosas, ex acuminato ovarii apice.

§. II.

Multiplex hic occurrit observatio. De pappo seminum non satis dilucide scribunt Auctores rei herbariae, qui tamen *Caryophyllatis* nostra *Quinquefolia* proxime unit, & in Eboracensi etiam uberrimus est, in aliis *Quinquefoliis* rarior, aut omnino nullus. Sed & species definire in scriptoribus Botanicis non est facile. Conabimur tamen, & adductis ad singulam nominibus, addemus, quid de earum diversitate de nobis videatur. Ad primam ergo speciem refero *Quinquefolium majus candidum* FVCHSII a), quod folia ex radice in peculiaribus pediculis profert. Idem est *Quinquefolium* TRAGI b) & huc etiam referri solet *Quinquefolium secundum MATTHIOLI* c) *stare albo*. In *Epitome vero Italica* d) exstat utique *Quinquefolium album* longis ex radice pediculis, idem TRAGIANO. Eodem nomine apud CAMERARIUM e) exstat, & LVGDVNENSES f), qui in eadem pagina denuo

a) *Hist. plant.* p. 623.

b) *Herbar.* p. 507. edit KUPERI.

c) p. 1018. in descriptione, nam icon *Pentaphylli albi* p. 1020. est luteum, cui folium *subtus argenteum* est.

d) p. 684.

e) *Epit.* p. 756.

f) *Hist. gener.* p. 1265.

denuo habent idem g) *Quinquefolii albi* MATTHIOLI nomine. In ADVERSARIIS *Pentaphyllum album* h) est. GENIUS *Pentaphyllum album* Tragi *Lupino simile* i) dixit, unde profecta videtur denominatio THALII, *Pentaphylli* OEGUS-Φύλλον k), ex quo spuria species & inutilis orta est *Quinquefolii Lupini folio* l) CASPARI BAYHINI, AMBROSINI m), & RAZI n). TABERNEMONTANVS *Quinquefolium sylvestre* o) dixit. Huc *Pentaphyllum albo flore* CAMERARII p), & *Quinquefolium sylvaticum* SCHWENKVELDI q) huc potius referendum videtur. Idem etiam nomen est in *horto AICHSTETIENSIS* r). CASPAR BAYHINVS *Quinquefolium album majus* t) dixit in priori opere, in posteriori *Quinquefolium album majus alterum* ex. JOHANNES BAYHINVS *Pentaphyllum album* u) nominat t) TRAGO & MATTHIOLO. Nomen CASPARI BAYHINI retinuit PARKINSONVS,

g) Ib.

h) p. 307. absque leone.

i) *Hort. Germ.* p. 271.

k) *Sylv. bercey.* p. 88.

l) *Pin.* p. 119.

m) *Phytolog.* p. 614.

n) *Hist.* 614. cum asterisco, ex quo constat, non viliam plantam RARO.

o) *Leon.* p. 620.

p) in *horto* p. 119. Siquidem non diversum videtur intellegendum fuisse nomine pene eodem.

q) *Stirp. Silos.* p. 174.

r) *Vern. o. 7. T. VI. f. 2.*

s) *Phytopin.* p. 650.

t) *Pin.* p. 325. CLAVSIANVM eo refert synonymon *Pentaphylli albi* I. CLAVSI. Sed hoc ad speciem nostram tertiam refero post I. B.

u) *Il. p. 398. d. CHARR.* p. 171.

SONX), RAJVS y), TOVNEFORT Z), BOERHAAVEA), & SCHEVCH-
ZER bb). *Quinquefolium* seu *Pentaphyllum* L. dicit AMBROSINVS
cc); *Pentaphyllum minus rectum subtus incanum flore albo* MORI-
SONVS dd), de nostro enim dicere videtur, et si descriptionem
adferat CIVISII. Eo nomine usus est HERMANNVS ee). KNAV-
TIVS corrumpit, ut sit *Pentaphyllum* sive *Heptaphyllum minus*
rectum flore albo subtus incanum ff); & alibi HERMANNVS
facit *Pentaphyllum* sive *Quinquefolium album majus alterum*
gg); *Pentaphyllum candidum majus* MYNTING hh); *Penta-*
phyllum foliis argenteis & splendentibus majus & minus MEN-
ZEL ii), ut videtur, *Quinquefolium Lupini folio argenteum flo-*
re albo XPPP kk) in Sylvis repertum. *Pentaphyllum album*
TITA ll), & BVXBVM mm), & GEMINHART nn). *Pentaphyl-*
lum sylvestre majus? an minus? SCHAEFFER oo), nemo dixerit.

Pen-

x) *Theatr.* p. 396. sed *Pentaphyllum* vocat & CIVISII I. huc refert.

y) *Hist. plant.* p. 614. *syll. stirp. extra Brit.* p. 212.

z) In *Schol. Botan.* p. 231. & I. R. H.

aa) *Ind. alt.* p. 40.

bb) In *izin. Alp.* VI. p. 460. si quidem de nostro loquitur; nam *pen-*
ta la subrotunda & locus videntur *facere, ut sit certum no-*
strorum la non, laudo cep ad.

cc) *Phytolog.* p. 452.

dd) *Hist.axon.* II. 189.

ee) *Flores Lugd. Bat.* p. 480.

ff) *Enum. plant. circa Hal.* p. 112.

gg) In *Flor. Botan.* p. 3.

hh) *Waare offening* p. 562.

ii) *Pugill. plant. var.*

kk) *Flor. Jenens.* p. 84.

ll) *Hort. Maurocen.* p. 137.

mm) *Enum. plant. circa Hal.* p. 254.

nn) *Catal. plant. circa Laub.* p. 77.

oo) *Delic. Botan. Helv.*

Pentaphyllum album majus alterum DVVERNOI pp), si quidem id est *album* *Quinquefolium*, quod prope arcem *Turingensem* me decerpisse memini. *Pentaphyllum flore albo montanum* WALTHER qq), *Pentaphyllum Lupini folio flore albo* SIEGESBECK rr). *Potentillam* denique *foliis digitatis superne conniventis serratis caulibus filiformibus* dixit LINNAEVS ss) noster, TILLI tt) ex MICHELIO adeo multa habet, quæ ad nostra *Quinquefolia alba* referri possunt, ut ex iis me expedire non potuerim. Principes hujus notæ sunt, flores & folia ex radice, caules aut nulli, aut parum foliosi, petala cordis effigie.

L.

Alterum, & multo obscurius *Quinquefolium*, descriptum XLVII. caulescens, erectum, & foliosum, est sine dubio, cum erectum sit, & minus, CLVSI *Quinquefolium* II. a), quod in magno opere *Quinquefolium* II. minus *flore b)* dixit. *Quinquefolii albi species* GESNERI c) tantum nominatur, ut vix definiri possit, quo pertineat. CASPARVS BAVHINVS ex CLVSIO d) dixit *Quinquefolium album minus alterum*; quod

K. 2.

nomen

- pp) Cat. plant. circa arc. Taking. p. 112.
 qq) Ind. hort. sul. p. 100.
 rr) Flor. Petrop. prim. p. 83.
 ss) Hort. Cliforti. p. 194. & ipse cum C. B. RAYO & MORISONO album I. CLVSI huc refert: Idemque nomen habet ROYENVS Flor. Leid. prodr. p. 276.
 tt) Hort. Pisan. p. 141.
 a) In Pannon p. 425. icon, in qua flores nimis & lati & cordis formes.
 b) p. CV. & ex eo RAYVS p. 614. cum alterisco.
 c) App. ad hort. p. 295. b.
 d) Pin. p. 325.

nomen HERMANNVS e), TOURNFORTIVS f), SCHEVCHZEVVS g)
refinent. Sed idem præterea pro novo descriptum est a
CASPARO, *Quinquefolii albi minoris* h) nomine, lectum in
faxolis circa Cuiusdam Rhetorum, idque nomen RAJVS i) &
TOURNFORTIVS k) habent. PARKINSONVS l) ex CLVSIO dixit
Pentaphyllum albu n. minimum. MORISONVS n) *Pentaphyllum*
minus erectum, hirsutum flore albo, quem PLVNETIVS o), &
alibi HERMANNVS p) sunt secuti. Porro non dubito huc re-
ferre *Pentaphyllum rectum* RAIL q) in SALEVA lectum, cum &
folia apice incisa, & floris petala longiuscula, & eorum di-
stantia major, & villi tomentosi in medio flore huc respici-
ant. *Pentaphyllum vero foliis inferne & superne incanis* JO-
HANNIS BAVHINI r) ex Baldo M., ad quod fere refert CLVSIA-
NUM alterum, differt a nostro in ea nota ipsa, a qua nomen habet.

III. *Tertium* (xviii), quod a priori, maxime caule non ere-
cto, torte & petalis paulo latoribus, & foliis amplioribus
differt.

e) Flor. Bat. p. 9.
f) Schol. Botan. p. 231. I. R. H.
g) D. n. p. II. p. 139. multis Rhetis locis.
h) Phytologia, p. 650. Prodr. p. 1. g. l. in. In herb. vitro C. B. nomen
adjectum erat *Quinquefolii erecti albi minoris*.
i) Syl. stirp. extra Brit. nasc. p. 212. & Hist. plant. p. 614. cum
Asterisco, conjungit vero stirpem. CAVEN non certissimum.
j) I. R. H.
k) Theatr. p. 397. & *Pentaphyllum albu minus* ibid.
l) II. p. 189. ex Cusio. Inter icones adijcitur nomen *primi* ad
hujus numerum.
m) Hort. Lugl. Bat. p. 480.
n) Hist. p. 514. *Syl. stirp. extra Brit. nasc. p. 212.*
o) II. p. 398. e. villi in medio flore observati non recedunt. LON-
GIANUM alpinum petrosum, quod ibidem citat, est *Alchemilla serotina*.

differt, a GESNERO a), lectum in muris urbis *Waller stat. Pentaphyllum petraum* dictum fuit, & alibi *Pentaphyllum album petraum* b), ut mirari liceat, CASPARUM PAVLINUM in eisdem omnino oppidi muris lectum pro novo describere; Dixit autem *Quinquesolium album majus* in *Prodrumo* c), addidit *caulescens* esse in *Pinace*, nam caule folioso a II. *Pinacis* differt: Et ea ipsa nota, deinde quod CLVSIVS non nisi ignota *Pentaphylla* se descripturum testetur d), persuadeor, huc pertinere, non ad TRAGI *Quinquesolium*, id, quod I. *maius albo flore* vocat CLVSIVS e), csi non dissimulem, nostrum rupes potius, quam sylvas amare. Nobiscum sentit IOHANNES BAVHINVS f), qui *Pentaphyllum album* I. CLVSII scortum proposuit. CHABREVS g) iconem flavæ speciei addidit, cui homini, non immerenti *Auctori* impurasset, si libuisset iustum esse, *hallucinationes* plerasque operis BAVHINIANI, censor MORISONVS. Nomen CASPARI TOVNEFORTIVS h) repetiit, & TILLIVS i). RAJVS & MORISONVS & plerique alii non habent. De MENZELII k) *petraeo flore albo* non liquet.

§. LII.

Et hæc ita videntur sibi constare. Sed, ut dicam, quod verum est, non levis mihi est suspicio, tria hæc *Quinquesolia*

a) Tab. collect. stiry.

b) Hort. German. p. 271.

c) p. 139.

d) Dudum vero illud TRAGI in hortos receptum erat conf. LOBELII advers. p. 307.

e) Paunon. p. 423. *hister*, p. CV. cum iconc. quæ nostram omnino exprimit, a *Quinquesolio* TRAGI valde aliena.

f) II. 398. c. Inde PLVNNEX *Almag.* p. 285.

g) *Seagr.* p. 169.

h) I. K. H.

i) Hort. Pison. p. 143.

k) *Pugill. rar.*

folia tuto posse in unum uniri. Examinatis speciminibus, adparuit mihi, continua degeneratione *Erectum* illud (XLVII.) ad radicem non foliosum, & petalis longis, & folio pene glabro, degenerare in nostrum (XLVIII.) in *M. Leitern & Creux du Vent* lectum, cui foliosus caulis, latiora petala, folia subhirsuta flava. Inde absque saltu conjunguntur specimin a ejusdem (XLVIII.) lecta *Aganni*, argenteo villo, foliis plurimis ad radicem, eisque peramplis, simile *TRAGIANO*, uti caule folioso, neque penitus sericeis foliis cum *erecto* & cum speciminibus in *Creux de Vent* consentit. Et si quidem, quod non existimo, petala cordata *TRAGIANI* sint sufficienti discrimini, certe tamen & *caulescens BAVHINI* (XLVIII.) & ejus *erectum* (XLVII.) nulla vera nota diversa sunt. Flos certe & villosa stamina, & papposum semen, & folia apice incisa omnibus unam perpetuamque notam impertiunt.

§. LIII.

Reduces, eandem viam iteravimus. Circa *S. Aubin*, aridis locis, *Buglossum angustifolium majus*, & *Caryophyllus prolifer*, & *Linum* illud capillaceo folio flore variabili a) provenit; in agris vero *Astragalus*, qui *Cicer sylvestre* dicitur *MATTHIOL* b). Latius discessimus, & ego quidem nave *Moratun* petii. In *Broja* fluvio, qui ex *Moratensi* lacu in *Neocomensem* fluit per media humidissima prara, passim *Solidaginem palustrem Persica* folio subtus incano, sex pedum altitudine se effferentem ex arundinibus, & *Tithymalum* vere fruticosum palustrem vidi, & utramque majorem *Nymph-*

a) Albo, albo cum lineis variis, subpurpureo lineato &c. quod *CASPARUS BAVHINUS* & *angustifolium flore magno* vocat, & *angustifolium* floribus dilute purpurascensibus vel carneis.

b) cum magn. fig. p. 413.

am vidi. In earum ea, quæ luteo flore est, eleganter vidi
expressam *staminum* & *Petalorum* adfinitatem, qua fit,
ut in floribus plenis mutata *stamina* se in petala explicent;
Vnde & non alii flores frequentius pleni sunt, quam ii, in
quibus abundant *stamina*, in *Gymnopolyspermis*, & adfinibus
Rosis arboribusque *pomiferis*, & denuo alio modo adfinibus
Aquilegiis &c. Nempe extrema corona, facta 14. petalis,
veram habebat in *Nymphæa lutea* naturam floralem. Ve-
rum, quæ interiora propius coronabant ovarium, ea angu-
stiora, solidiora, duabus pulverulentis lineis inscripta, de-
generant paulatim in verissima *stamina*. MORATO paludo-
sa prata vicina sunt, plenissima *Scordio*, quo universa fere
Helvetia inde sibi prospicit, & *Gratiola*. Ad ipsum litus la-
cus, denuo *Ranunculus longifolius* (BVSERT C). Inde steri-
lis via, & plantis rarioribus omnino destituta *Bernam* me
reduxit.

§. LIV.

Post aliquot dierum moram in Montem *Nennenen*, co-
mite viro verissimi iudicii ALBERTO HERPORT, iter repetit,
quod ante octo annos non infectandum fuerat. Ex summa
alpium catena passim promontoria, & secundaria juga pro-
ducuntur: Id quod conscendi, pars est catenæ, quæ haud
longe *Aquilegia* orta ab altissimis alpiibus, versus solis ortum
secedit, & longa serie *Sanensem Simmiamque* vallem a *Fribur-*
gensium ditione separat. Ad eum montem iter fit per val-
lem pascuis lætam, quæ ab amœnissimo pago *Belp* continua
ducit ad arcem *Burgenstein*. Sed prius, relicta valle, ver-
sus occidentem seceditur in pagum *Rieggisberg*. Inde ad-
scenditur per prata subuda, plena olim *Sedo* palustri purpu-
reo, nunc exusta sole, sub ipsis initiis dierum cunicularium.
Deinde

e) corp. XVIII.

Deinde per vallem *die rute* algidis aquis irriguam, modicis, sylvisque montibus septam undique. Sed & ea valle relicta ad meridiem nos convertimus, & adscensu non lenissimo ad sylvam venimus, atram, abiegnam, alpini ingenii, uvidio solo, & pene palustri. Passim procella strages ediderat inmensas arborum, in earum everfis truncis, loco in perpetuum sole carente, speravimus muscorum copiam & invenimus.

§. LV.

Vberrium ibi fuit novum genus *Bryi*, *capillaceum crassius capitulis per caulem exeuntibus*. Nascitur in cespites late virentes, habitu pene ejus, cui capitula globosa sunt. *Caulis* fusci, aliquando vero viridissimi, unciales & ultra, erecti, recurvo vertice. *Folia* pallida & virentia, ad unum plerumque latus vergunt, mollia, capillaria, incurvata & falcata. Per caulem subinde prodeunt *setae* ruberrimae, breves, vix trium linearum. In iis crassa ovata *capitula* subrubella, aut flava, operculo conico, quo delapso ciliari rubro villo coronantur. *Calyptas* non vidi. Habui etiam a STEHELINO nostro, ex altioribus sylvis *Jurae*. Maximo Botanico DILLENIO novum visum est. Conjecturam propono, num fuerit *Muscus Alpinus medius foliis tenuissimis & acutissime denticulatis, capitulis subrotundis unam partem spectantibus* MICHELLI a).

§. LVI.

In everfarum arborum truncis plurimum nascebatur, *multum musco plumoso eleganti* VAILLANTII a), *Bryum*, quod soleo

a) Nov. gen. p. III. n. 41.

a) Cujus folia avulsa a caule, confixae & dilatata setae specie mihi aliquamdiu inposuerunt, donec lentis accederet verax industria. Bot. Paris. p. 132. T. XXVII. f. 7.

soleo vocare *alternans calyptra variegata*, & *scyphulis foliis*. Dudum notum est, sed character imperfectius cognitus. Nempe *Bryo* nostro *caules* sunt inclinati, per sex fere lineas tantum foliosi, *foliis* distinctis, late viridibus, ex lata basi acuminatis, serpylli, nervo medio. In summo cauliculo alias pallida *seta*, uncialis, erectum *capitulum* gerens. Id longum est, cylindricum, leniter spadiceum. *Calyptra* infra albissima, fulva superius, qua vel sola dignoscitur. Sed alia plantula, ex eadem tamen radice nascentes, nulla capitula gerunt, & alienissima sunt facie. Earum cauliculus nudus aliquamdiu terminatur velut *scyphulo*, facto ex foliolis virentibus, aut rubentibus, quando seniores sunt, conjunctis, superius cavum interceptantibus. In eo *scyphulo* viridissimorum foliorum rosa est, si exquisitori microscopio utaris. Nam toti hi *scyphuli* nudo oculo pulverulenta capitula imitantur, & non aliter innotuerunt plerisque Botanicis. Primum DOODY nomine *Musci trichoidis* parvo *capitulo conglomeratione* sive *Botryoidis* dedit RAJO b), novamque simul classem inde constituit, quod *capitula pulverulenta* absque ulla *calyptra* haberet. Eadem planta PLUCKNETIO est *Musci trichoides*, *capitulo racemoso* nostras c). TOURNEFORTIO d) *Musci capillaceus minimus* *capitulo minimo pulverulento* dicitur: deinde RUPPIO e), & VAILLANTIO f), cuius non mala est icon, melior tamen BUXBAUMII g), qui *Musci* *fossis angustis* & *brevibus capitulis minimis rotundis in brevibus pediculis*

b) Hist. plant. III. p. 39. n. 6.

c) Almagest. p. 217.

d) I. R. H.

e) Flor. Jenens. p. 281.

f) Botan. Paris. p. 18 T. xxix, f. b. *Muscioides* vocavit, & ipse, quod solo pulvere constaret capitulum, absque membrana.

g) dit. Petropol. III. p. 273. T. xiv. f. 2.

diculis h). DILLENIVS, cum *Muscorum* genera constitueret, *Mniis*, quibus pollen absque calyptra & capsula nasceretur, principem hunc muscum fecit, dixitque *Mnion* perangustis & brevibus foliis i). Sed idem, ut est veritatis amantissimus, in literis suis ostendit, se hanc sententiam mutasse, & nostrum restituere *Bryis*. Quem vero ex RAJO k) nominat MICHELI l), pingitque, adeo a nostro recedit foliis capillaceis, ut non videatur idem esse, figura etiam ad lentem facta a nostra diversa est. Similis certe huic est figura MORISONI, quando *Muscum Coronatum* minimis foliolis pediculis & capitulis minimis erectis m) depingit, cujus descriptio, repetita a RAJO n) capitulum tradens puncto non majus, omnes vero musci partes minimas, ita differt a nostro, ut diversum existimarem, nisi conjungere juberet DILLENII o) auctoritas. Noster enim & major dimidia *Bryorum* parte, & lato folio est, & scyphuli multorum *Bryorum* capitulis majores. Quidquid sit, capitulum certe illud pulverulentum, certissime est rosa foliorum juniorum, & plantae, in qua enascitur, verissimum *Bryum*.

§. LVII.

Eadem ratione scobs illa in scyphis simillimis MARCHANTIE visa, & ambitiose delineata a MICHELIO a), merum est foliorum

b) *Enum. plant. circa Hal. nasc. p. 2:8.*

i) *Cat. plant. circa Giff. p. 214. & nov. gen. p. 84. cum icone, valde angustifolia T. I & denuo in synopsi RAJANA p. 78. Primus, in fallor, vidit capitula.*

k) Nomen ad not. b.

l) *Nov. gen. p. 103. T. 59. fig. 8.*

m) *Hist. oxon. III. p. 631. sect. xv. T. 7. f. 20.*

n) *Musci capillaris ovatum minimis foliis pediculis capitulis Hist. plant. III. p. 35. n. 10.*

o) In synopsi RAJANA.

a) T. I. ad G. H. I. M. pro feminibus.

liorum juniorum germen, ut in hac ipsa sylva observavi in *Marchantia capitulis integris*; neque forte diversa scobs fusca in roseis illis gemmis *Polytrichi* vulgaris maximi, nam ex mediis scyphis novas plantas provenire certum est. Sed ad sylvam nostram redeo. In ea, & circa *Drakau* prope *Bernam*, non rari sunt ad terram novum *Sphagni* genus, quod *acaulon maximum* voco, *foliis in centro ciliaribus*. Huic ex *radiculis* albis, & teneris, primo *folia* prodeunt in orbem reclinata, latissime virentia, lineis terminata parallelis, fine etiam obtuso. In eorum foliorum medio alia prodeunt *folia*, longa, pallida, glutinarum similia, fusco nervo in longum pilum educto. Amplectuntur hæc *capitulum* inter *Sphagna* maximum, raræ molis in toto *Muscorum* genere. Junius operculum habet, acuminatum, pellucidum. Id dejicit adultius, & in saccum fit e luteo rubentem, pyriformem, ore paulum contracto, & plerumque ad alterutrum latus propiori, plenum polline viridi. Longum vidi ad tres lineas, latum ad duas. DILLENIVS NOVUM *Muscum* esse confirmavit.

§. LVIII.

In corticibus arborum nascitur elegans illud *Sphagnum*, quod *Muscum terrestrem* majorem ramulis compressis *superficie crispis* vocat VAILLANTIVS, cum elegante icona a), quod & nomine b) & foliorum transversis undis simile est *Musco Linariæ folio majori* & *crispo* c) TOVRNEFORTII. Sed is *Hypni* species est, & circa *Zweylutschinen* copiosissime provenit. Emersimus tandem ex sylva, & per breve pascuum

L 2

ad

a) T. XXVII. f. 4.

b) Nam iisdem omnino vocibus MORISONVS & RAVVS in *Hist. plant.* III. p. 44. ad *Hypnum* intellexerunt, teste DILLENIO in *Synops.* p. 89.

c) *Hist. des plant. ant. de Per.* p. 504. & I. R. H.

ad medicatas Aquas, quæ a M. Gurnigel nomen habent, pervenimus. Ibi dum corpora procuramus, aquas infectas odore ovorum putridorum bibimus, limpidas, summo in æstu innoxias, quarum multas ad vicia ventriculi, & fluores albos, & mentium defectum usus est apud nostrates. Olim examinata aqua multum dedit innatantis petrolei, quod cuticulam efficit in superficie, non semel renascituram, si demseris. Viridi colore tingit violarum syrupum, & adjecto liquore Tartari magnam vim terræ teneræ albæ deponit, quæ luculenta sunt indicia terræ calcariæ.

§. LIX.

A meridie prima ambulario nostra fuit in Montem *Ober Gurnigel*, leuca fere altiore balneo, quod & ipsum sublimi situ positum est, ut & prospectu lætissimo fruantur incolæ, & sole diutissime fulgente, dies haud paulo longiores sunt, quam in vicina. Via ducit per sylvam, similem priori (LV), in quamagna provenit vis elegantis plantulæ, quam ob semen *Aparinen* dixeris, a) nisi ob folia quaterna latamalis *Cruciatam* vocare. Descriptio JOHANNIS BAVHINI b), & icon ejus, deinde icon BOCCONE c) sufficiunt, neque enim video verum aliquod esse utriusque discrimen: Nostræ certe folia subhirsuta sunt, BOCCONIANÆ plantæ similia. BAVHINORVM d) stirps vero a nostra non diversa est. Id enim &

- a) Ob flores in paniculis ex alis summorum foliorum, & semina hispida.
- b) *Rubia quadrifolia* semine bino hispido III. p. 712. CHARR. p. 547.
- c) *Rubia* semine duplici hispido, latis 5 hirsutis foliis plant. rar. Sicil. &c p. 10. T. VI. f. 1.
- d) *Rubia quadrifolia vel rotunda levis* Prodr. p. 145. Pm. & ex eo I. B. III. p. 711. Nam peculiari, suoque nomine describit lectum circa *Thermas Valesas* CASPARUS. Eam *Rubiam quadrifoliam rotundam*

& locus natalis, & ipsa planta in *herbario vivo* CASPARI visa
persuader. Vox *glabra* fraudi fuit BARRELERIO c) & BOCCONE,
ut novam facerent, RAJO f) MORISONO g) ut eam,
BAVHINIANA distinguerent. TOVRNEFORTIVS h) BOCCONI-
ANAM solam habet.

§. LX.

Supra eam sylvam lapidosa pascua sunt. Nihil ibi fre-
quentius *Dente Leonis floribus croceis*. Ei in universum
habitus est vulgaris *Taraxaci*. Folia tamen & minus pro-
funde dentata, minusque hamata sunt, extremo segmento
sub rotundo, & lenissime acuminato. Caulis firmior, quam
Taraxaci, pedalis, quando altissimus est, uniflorus. Flos
quam *Taraxaci* minor, satore aurantius & pene rubens.
COLUMNNA a) stirpem habet nostrae similem floris colore, fo-
lia non respondent. Ex ea *Dens Leonis minor laciniatus flo-
re croceo* MORISONI b); *Dens Leonis alpinus minimus glaber*
TOVRNEFORTII c); & *Dens Leonis spatulae folio dentato forte*

L 3

VAIL-

dam leonem dixerunt PARKINSON p. 176. RAI *fl. stirp. extra Brit. p.*
225. *Hist. p.* 178. cum asterisco. FLUKN. p. 323. & MORISON
III. p. 329. qui eandem stirpem ter in eadem pagina repetit.

c) *Cruciata major villosa flore molluginis alba* BARR. IC. 324. qui I. B.
plantam dixit *Cruciata minor glabra flore molluginis alba*
IC. 323.

f) Vitur nomine socconit, hist. p. 478.

g) Plantam I. B. vocat *Rubiam quadrifoliam semine duplici hispida*
Hist. oxon. III. p. 319. quod nomen est HERMANNI *hort. Lugd.*
Bat. p. 19. Plantam vero socconis eo nomine, quo usus est Al-
thor ib. p. 328. Idem FLUKNERTVS habet p. 321.

b) *Cruciata floribus paniculatis nascentibus*, I. R. H.

a) *Hieracium alterum minus* IV. *Erp. rar. stirp. II. p. 129.*

b) *Hist. oxon. III. p. 74.*

c) I. R. H.

VAILLANTII d), si quidem eandem intelligit. RAJVS COL-
VMNÆ nomen retinet e). Sed certiora nostri synonyma
sunt *Dens Leonis foliis extremo subrotundis floribus aureis*
SHERARDI f), quod nomen pene definitio est plantæ nostræ;
Hieracium minus saxatile dentis Leonis folio unico caule flore
flammeo TITÆ g). *Hieracium dentis Leonis folio obtuso mi-*
nus SCHEVCHZERI h), & *Hieracium dentis leonis folio obtuso*
minus flore ferrugineo ejusdem i). Mihi SHERARDI nomen
aptissimum videtur. Abunde vero per alpiam humiliora
pasqua provenit.

§. LXI.

Leucanthemum pro alpino folio rigido habitum multum
ibi provenit, varietas omnino vulgaris, folio crassiusculo, fir-
mo, acuto, flore majori pro portione plantæ, sed nihil ve-
ri habens discriminis, uti neque in *Dolaz* & *Thuri* habet,
ubi lectum RAJVS a) pro singulari describit. *Bellis* vero
alpina major rigido folio CASPARI BAVHINI b), & a nostra,
& a vulgari diversa videtur, ei enim folia ad terram eximie
longitudinis, omnia vero acuta & profunde serrata sunt.

§. LXII.

Frequens & in Jura & in subalpinis est *Campanula*
alpina linifolia cœrulea. Ea & hic nata fuit, foliis imis re-
vera

d) *Comment. Acad. scient. Paris.* 1721. p. 231. sed is de plantæ CO-
LVMNÆ dubitat; *spatula* vero folium nostræ foliis dissimili-
mum est.

e) *Hist. plant.* p. 246. cum asterisco.

f) *In Sylg. stirp. extra Brit.* p. 399.

g) *In itin. post bert. Mauroc.*

h) *It. I.* p. 40. Planta nostra est, nomen alienissimum.

i) *It. IV.* p. 336.

a) *Sylg. stirp. extra Brit. nasc.* p. 76. nam & ibi legi anno 1736.

b) *In Prodr.* p. 120. & *Pinacc.*

vera rotundioribus, reliquis Lini, primis serratis leviter, plerisque non dentatis. Ea habitu differt a *rotundifolia alpina*, & duritie, foliisque nullis, ut in hac solent, latis serratis, sed subito gracilibus omnibus, præter ea, quæ rotunda sunt ex radice. Avulgari *rotundifolia* magnitudine floris facile differt, quæ ita eam superat, ut propior sit *Campanula persica folio* cujus tamen folia nulla rotunda sunt.

Inventor CASPAR BAVHINVS a) nomen dedit & descriptionem, quem HOFMANNVS b), MAGNOL c) TOVRNEFORT d) & RAJVS e) secuti sunt. JOHANNES *linifolia cærulea* f) dixit, idque nomen PARKINSONVS g), VOLCAMER h) & magno in opere RAJVS i) habent. LINNÆVS k) post MAGNOLIVM l) conjungit *alpina rotundifolia*: JOH. BAVHINVS m) & TOVRNEFORTIVS n) vulgaris varietatem fecerant. Sed potest distincta manere, media quasi inter *vulgarem rotundifoliam* & *persicifoliam*. Ejus varietas o) est omnino, ad pedem Gottbardi a me reperta, *Campanula alpina linifolia cærulea*, flore uni-

CO

a) *Phytolip.* p. 139. *Prodr.* p. 34. *Pin.*

b) *Delic. sylv. flor.* Altorf.

c) *Bot. Moufpet.* p. 47. ubi & icon addita est, postea vero sententiam mutavit.

d) I. R. H.

e) *Syl. plant. extra Brit.* p. 83.

f) II. p. 756.

g) *Theatr.* p. 650.

h) *Flor. Noric.* p. 79.

i) p. 740. cum asterisco.

k) *Flor. Laponic.* 74. neque certus tamen.

l) I. c. p. 91. postquam folia ima rotunda viderat.

m) Jungit enim *linifoliam* RHALIS; sed ea vulgaris est.

n) *Hist. des pl. autour de Par.* p. 184.

o) Folio latiori & hirsuto, flore pro humilitate plantæ magno, sed & nostræ ima folia subhirsuta sunt.

eo *grandi in summo cauliculo* SCHEVCHZERI p), cui omnino similis est *Campanula montana minor angustifolia* BARRELE-RII q), neque recedit *Campanula caule uniflora* LINNÆI r). *Campanula foliis Anchusæ floribus oblongis* ibidem in faxosis aliquoties obvia fuit, a qua, ut obiter moneam, neque *Campanula alpina aspera foliis Echii flore magno villoso* PLUCKNETII s), neque *Campanula minor hirsuta Drabæ foliis* t) diversa est.

§. LXIII.

Altera die, quæ fuit 17. JULII post hanc quasi velitationem, in M. Ober Neunenen tribus aut ultra horis ab Aquis medicaris distantem, prima Aurora iter suscepimus. Primum stadium per sylvam est abiegnam, in qua magna vis *Equiseti sylvatici tenuissimis setis*, cujus spicam floralem, in folioso caule enascentem, brevem & subspadicam tunc legi. STÆHELINI nostri hic recenseo experimentum, mutilatum certe in *Commentariis Parisiis* a), elegans, & quod vix fallit. *Equiseti* cujusvis, sed in primis *arvensis*, cui flos a foliis sejunctus nascitur, primo vere vigentis, spica excutitur supra Chartam, elabetur ex octenis capsulis, quæ sub scutis narrantibus adsunt, pollen viridis, adeo ponderosius, ut in aqua fundum petat. Is quando paulo siccior, neque siccissimus tamen, super vitrum effunditur, & admovetur microscopium, tripudium cernitur elegans, & aurium etiam indicio percipitur. Corpuscula nempe spermatica innato elatere se mo-

p) *It. alp.* IV. p. 484. f. 14. & *pauca rotundifolia flore cæruleo* *pytagono grandi* *It. alp.* II. p. 131.

q) *ic.* 457.

r) *Flor. Lapon.* 85. T. 9. f. 5. 6.

s) *Almagest.* p. 136. T. 55. f. 6.

t) *ibid.* 3. *Almagest* 85. T. 9. f. 5. 6.

a) 1730. *ibid.* p. 88.

movent, & contorquent. Ea sunt sphaerulae fere, instructae cruribus duobus, ad quinque usque, quae extrema parte bifida denuo conjunguntur in laquei speciem. Ea cruscula elatere summo resiliunt, & per plura horae minuta subsiliunt in aliquam distantiam. Ita vulgarissima planta omnes *Polypodii sensibilis*, & *Oxyboldis GARCINI*, & *Mimosa* motus longissime superat agilitate & constantia. Saepè in Helvetia, saepè in Germania, elegans experimentum iteravi, quod primum apud STÄHELINUM b) videram.

§. LXIV.

Supra eam sylvam acclive pascuum est, in quo fons medicatus, lignea casa tectus, scaturit: Ibi aqua valentior bibitur, & odore graviore. Deinde alia sylva sequitur, & ipsa uligine impedita, atque hanc longissima, ascendenti pascua, neque quidquam habentia, quod invitet Botanicum. Supra ea sequitur sylva suprema, ad quam ex altioribus mapalibus lignatum veniunt. Ibi praeter vulgarissimam semper virentem *Vitem* Ideam fructu rubro, in cavis arboribus reperi *Chamaenerium alpinum alpine folio*. Et jam ex sylva in pascua Unter Neunen veneramus, ubi triste *Cerium a)* expertus fueram ante octo annos, casa debili, & perflata ventis defensus ab horribili tempestate, quae omnium intra hominum memoriam atrocissima & maxime diuturna fuit. Supra ea mapalia secuti dorsum eminens inter duas convalles, paulatim vidimus stirpes rariores augeri, uti decedebat altitudini. Plurima ad viam *Myosotis alpina latifolia*, quae variabili ingenio modo glabra, modo villosa est, folio auriculæ

b) Dum hæc scribo, reperio descriptum, in ejusdem STÄHELINI *Tesf.*

Anat. Bot. 1711. p. 4.

a) Id nomen fecit SCHREVICZERUS libro singulari, in quo ejus noctis calamitates descripsit.

culæ simili brevique, aut longiori, semper simillima *arvensi* subbirsuta magno flore, nisi quod folio latiori, & breviori sit. Ibi & *Pedicularis* illa *foliis conjugatis* b), cujus alibi descriptionem dedi, & ea, quæ *Teucrii* est folio coma atrovubente, nobis *STÆHELINTA* dicta b*). In uliginosis vero pratis, jam legeram vulgarem *palustrem* elatiorem, alias albo flore, alias adeo exiguam, ut a cubito ad duas uncias reduceretur ejus statura, semper sui similem magno flore, cujus crassius tubus est, & folio. *Momorchis* dudum apparuerat, hoc ipso vero loco frequens illa *Pseudorchis* c), de qua alio loco dixi. *Veronica saxatilis serpyllifolia* d) non crebra, frequentior nostra, cui *calyces* birsuti, *floresque* congesti e) sunt; frequens etiam *RAJANA saxatilis cauliculis nudis* f). Dudum etiam nascebatur *Phalangium alpinum palustre* lridis folio, cujus *stamina* levem pediculum habent, siliquæ distinctæ sunt, uti recte *MOEHRING* g) atque *LINNÆVS* h). Plurimus ibi *Dens Leonis croceo flore* i), & *Tragoselinum umbella rubente*, elegans varietas vulgaris speciei. Plurima ad vias *Acini pulchra species*, quam *Aquilegienses* alpicolæ ad pectoris morbos commendant, grati aromatis plantula. Vbique cespites faciebat *Quinquefolium alpinum minus repens aureum*, magno flore, sericeisque villis ad oras nervosque. *Caryophyllata alpina minor* onusta hirsuto capite; *Auricula ursi lutea*, jam matura, *Gentiana alpina pumila verna major*, & *Gentiana* quam

b) *Diff. de Pedicular. v.*

b*) *l. c. III.*

c) *St. hercyn. XLII.*

d) *Progr. de Veronic. alp. II.*

e) *ibid. IV.*

f) *ibid. VI.*

g) *Hort. priv. p. III.*

h) *Flor. Lapon. 137. sed is de alia specie loquitur.*

i) *lx.*

quam voco *elegantissimam* Bavaricam CAMERARII. Ea distat a priori foliis neque acutis, neque in rosulam ad terram congestis, sed rotundioribus, & multis conjugationibus ad caulem dispositis, demum segmentis floris non acutis. Cæterum & aures albas inter segmenta floris habet, & ipsum floris centrum album est. Vulgaris certe in alpebus plantæ, neque satis notæ tamen, CAMERARIUS k) bonam iconem dedit. CASPAR BAVHINVS non bene conjunxit *pumile verne* majori. Nihil ad ejus historiam PARKINSONVS l) addidit, nihil MORISONVS m), nihil RAYVS n), qui in natali solo prope *Augustam vindelicorum* plantulam CAMERARIANAM legerat, neque MERRET o), neque PLVKNETVS p). TOVRNEFORT & SCHEVCHZERVS non habent. BARRELERIVS, qui *Gentianarum* iconibus multiplicandis sibi videtur placuisse, & CAMERARIUS iconem habet q), & denuo videtur depinxisse cum nomine *Gentianæ alpinæ vernæ minoris folio subrotundo flore cæruleo r)*.

§. LXV.

Alfines alpinæ serpyllifoliæ magna vis ubique est, quæ a multicauli vulgari flore multo majori distinguitur, & *Helianthemi serpyllifolii* flore aureo odorato, de quo vereor, ut satis distinctum sit, a vulgatissima specie. *Viola rotundifolia*

M 2

lia

k) Hort. med. 1c. xv. n. 1. & p. 65.

l) *Gentianella minima elegantissima Bavarica Camerarii major. Theatr.* p. 407.

m) *Hist. oxon.* III. p. 432. eod. nom.

n) In *bislor.* p. 720. eodem nomine. In *synog. stirp. extra Brit. nasc.* vocat. *Gentianellam minimam flore unico cæruleo elegantissimo.* p. 152.

o) Si nostram intelligit, dum *Gentianellam minimam Bavaricam* recenset, quam vix existimaverim Angliæ indigenam esse. DILLMANIA certe *synops.* non habet.

p) Eod. nom. *Almagest.* p. 157.

q) 1c. 101.

r) 1c. 98.

lia lutea passim ad saxorum umbrosas intercapedines. *Violeta* vero *montana lutea grandiflora*, in tenui gramine. *Plantago angustifolia alpina*, *Osmunda lunato folio*, *Rapunculus folio oblongo spica orbiculari*, *Chamaerhododendros alpina glabra*, gallarum vicio ludens a), *Bistorta minima*, *Selaginoides foliis crispis*; *Lichen ille pulmonarius saxatilis tenuiter laciniatus elegantis sulfurei coloris* SCHEVCHERI b) varius colore, & divisione, *Bryum alpinum crinium crisporum facie* c), *Lichen alpinus corniculatus niveus*, d) varietas pyxidati, & alia varietas oris fungosis ruberrimis, tum *Lichen crustaceus saxatilis farinaceus globulis minutissimis undique refertus* MICHELÌ, & alius fungosis carneis capitulis; *Gramen typhoides spica brevi densa & veluti villosa*. *Gramen sparteum junceifolium*, *Gramen Anthoxantho adfines laxiori spica* e), *Gramen paniculatum elegans locustis proliferis* f), *Juncoidis & Cyperoidis species aliquot*, *Hieracium latifolium villosum magno flore*, nondum maturum, Ea omnia in *M. unter-Neunenen*, frequentia sunt, alioquin in alpinis non rara, neque ideo obscura, ut mereantur illustrari. Sed quam primum inter inaccessos solidissimarum rupium vertices *Ganterisch & Neunenen* vallem subivimus frigidam, umbrosam, angustamque, quæ *ober Neunenen* vocatur, jam gratiores laboris nostri fructus uberrime decerpere licuit.

§. LXVI.

Ad viam *Cardui* genus humile, ramosum, multiflorum, foliis ciliaribus spinulis undique ad oras asperis, immaturum. Id

a) SCHEVCHER. It. II. T. XIX. f. 1. 2. 3.

b) It. VI. p. 514.

c) Ejusdem T. modo cit. f. 5.

d) Ejusd. p. 137. n. 58.

e) *montanum odoratum spicatum* J. SCHEVCHER.

f) *Gr. montanum spica foliacea graminea* It. I. T. IV. f. 2.

Id ad *Carduum mollem* retulimus dictum alibi, (xxix.) licet folio molliori, caule multifloro, capite etiam in juniori planta ampliori diversitatem quamdam affectaverit. Sed alia *Acanacea* planta ibi plurima est ad semitam, quæ ad easdem alpinam ducit, *Cirsium* nempe *alpinum spinosissimum floribus ochroleucis inter flavescientia folia congestis*. Idem & alibi per alpes in convallibus, & ad rivos provenit. Ei dura radix, depacta. *Caulis* humilis, ad cubitalem usque. *Folia* inferiora copiosissima, *Carlinae* facie, crispâ, laciniata, omni lacinia in spinam acutam exeunte, suprema vero folia latiora, albida, *Cnici* instar nidum efficiunt *Floribus*, sessilibus, in summe caule congestis. His, quod abunde prospectum sit vallo foliorum, nihil inest spinosi; *calyx* simplicibus, longis, acutis foliis sit, quæ in mitem spinulam terminantur. *Flosculus* profunde quinquefidus; & *Tuba* & *Tubus flaminum* ochroleuca. *Pappus* in placenta simplex, in seminum capite plumosus. Antiquissimus Botanicus ARETIVS a) descripsit, & nomen fecit Gross Eberwurtz. *Silybum* vocat SIMLERVS b) dum ARETIVM exscribit. *Carlina polycephalos alba foliis superioribus candidis* CASPARO BAVHNO c) est absque synonymo; & ex eo *Carlina polycephalos alba* dicta est RAJO d), TOURNEFORTIO e), MAGNOLIO f), TILLIO g), SCHEUCHZERO h), cui nota fuit. Sed & TITA eam in alpinis legit, fecitque nomen *Cardui alpini spinosissimi polycephali*
M 3

a) Ante hort. Germ. GESNERI p. 234. b.

b) Valles. & alp. descr. p. 327.

c) In Pinace p. 380.

d) p. 309. cum asterisco.

e) Schol. Botan. p. 218. I. R. H.

f) Hort. reg. Monsp. 44.

g) Hort. Pisan. p. 33.

h) It. alp. II. p. 134.

phali foliis in summitate albicantibus & albo flore i), quod nomen ita reformavit PONTEDERA, ut *Cnicum alpinum humile spinosum flore pallente* vocaret *k*). Et non videtur dubium, idem esse *Cirsium acanthoides coma florum flavescente montis Carthusiani* PLYMIER in *posthumis* apud VAILLANTIVM l). Ego nomen feci ex suis notis.

§. LXVII.

Ibi exoptatissimum pabulum *Phellandrium alpinum umbella purpurascens*, cum *Dauco Cretico* mistum ubique nascitur, humile, & pene sessili umbella. Ei calyx generalis nullus, particularis vero ex aliquot longis foliolis, semina fulcata, brevia *Petala* purpurascens, inaequaliter cordiformia, inaequalia, quorum extimum insigniter majus est reliquis, apices purpurei globosi, cum duabus de more *Tubis*. In hac ergo planta felix fuit TOURNEFORTIVS, quæ *Phellandryo* undique, flore non solum & semine, sed calyce etiam convenit.

§. LXVIII.

Ex ipsa hac valle fluvius, *die Gürbe*, tenuibus principis oritur, deinde per vallem, quæ inter *Belp & Dosan* media est, descendit, & ligna in altissimis sylvis cæsa, non sine magno labore eorum, qui operi præsumunt, in *Arolam* defert, civium destinata commodis. In exigua palude, quæ prima stamina generat hujus fluvii, provenit *Scorpiuri* species alpina. *Scorpiurum* voco post MORISONVM a) id genus plantarum

f) *It. alp. post hort. Maurocen.*

k) In *epist. ad SHERARD* p. VI.

l) *Comment. acad. Reg. scient.* 1718. p. m. 203.

a) III. p. 451. cum solus MARTIN sequitur *cat. plant. circa Cassabrig.* p. 47.

tarum, quod ab *Heliotropio* b) & *Lithospermo* c) separatum; DILLENIVS d), & LINNÆVS e) *Myosotidem* dicunt. Neque enim placet absque summa necessitate mutare classica nomina, neque *Myosotidis* nomen melius huic plantæ convenit, quam TOVRNEFORTIANÆ, imo vero *Myosotis* RUPPIANA signaturæ etiam minus responderet. *Scorpiurus* ergo *Alpina* folio est hirsuto, lato, caule humili, flore magno, vividissime cœruleo f). Hanc varietatem, nam vera est varietas speciei *palustris*, NOCCONE g) descripsit nomine *Echii scorpioidis alpini nani tomentosi supini*. Deinde *Lithospermum Alpinum tomentosum minimum* TOVRNEFORTIVS h), SCHEVCHZERVS i), TILLIVS k). *Lithospermum alpinum minus flore purpurascens, & flore albo* PONTEDERE l), ejus varietates sunt. Is, cum SCHEVCHZERO ad *arvense* potius retulit, sed flores majores facile demonstrant, ad *palustre* referendum esse. Verum nihilo magis differt a *palustri*, *Myosotis scorpioides latifo-*

b) Cui adcenfuerat HERMANNVS & BOERHAAVIUS, differt omnino segmentis nullis intermediis deinde globulis luteis, qui corollam faciunt, qua fauces clauduntur.

c) Eo retulerat TOVRNEFORTIVS ob semina, differt floris tubo breviori, & floralibus spicis Scorpii caudam referentibus, quæ vetustissima similitudo est, GESS. tab. coll. stirp. 80. b. hort. German. p. 280. & Rondelet apud GESSNER epist. p. 84. b.

d) Nov. gen. p. 99. T. III.

e) Flor. Lapez. 75. &c.

f) Quo solo a *palustri* recedit, & similior est *arvensis*: sed dudum notum est, plantas alpinas odore, sapore, vividitate coloris superare plantas soli humilioris.

g) Mus. di piante p. 49. T. 107. ipse *palustri* simile facit flore, semine, perenni vita.

h) I. R. H.

i) It. alpin. II. p. 137.

k) Hort. Pis. p. 106.

l) Compend. Tabular. p. 83.

Latifolia hirsuta MERRETI m) & RAJIN); neque unquam, opinor, distincta fuisset, nisi adeo animis hominum infunderetur opinio, glabram o) esse eam speciem, quæ flore est majori: Quare cum hirsutam hanc viderent Botanici, & altiozem, & nascentem in dumeris, umbrosisque, factum est, ut eam distinguerent. *Lithospermum arvense* majus dixit SCHEVCHZERVS p), *medium* VAILLANTIVS, *Myosotidem hirsutam montanam* & *sylvaticam* DILLENIVS q), & SIEGESBECKI), *Myosotidem sylvaticam præcocem latifoliam hispida* RUPP r), BVXBAM t), & ultimo loco inter Botanicos nominandus ERNDL u). Ego certe nonnisi duas *Scorpiuri* species agnosco, flore minori, cujus varietas est illud, quod a luteis floribus nomen habet non optimum w); & flore majori, cujus tres varietates sunt *palustris vulgaris, sylvatica maxima,*

m) *Pin. rer. britannic.* p. 82.

n) vel DILLENII *Syn. RAJAN* p. 229. T. IX. f. 2.

o) Apparet ex nominibus HERMANNI, ROERHAAVIT, MAGNOLII, VOLCAMERI, DILLENII, SIEGESBECKII, LINNÆI. Nostri vero, ubique vulgaris, & quam ex Belgio misit vir Clar. ADRIANVS A ROYEN, pilos habens utique, & ægent in solo sicciore.

p) *It. alp.* II. p. 137.

q) *Cat. plant. circa Gieß.* p. 46.

r) *Primæ. flor. Petrop.* p. 77.

t) *Flor. Jenens.* p. 3.

u) *Enum. plant. circa Hal.* p. 231.

v) *Viridar. Warfar.* p. 30. Hanc censuram meretur, vel ob solum insignissimum plagium Fungorum omnium, quos ex HOFMANNI *delictis sylvestribus* ad verbum exscripsit; & aliunde præterea patet, eum paucissimas unquam legisse plantarum, de quibus loquitur.

w) *Erbium scorpioides minus fuscule luteis* C. B. in *Prodr.* p. 119. Nempe, etsi ratio luteoli umbilici ad segmenta corporis paulo major sit, non tamen flos luteus dicendus, cujus maxime conspicua

pars

& *alpina humilis*, si quidem hæc omnino etiam *varietatis* nomine digna fuerit.

§. LXIX.

In rupibus vicinis ubique *Rubeola saxatilis alpina* *BOCCONE* nascitur, quæ varietas est vulgaris (*alii albi minoris* a), paulo, ob loci rationem, humilior, & asperior. Plurima ibi *Lychuis alpina pumila* *gramineo folio* instar purpureum tapetum late saxis instrata, & *Saxifragia Pyrenaica* *foliis partim integris, partim trifidis*; Namque verissime, ex una radice, in unum cespitem, enascuntur *foliola* & integra, & bifecta, & trifecta. Solitaria vero, & in eodem loco non infrequens est *Saxifragia* alia; foliis modo integris modo trifidis, quam cum priori non bene coniunxit *SCHREUCHERUS* b). Eam diu c) pro nova habui, neque certe quisquam, præter *COLVMMNAM* d), eam descripsit, ejusque verbis recentiores nihil addiderunt, Sedum vero alpinum pallido flore *GARIDELLI* e), ut icone nostram refert utrunque, alienissimum nomen, habitum vero multo altioris habet. Nostræ enim ex gracili radice folia ad terram multa in obtusam linguam ex gracili ortu educuntur, viridia, non crassula, subhirsuta.

In

pars vividissime est cærulea. Hæc cæterum varietas tota hispidiior, calyce hirsuto fusco, & habitu minime distinguitur.

a) *Mur. di piante* T. 101.

b) *It. alp.* l. p. 49.

c) Et dixi *Saxifragiam alpinam habitu androsaces villosæ* *Com. Lit. Phys. Med. Norimb.* 1732. p. 196.

d) Nempe dixit ille *Sedi alpini* III. var. *foliis integris* *Ephras.* II. p. 66. *Saxifragiam* III. in ic. p. 67. *RAJVS* *Sedi alpini* tertii fr. *GREGORII* secundam varietatem p. 1043. *MORT.* *Sedum alpinum* fr. *Gregorii* III. *Col. Hist. Oxon.* p. 476. descr.

e) p. 438. ic. 91.

In nostris alpinis semper integra vidi, incisā f) vero uno alterove dente ex *Rhaetia* adtulit D. HYBRVS in hac ipsa Academia P. P. *Caulis* vix foliosus, paucos flores gerit in vertice. *Ovarium* sub flore est, uti in *Saxifragia* solet. *Petalā* obsoletē alba ex viridi, atque lineatā. *Stamina* decem, quorum quinque longiora, apicibus luteolis. Ex summo ovario *Tubē* longiunculā duā apice recurvā. Vocō nunc *Saxifragiam alpinā subbirsutam foliis longis raro dentatis*.

§. LXX.

In cafa alpina M. Ober *Neunen* cibo & quieti aliquantum temporis dedimus. Circa eam cafam, ut alibi in *Jura* & *alpinis* abunde provenit *Lapathum*, quod *rotundifolium* dicunt, oblongo vero & obtuso folio est; & *Napellus*. In vestigiis defluentis nivis uberima *Soldanella alpina*, nam majorem & minorem non distinguo. *Tblaspidium Aneuse* folio ubique, & inter lapides *Juniperus alpina*, & *Leucojum vernum perenne album majus*.

LXXI.

Supererat adfcensus unius horulæ, per angustā vallis scopulorum limitem, atque salebrofam viam, vocantē *die leiter*: id circa meridiem confecimus, non sine magna ex pulcherrimis plantis concepta voluptate. Nascebantur non remoti ab invicem *Ranunculi*, quos expedire & facile erit, & minime inutile. Ergo in *Alpinis* omnibus & hic etiam frequens provenit *Ranunculus* flore flavo splendēte magno, cujus diameter etiam unciam superet, *foliis* ad caulem sub

ramo-

f) Ea est varietas foliis incisīs *Sedi alpini* III, fratris GREGORII apud COŁYNNAM l.c. p. 66. & *sedum alpinum tertium* in iconē, eodemque nomine н. о. х. о. в. in iconē f. XII. T. 9. f. 2. *Sedi alpini tertii* fr. GREGORII secunda varietas RAIL p. 1043.

ramorum ortu gracilibus, digitatis, ad terram simillimis vulgaris *cretae aeris*, trilobatis, lateralibus lobis bipartitis in duas partes, quarum interior tripartita obtuse, exterior bipartita est. Medius lobus tridentatus; Omnia, ut tota planta, & ipse calyx, hirsuta.

§. LXXII.

Alter non vulgaris, ad deliquia nivis cum albo, sed rarior, in *Gottardo*, *Gemmio*, & hic in *Ober-Neunenen* provenit, humilis, nisi quod aliquando laetius exurgat ad 3. 4. ve uncias, *radiculis* multis, longis & albidis, *foliis* & habitu levi, excepto *cauliculo*, qui hirsutus est; Ad radicem *folia* trilobata lobis lateralibus bifidis obtusis, medio trifido, subrotundis dentibus incisa, ambitu toto, orisque rotundis. Ad caulem fere uno loco unum trifidum vel quadrifidum folium, latis lobulis, quorum qui cauli proximi iidem minores sunt. *Flos* luteus splendens, in cauliculo triunciali, minor.

§. LXXIII.

Tertius alio tempore (Julio M. 1736.) lectus in *M. Thuri*, secundo (LXXII.) similis est, levitate folii, caulis hirsutiae, statura; Est tamen altior, & folia ad terram multo acutioribus segmentis incisa, ad caulem vero profundius digitata sunt segmentis gracilibus.

§. LXXIV.

Quartus albo colore petalorum, eorumque figura cordis simili satis diversus, praeterea unam tantum alteramve ad caulem ligulam habet ex albida vaginula, *folia* ad terram vel integra, & per ambitum rotunde dentata, vel minus profunde trilobata. Accedunt tamen ad *folia* ejus *Ranunculi*, quem secundo loco diximus (LXXII.) *Ovarium* longius & pene in morem *palustris apii folio levis*.

§. LXXV.

Omnes hi *Ranunculi* habuerunt suos Botanicos, a quibus distincti sunt suis nominibus. Er prior videtur esse *Ranunculus alpinus pratensis repenti similis sed minor* MICHELII a) apud RILLIUM An & *Ranunculus* IV. MARTENS b)? non recedit. Mihi vero certissime, etsi in *Gottardo* & supremis alpebus proveniat, est ipsissimus *erectus aeris*, neque aliam ob rationem ejus memini, quam ut monerem, ne pro novo habeatur ab aliquo *cypripedium*.

§. LXXVI.

Alter (LXXII.) dudum a JOHANNE RAVHINO a) traditus est pro varietate *albi*, & ejus icon *albi* iconi adjecta b). Eum MARTENS pro *secundo* c) delineat, nisi forte ob floris exiguitatem separari debeat. LINNAEVS *Ranunculum* dixit *caule unifloro foliis radicalibus palmatis, caulibus multipartitis sessilibus* d), deditque iconem nostri simillimam, uti neque desunt mihi specimina, in quibus caulibus foliis destitutus humilitate *pygmaeum* e) ejus refert. Eundem, ob lanuginosos cauliculos, & folia exigua, intelligere videtur SCHRECHTZERVS, quando *Ranunculum saxatilem* magno flore f) in *alpinis* nasci dicit. Eo nomine plantam descriperat CASPAR RAVHINVS g), ita ut non recedat descriptio a nostro, sed

LXXVII.

a) Hort. Pisav. p. 145.

b) It. Spitzberg. c. IV. T. I. ad D.

c) III. p. 86.

d) Superiorum interior, non mala.

e) l. c. T. G. l. c.

f) Flor. Lapon. 133. T. III. f. 2.

g) varietas l. c. T. III. f. 2.

h) l. c. p. 46. in M. Jacob & Lambergrad &c.

i) Prodr. p. 96. Pin.

sed stirpem perpetuas nives amantem nasci *Monspeli* non visum est probabile. Neque quidquam inveneram in PARKINSONO h), RAJO i), TOVRNEFORTIO k) & TILLIO l), unde plura de *Ranunculi monspeliensis* historia discerem. Hic omnino videtur a vulgaribus diversus manere posse.

§. LXXVII.

Tertius (LXXIII.) pro novo descriptus fuit a JOH. BAVHINO a), qui eodem in loco eum legit, quo & ego inveni, cum *Tbora* in supremis pascuis M. THYRI nascentem. RAJVS b) eodem etiam loco, eundem invenit & distinxit. Figura BAVHINI rudior est, sed tenuis incisio foliorum, & ad caulem gracilitas sufficit. An fatis a priori diversus? Multæ varietates intermediæ mihi videntur conjungere utrumque. Quia tamen JOHANNES BAVHINVS eos distinguit, & utriusque propriam iconem dedit, non intercedam, quin *Ranunculus tenuifolius montanus luteus* suum locum in familia distinctum tueatur, quem, nisi invenirem distinctum, non distinguerem, & etiam nunc invitus distinguo.

§. LXXVIII.

Quartus abunde distinctus est, neque quisquam eum conjungere ausus est, nisi cum secundo (LXXII.) JOHANNES BAVHINVS a). Et dudum etiam monitum est b), *majo-*

N 3

rem

h) In C. B. *Theatr.* p. 338.

i) *Syll. plant. extra Brit. nasc.* p. 216. & *hisp.* p. 595. cum asterisco.

k) I. R. H. *Schol. Bot. Paris.* p. 217.

l) *Hort. Pisan.* p. 144.

a) *Ranunculus montanus tenuifolius luteus* III. p. 416.

b) *Syll. g. plant. extra Brit.* p. 216. *bisler. plant.* p. 592.

a) Et ex eo, planta non visa, MONTANVS & RAJVS. Ceterum icon JOHANNIS *exterior* hunc exprimit.

b) A JOHANNES BAVHINO & SCHEUCHZERN IV. p. 339. &c.

rem varietatem CIVSIT a minori nulla vera nota separari. Vidi enim majorem folio rotundo integro, & minor, qui idem vulgator, plerumque est divisus foliis. Is omnino videtur, licet colore floris differat, vel simillimus certe est nostro, *Ranunculus caule unifloro & unifloro foliis tripartitis*: si forte LINNÆVS c) defluxo demum flore eum legit, ut ex nudo caule & foliis pulchræ iconis satis video. *Ranunculus* III. MARTENS d) omnino idem est nostro. Non videtur necesse esse, ut nomen addam *Ranunculi alpini humilis rotundifolii*, quem CASPAR BAVHINVS majore flore & minori flore distinxit, non cautissime distributis in vanam diversitatem synonymis.

§. LXXIX.

Per dumeta, quæ *Chamerhodendros alpina villosa* jam sola faciebat, altiora loca amans, & quam glabra rarior, ascendimus, donec & ex sylvæ nos desererent. Ibi ad lapides, non uno loco, latissimo cespite plantula saxa tegebat, quam olim in *Gemmio Valesia*, deinde in *Gotthardo* legi, nunc uberrime ad scopulos viæ *die leiter* dictæ. Ei quidem, ex radiculis frequentibus folia in rosulas congesta eduntur, late virentia, firmula, angusta, intra lineam, tres lata & ultra, confertissima. Si evolvatur cespes, repentes cauliculi apparent aliquot unciarum, cum foliolis conjugatis. Ex foliorum alis passim floriger pedunculus, vix duarum linearum altitudine, fert florem pediculo non brevior, viridem, conniventem perpetuo. Is calyx quinque foliolis oblongis fit. Intra eum, nudo etiam oculo, sed ad lentem facilius, adparent sive unguis sive petala, crassiuscula, neque peralodea teneritatis, apice teniter emarginato. Quinque
stamina

c) *Flor. Botan.* 231. T. III. f. 4.

d) Exemplar foliolum, ut sepe solent. Resse addit diversitatem foliorum ad caulem aradicalibus hic nullam esse. c. IV. tab. H. f. 2.

flamina ex eorum corpusculorum intervallo eminent, pal-
lentibus apicibus, *Quinque* alia oriuntur singula ad radicem
sui *cordiformis* unguis s. petali, connatum mediæ ejus li-
near, & ubi hæc desinit, liberum & eminent, apiceque suo
onustum. *Ovarium* in medio flore pyriforme tres *Tubas*
repandas emittit. Intus ad axin medium *semina* aliquot ma-
juscula, quæ ad lentem validius objecta augmentem, viden-
tur fieri una convexa facie intercepta inter duas planas fa-
cies. Hanc plantam pro nova edidi ante aliquot annos a),
neque pœnitet. Nam etsi aliquantum cum nostra conven-
niant plantulæ aliquot scriptorum vetustiorum, ii tamen
non ita stirpem descripserunt, ut quisquam posteriorum eos
intellegerit. Nempe forte huc pertinet *Sedum saxatile* bu-
millimum foliolis densissime compactis stœculos fere sine pediculo
preferens diligentissimi *WYRSER* b), *Perpusillum sedum* omni-
um minimum *LOBELII* c), *Sedum montanum perpusillum* luteo-
lis floribus *PARKINSONI* d) ex *LOBELIO*, cum iconè, quæ a nostra
planta non aliena est. *Sedum montanum perpusillum* luteum,
quod *MORISON* e), ex *PARKINSONO*, excitat planta non vi-
sa. Et hi quidem eandem stirpem videntur in mente ha-
buisse. Sed & *Lycnis alpina* muscosis foliis densius stipatis
floribus parvis calyce duriore *PLUKNETI* f), iconem habet,
quæ possit plantæ nostræ convenire. Neminem vero de-
scriptionem dedisse, quæ sufficiat cognoscendæ plantæ, id
facile apparebit evolventi loca, quæ excitavi. Verum &
genus novum videtur requirere similitudo cum *Alfine* ma-
xima

a) *Comm. Lit.* 1736. *behd.* XII. & T. 1. f. 5.

b) *At. succr.* p. 537.

c) *Illustr. stirp.* p. 101.

d) *Théatr.* p. 738.

e) III. p. 471. & ic. cum nomine *PARK.* 8. XII. T. 6. f. 14.

f) *Almagest.* p. 233. T. XII. f. 8.

xima est, foliis, calyce, staminibus, Tubis: in eo differt, quod petala non caduca, non libera habear, sed connata staminibus, & duriora; adde, quod calyce multoties sint minora, ex quo factum est, ut diu me lauerint. Novo generi superest ut nomen in ponam. ST. HELINIAM quidem vocabo, quam BARTSCHIAM dicit amicissimus LINNEUS, cum vetustiori nihil videar jure gaudere, & scripserim de planta, ante multos annos mihi cognita. Hanc *Cardifitmonem* vocare possem, malo CHERLERIAM dicere, in memoriam Botanici eximii, cui plurimas & pulchras plantas debemus, quæ apud JOHANNEM BAVHINUM exstant.

§. LXXX.

Dum lente adscendo, *Lyebuis alpina linifolia multiflora peranpla radice aliquoties adparuit*, & *Linaria quadrifolia supina*, elegantissima plantularum, & uberrime proveniens *Pedicularis caule simplici foliis semipinnatis obtusis laciniis imbricatis* LINNÆI, rara planta, & hoc ipso loco primum a me lecta anno 1731. Nihil admodum inveni, quod adderem descriptioni, quam alibi exhibui a). Cum ea *Salix pumila folio rotundo*, & alia *Salix*, de qua, cum dudum cognita plantula recentiores scriptores inventionem sibi adrogent, aliqua addere visum est. Repit per saxa alpium viridissimi plantula, neque erigitur unquam, licet ad duos pedes serpat, ramosa & frondosa. Folia congesta, elliptica, ovi forma, splendida, virentia, glabra, longitudine dupla & tripla ad latitudinem, terminata obtuso ambitu. Sexu distincta est. Et *Mari* supra caulem, ex congestis foliis educit

g) Coroll. gener. 967. & Hort. Cliffort. eodem fere tempore, quo ego diss. de Pedicularibus edidi. Malim CL. BARTSCHIO Americanam stirpem, ST. HELINO alpinam dari.

g) De pedicularib. Helvet. VIII.

citur spica nondum uncialis florigera, quæ fit foliolis circa scapum adgestis pallidis, in quorum sinu duo stamina latent coccineis apicibus. *Femina* plantæ spica rare paucis fiunt capsulis virentibus, erectis, longis, conicis, ex quarum apice Tubæ binæ erumpunt pallentes. Primus hanc plantam cognovisse videtur ARETIVS a) cui est *Balmenstritten* frutex absque flore. Ex eo SIMLERVS b). CAMERARIUS eximiam iconem habet cum nomine *Salix pusilla humilis* c), quam existimo ex GESNERIANIS esse. *Salix humilis repens* LOBELII d), *Salix pusilla utrinque glabra* JOH. BAVHINI e), ex quo PLVKNET f), TOVRNEFORTIVS g) & TILLIVS h). *Salix alpina angustifolia repens* CASPARI BAVHINI i), an & eorum, qui idem nomen habent? RAIT k), TOVRNEFORTII l)? *Salix latifolia folio utrinque glabro superne splendente* RAIT m), an & SCHEVCH-

ZERI

- a) Apud GESNER, in CORD. p. 234. b.
- b) Valles. *U alp. descript.* p. 330.
- c) *Epit. Matb.* p. 108.
- d) *Advers.* p. 423. non recedit. *Icon.* II. p. 138.
- e) l. p. 2. p. 217. ex LOBELIO, absque alio synonymo. CHARRIUS addit glossema *cortice rubente* p. 66.
- f) *Almagest.* p. 327.
- g) l. R. H.
- h) *Hort. Pisan.* p. 150.
- i) Idque certo, cum & *Salicis* facie non esse post ARETIVM habeat, & brevia folia, utrinque glabra, & locum natalem *Prodr.* p. 159. *Pin.* CAMERARIANAM vero alio avocatur, ad speciem CLVSII, quæ inferne sub cinerea est. LOBELIANAM male ad maritimam subincanam speciem revocat, quæ alpina, & utrinque glabra est.
- k) *Syll. plant. extra Brit.* p. 226. bisbor. p. 1423. incognitam sibi.
- l) l. R. H.
- m) *Syll. plant. extra Brit. nasc.* in summo Jura, & *Hist.* p. 1422. Coniungit huic *pusillam* l. CLVSII in *Paun.* p. 102. sed eifolia inferne sunt subcinerea.

ZERIN), *Salix pumila alpina latifolia glabra* o) ejusdem, huc pertinent. Post hos omnes BOCCONE bonam iconem dedit, dixitque p). *Salicem alpinam minimam repentem retuso serpylli folio lucido*, quod nomen & SCHEVCHZERS q) habet, & brevius in iconibus *Salicem alpinam serpylli folio lucido* r), uti TOVRNEFORTIUS f)

§. LXXXI.

Jamque eram enixus ad montis culmen, quam longe accessus datur hominibus. Ibi ad rupes *Saxifragia montana ericoides* abunde provenit, sive *cæruleo flore* fuerit, sive *purpureo*, semen enim solum & capsulae supererant. Nascitur ibi, sed & longe humilioribus locis Helvetiae, *Onobrychis* illa quae plebejo nomine *Esparsette* dicitur, passimque seritur alendo pecori idonea. Sed longe fuerunt gratiores quatuor conferti *Astragali*, qui pene unico loco graminco, inter durissimas rupes juncti provenerant. *Astragalorum* miseracissima est Helvetia. Præter *vulgarem ochroleucon* dulcibus foliis, qui hic etiam arduo in loco proveniebat, & alium, qui *Cicer sylvestre* dicitur, arvis calidioris *Helvetiae* familiarem, habet planior *Valefia* a) *purpureum spicatum Pannonicum* CLVSII, paucua *Rhetiae Astragaloides ochroleucon* TILLII b)

b) *It. alp.* l. p. 47. non videtur.

o) *Sylloge stirp. extra Brit.* p. 225. absque synonymo.

p) *Mus. di. Piant.* p. 18.

q) *It.* l. p. 43. & V. p. 427. conjungit *Salicem saxatilem minimam* C. B. in *Prodr.* sed ea, ob folia rotunda, & venosa, & quod minima sit, est *Salix alnifolia* BOCC.

r) T. I.

f) I. R. H.

a) Inter *Leucam* & *Sideram* ubertime legi in itinere 1733.

b), prata circa Grindelwald & Gemmius *M. Astragalum foliis viciæ ramosum & procumbentem flore glomerato oblongo albo cœruleoque* SCHEVCHZERI c), idemque *M. Gemmi & Scheidek, Surenen, & aliæ Alpes pyrenaicæ Barba Jovis folio non ramosum procumbentem flore ochroleuco glomerato* SCHEVCHZERI d), prata demum Rhatia inter Lenz & Brienzen *Astragalum illum siliqua longa incurva, qui Polygala nomine a CAMERARIO e), Onobrychidis quartæ a CLVSIO f) depictus est. Præter hos omnes, tres alii in rupibus vicini nascuntur. Eorum primus, qui paulo vulgarior est, in Gemmio abunde, imo vero si idem est RAJANO, etiam in Jura nascitur, similis utcunque ei, cui flores ex albo cœrulei sunt, ab eo tamen multis modis diversus. Radix enim plurimos caules fundere solet floriferos, plurimas foliosas alas, ex brachiis, qualia alteri *Astragalo* adpinnerunt CAMERARIUS & CLVSIVS. Folia multo propiora sibi & acutiora, & exiliora, quam cuicunque aliorum *Astragalorum*. Florum spica valde conferta: Calyx non ut in albo cœruleoque niger, sed viridis, firmis, levis, dentibus vix inæqualibus. Flos ex rubro purpureus, qualem & *Polygala* CAMERARIUS habet, Vexillum vix erectum amplum, Alæ amplæ & coloratæ, longissimis auriculis præditæ, non albæ, ut in illo SCHEVCHZE-*

O 2

RI,

- b) p. 19. T. 14. f. 2. quæ *Astragalus vesicarius hirsutus* JOHANNIS BAYHINI & SCHEVCHZERI. It. alp. IV. p. 330. Eandem existimo esse *Polygala similem luteo flore* GESNERI add. ad hort. Germ. p. 260. b.
- c) It. VII. p. 519. hoc loco, & in Itin. IV. p. 330. alio nomine.
- d) It. IV. p. 330. Eundem in l. itinere. vocat *alpinum foliis viciæ angustioribus flore ochroleuco*. p. 31. nisi is *Astragaloides* est, & in Itin. VII. *alpinum ramosum hirsutum flore ochroleuco* p. 509. de quo ex loco natali mihi constat.
- e) In MATTH. Epit. p. 929. bon. lc.
- f) Pann. 755. *bijor.* p. cexl.

RI. *Carina cœrulea breviorrostrata, staminade more. Siliqua* non longa ut in *Polygala CAMERARII*, sed brevis, tumida, media crena divisa bilocularis. Vno verbo, a *Polygala CAMERARII* foliis acutis, quæ *Polygala* omnino ovata habet, & siliqua brevi, ab eo vero cui *albi* & *cœrulei* flores sunt, & purpureis floribus, & foliis acutis, & calyce, atque siliqua non nigris differt. Omnino tamen huc videtur pertinere *Astragalus quidam montanus sive onobrychis aliis RAII g)*, in Jura lectus, neque enim *Astragalum JOHANNIS BAVHINI*, cui idem nomen est, huerefero, cum is ex *CLVSII Onobrychide quarta* sit, quam ob longiores siliquas conjungo *Polygalæ CAMERARII*, etsi foliis acutis huic nostro sit propior. Est denique *Astragalus incanus saxatilis hirsutus minor, acuminato folio, flore purpurascens TITÆ h)*, *Onobrychis foliis viciæ majoribus cœrulopurpurascens vel foliis Tragacanthæ*, non *CASPARI BAVHINI*, qui *CLVSIANVM* vult, verum *SCHVCHZERI i)* forte.

§. LXXXII.

Alius, pulchra, & speciosa planta, caule erecto, plures conjugationes foliorum recipiente, foliis viciæ, ex ellipticis paulum ad verticem angustioribus, nervosis, glabris, spica *Astragalorum* omnium amplissima, laxa, in qua flores penduli. Ii flores calycem habent ex albo & purpureo varium, hirsutum, cujus dentes omnes capillares hirsuti, imi vero dentes longiores sunt. Flos ipse uncia longitudine, purpureus, *Hedysari* more splendens. Vexillum reliquis petalis amplius, sæpe reflexum, cordis figura, nervo, & lata ovali plaga ad ortum notatum. Alæ extremo ovato, separatæ non auricæ,

g) *Syll. plant. extra Brit. p. 72. hist. p. 937.*

h) *In lit. post. hort. Mauroc.*

i) Nam synonymum conjungit *EXT.* quod alibi refert ad eum qui flos albo & cœruleo est *lit. l. p. 45.*

aurita, macula ad ortum alba, extremo purpureo. *Carina* vexillo longior, purpureo obrufo rostro desinit. *Vagina* & *stamina* decem ex gentis indole. *Siliqua* pene *Orobi*, emittit *Tubam* cylindricam. Nascitur in horridis præcipitiis *M. Stockborn*, in *Gemmio* vero supra *Spitalmatt* ubique. Vix reperio synonyma: *Astragalus* enim *Helveticus* CYSH a) ita breviter dicitur, ut nemo in turba *Helveticorum* eum distinguat. *SCHVCHZERUS* b) vero omnino descripsit nostrum *Alpini Helvetici* nomine. Ego *alpinum erectum spica purpurea speciosa* dixi alibi c). An *Astragalus alpinus perennis flore purpureo magno* TITÆ d).

§. LXXXIII.

Sed nunquam neque *SCHVCHZERUS* viderat, neque ipse vidi speciosum *Astragalum*, qui coronidem itineri meo imposuit, summo in cacumine *Neunen* lectus, neque alibi. Ei lignosa *radix* caules aliquot fundit foliosos & florigeros. Foliosi, habent decem pene paria foliorum, extremo inpare, ellipsi in acutissimum mucronem terminata, utrinque splendida, argentea lanugine obducta. Florigeri caules aphylli, firmi, gerunt spicam *florum* non multorum. *Calyx* villosissimus, longis albisque pilis, de more superius apertus, dentibus quatuor pene æqualibus, longiori quinto, villosis omnibus. *Flos* longus replicato *vexillo* stricto & prælongo instar *Trifolii*, longe ultra reliqua petala educto, oris replicatis. *Ala* carina longiores, *Carina* brevior lata, inmu-

O 3

cro-

a) *Hispan.* p. 468. *Hisf.* cccxxxiii.

b) *It.* IV. p. 330.

c) *Comm. Phys. technic. med.* 1736. p. 101. T. I. f. 2. cum iconem non bona.

d) In *Itinere post. bore. Mauræ*.

tionem singularem terminata: Hæc omnia violacea fere, absque splendore, Nomenclacio *Astragalus alpinus* totius *jericeus foliis acuminatis*. In recensissimo opere AMMANI *Astragalum* reperi, cujus descriptio meum omnino imitatur. Nomen fecit, *Astragalus non ramosus, villosus & intanatus, spicatus, floribus purpureo-violaceis* a).

§. LXXXIV.

Hic itineris terminus fuit, quod præcipitare coegiturgens iter in Germaniam. Inde per aliam viam Bernam repetii & supra pagum Thurnen frequentem legi *Alceam foliorotundo, & laciniato*, quæ a *tenuifolia crispa* JOHANNIS BAVHINI b), & a vulgari miuori FRATRIS minime differt. Ei enim Berne vulgarissimæ, prima quæ prodeunt, folia rotunda sunt. Ibi *Scabiosa Dipsaci folio* VAILLANTII, quam a *Scabiosa latifolia rubro flore* non distinguo. Hanc enim in Helvetia RAJVS b*), illam uterque BAVHINVS c) legit. Ego vero & circa Basileam & circa Jura radices in Helvetia Auenticensi eandem omnino plantam vidi. Trans paludosum prætum, quod Gurbe fluuiolus medius perfluit, dum festini ambulamus, in fossis *Sparganium non ramosum, Lentibulariam, & Potamogetonem* invenimus, folio gramineo ramosum CASPARI BAVHINI d) foliis vix tertiam partem lineæ
latis

a) *Plant. Rurbenic.* n. 167. p. 126.

a) *Malva montana* f. *Alcea rotundifolia laciniata* COLUMNÆ p. 148. cum
icone opt.

b) *ll.* p. 1067.

b*) *Syllog. stirp. extra Brit.* p. 228. biflor. p. 378.

c) *Scab. maxima dumetorum folio non laciniato* l. B. III. t. p. 10. & *Scabiosa montana non laciniata rubra* c. BAVHINI cat. plant. circa
Basf. p. 80.

d) *Prodrem.* p. 101.

latis, spicis pene *Adonidis* in brevi pediculo, crassis filiculis curvulis. Idem esse existimo cum *Potamogetone pusillo* folio gramineo caule rotundo MERRETI c) & RAII f).

§. LXXXV.

Berna profectus, dum Juræ humillimum dorsum supero, ab incisus rupibus dictum *Hauenstein*, non absque aliquo fructu speravi fore, si plantulas quærerem. Ergo primo ad arcem *Falckenstein* solidissimis rupibus superstructam, adscendi festinus. Ibi *Daucum* illum *Tragoselinum crispum* folio (XLII.) in rupibus inaccessis vidi & folia legi, *Iridem* etiam *Germanicam*, *Acer crispum* laciniis in acutis mucrones exeuntibus, *Mespilum* folio rotundiori fructu nigro subdulci maturo, foliisque decussis omni tomento levissimis, quæ candida lana obducta Majo M. legeram, *Caryophyllum saxatilem* g), quem eodem in loco primum invenerat CASPAR BAVHINUS, foliis cruciatis, deorsum replicatis, latis, in rigidum acumen exeuntibus, rubella lanugine in ortu petalorum; quibus notis facile didici eundem esse *Caryophyllum* II. CLVSII h), & *Caryophyllum sylvestrem* flore magno inodoro hirsuto CASPARI BAVHINI i). Tandem & *Cotoneaster* GESNERI k) ibi nascitur, quem facile demonstrarem, eundem esse cum ejusdem

c) *Pin. ver. Britan.* p. 97.

f) *Cat. plant. Cantabr.* p. 125. *Catal. plant. Angl.* p. 242. *hiflor.* p. 190. *Syn.* III. p. 150. Ejus icon exstat apud VAILLANTIVM T. XXXII. f. 4.

g) Ita vocabatur, cum distinctionis nomine *larisfolius* & *angustifolius* in herbario vido CASPARI BAVHINI.

h) *Pannon.* p. 317. *hiflor.* p. 282.

i) Ad plantam CLVSI.

k) *Epist.* p. 94.

dem *Chamaespilo* l), nisi idem jam docuisset JOHANNES BAVHINVS m).

§. LXXXVI

Ad viam solet *Acetosa rotundifolia bortenſis* reperiri, & *Chamaebuxus flore colutea*, ſed utraque planta praecox eſt, & evanuerat. *Digitalis* utraque, lutea magno flore intus maculoſo, folio hirsuto, & parvo flore foliis glabris, uberrime ad ſepes. In omnibus etiam ſepibus circa *Langenbrug* bicubitale *Aconitum Lycoctonum luteum*. In deſcenſu vero ad *Wallenburg Stachys alpina* valde ſerotina, nam paucos adhuc flores explicaverat die 25. Julii. Ejus *Calyx* pentagonus eſt, Galea integra obſolere purpurea *Barba* concolor trifida, medio ſegmento longiore, recta protenſa; fauces albae, ſtamina obſolere purpurea. Odor non ingratus *Meliſſophylli*. Ex multis nominibus meminiffe placet, me neque *Alpenkraut LONICERI* a) huc referre, neque *Salviam alpinam TABERNEMONTANI* b), ut viſum eſt CASPARO BAVHINO. Forte *Betonica longe major CAESALPINI* c) huc facit. Sed certius *Urtica ſaxatilis Heraclea* TRAGI ſimilis vel *ſtachyſis* JOH. BAVHINI d). Porro *Stachys folio obſcure virente flore ferrugineo MORISONI* e), RAI f), BOERHAAVII g) & VAILLAN

III

- 1) Ad bot. p. 254. b.
m) licet diſtinguat utrumque *Epif.* p. 91. 6.
a) p. cxxviii. ei enim *Sos cœruleus* eſt in longis ſpicis. Eſt forte mala icon *Hormini pratensis*.
b) p. 372. quam referrem potius ad *Colum Jovis*, niſi florem diceret purpureum. Vide folia & Galeam ſloris.
c) L. XI. c. XLIV.
d) *Funt. Boll. deſcr.* p. 187.
e) *Hort. Bleſ.* p. 198. *biſt. oxen.* III. p. 382. T. X. f. 11.
f) *Hiſt. plant.* III. p. 301.
g) *Ind. alt.* p. 154.

vis h), utique huc referenda, & quæ inde dependent PLUKNETII i) plantæ, & WALTHERI k).

§. LXXXVII.

In sepibus, quæ descendantibus ad lavam sunt, non raro provenit elegans *Aster Pannonicus* CLVSII a), conspicua altitudine ad tres pene pedes, nutans. *Folia* ima petiolata, latiuscula, longo mucrone, ora raris denticulis serrata, eaque & nervis leniter pilosis. Superiora graciliora sunt. In summo Caule pauci, sed conspicua magnitudine *flores*. *Calyx* firmus sit multiplice ordine latarum squamarum hirsuturum. *Radix* lutei, trinervi, nervis exeuntibus in totidem denticulos, *tubus* brevis, & *Tuba* eminens aureo apice. *Floresculorum* ova minora. *Tubus floris* longior in quinque triangularia segmenta fissus. *Tuba* longa fusca, perforans *stamineam cylindrum*. Discernuntur semina erectis, gracilibus *squamis*. Sine dubio hunc *Asterem* CLVSIVS descripsit, neque enim papposum dixit semen esse, ut videtur legisse RAVENSB), sed manere in quodam villo capituli. Præter ejus synonyma magis recepta, refero huc *Conyzam majorem alteram*

h) *Botan. Partr.* p. 189. nobiscum sentit.

i) *Stachys latifolia major foliis obscure virentibus flore galeato ferrugineo* *Almag.* p. 358. T. 317. f. 4. non optime, consensiente RARO III. p. 302.

k) *Stachys folio obscure virenti flore purpurascente* *Ind. hort. suis* p. 108. T. XIX.

a) *Pannon.* p. 526. *Aster* III. *Austriacus* t. Hist. p. XIII. cum omnibus synonymis, *Aster* nempe *luteo majori folio Succise* C. B. &c.

b) Qui inter papposos *Asterem* habet CLVSIANVM, p. 267. Idem sentit MAGNOLIVS *Hort. Reg. Monsp.* p. 25.

ram THALII c), cujus icon plantam nostram egregie exprimit, semineque nudum habet. Superflua ergo est *Conyza montana lutea foliis oblongis* CASPARI BAVHINI, *Aster montanus luteus foliis oblongis* TOVNEFORTII d). Porro huc revoco lectum haud procul *Aqua Helvetiorum Asterem montanum luteum flore pallido foliis non ita rigidis leviter unicum caule hirsutis* HERSERI e). Nam in M. Boezberg, quem Basilea adveniens necessario superavit HERSERVS, nostrum Asterem legit D. HUBERVS. In recentioribus, facile distinguitur, Est nempe *Chrysanthemum Asteris facie foliis Succisa* HERMANNI f), qui verum characterem plantae CIVISIANAE primus detexit, MORISONVS enim eam habet inter papposas g), VAILLANTIVS *Asteriscum perennem villosum serratum calyce imo non folioso* h) facit. BOERHAAVIUS ex HERMANNO *Asteriscum calyce brevis angustifolium* i), LINNAEVS demum *Bupthalmum foliis lineari lanceolatis serratis, villosis, calycibus nudis*.

§. LXXXVIII.

c) p. 21. ic. II.

d) Cum uterque sit ad THALIANAM plantam solam, TILLIUS egregie plantam reperit, quae nunquam distincta exsistit, p. 19. ut manifesto deprehendatur, siue error siue fraus fuerit.

e) *Art. Succis.* p. 531.

f) *Flor. Batav.* p. 34. *Hort. Lugd. Bat.* p. 144.

g) *Aster luteus Pannonicus primus hist. Oxon.* III. p. 117.

h) 1720. p. 430. Folia non villosa sed subhirsuta sunt.

i) *Ind. alt. Hort. Lugd. Bat.* p. 105. & pene mavult distinguere, nomine *Asteriscoidis*, quod calycis imi foliola aberrantia non habeat.

k) *Hort. Cliffort.* p. 114.

§. LXXXVIII.

Jamque superatis, quæ erant asperissima, lenis declivitas nos comitata est *Basileam*, urbem, quam absque gratæ mentis recordatione nefas mihi est nominare. Ibi enim audiavi JOHANNEM BERNOVELLIUM; Ibi in amicitiam DROL-
LINGERI, STÄHELINI & KOENIGII veni, quæ mihi semper erit dulcis, dulcissima fuit olim, quando juvenis is viris in-
mixtus mihi vel ex eo placui, quod consorcio eorum non penitus ipsis indignus viderer. Ibi primas herbulas legi, & etiam tum, cum *Botanices* rudimenta discerem, ad *historiam stirpium patriarum*, ex longissimo certe intervallo speratam, audaci consilio me paravi.

§. XIC.

Conservat ibi familia BAVARIANA, & EMANUEL BAV-
HINVS, qui avorum æmulatione ad medicos honores nuper adspiravit, preciosum rei herbariæ cimelium, hortum siccum CASPARI BAVHINI, in quo, non ex solæ plantæ, quas *Pinax* habet, eodem ordine collectæ exstant, sed alia præterea non pauca, neque satis cognita, tum numerosæ icones, quæ lucem publicam nondum viderunt. Adiunt etiam docto-
rum virorum ad CASPARVM datæ literæ, ex quibus pluri-
mæ de re herbariæ lites confici possent: adiunt denique schedæ, ex quibus Theatro Botanico non unum volumen addi posset.

§. XC.

Sed præter eum hortum siccum, Bibliotheca publica possidet herbas HAGENBACHII, qui ex itinere in al-
pes Bernenses multas & elegantes plantas in CASPARI opera contulit, ut ex graminibus in Theatri I. volumine æstimare
P. 2 licet

licet. Pulcherrimus est etiam hortus ficcus BENEDICTI STÆHELINI, a Patre botanico, & a filio felicissimo, atque industrio, stirpium inventore collectus. Eum plurimæ ab amico utriusque VAILLANTIO adceptæ stirpes decorant, pretiosiorum tamen reddunt multa, & raræ plantæ, a BAYHINO prætervisæ, aut minus curiose cognitæ, quas in patria regione multorum annorum junctis laboribus detexit BENEDICTVS JOH. HENRICI F. STÆHELINVS.

§. XCI.

Sed eripuit me desiderabilioræ urgens necessitas. Per beata rura *Alfatie* rapido itinere properans, vix mihi permisi, ut plantulam aliquam decerperem. Plurimus ibi ad viam nascitur *Dipsacus foliis laciniatis*, quem eximius LINNÆVS a) cum vulgari conjungit. In iis tamen speciminibus, quæ per bidui iter cum vulgari copiosissime vidi provenire, visus sum mihi, non unam diversitatem reperire, etiam si ad folia non respicias. *Capitulum* longum, *flos* albus est, nunquam, ut in altero purpureus, statura altior, *squamarum* demum spinæ non rectæ, sed repandæ, & extrorsum conversæ. Poterit itaque, ut videtur, locum suum tueri. In *Alfatia* plurimum, *Wormatia*, unde ad latum esse testatur CASPAR BAYHINVS b), nullum omnino vidi.

§. XCII.

Circa *Drusenbeim*, viculum in quo nihil est quod *Drusorum* nomine dignum sit, frequens est *Blattaria*. Ibi etiam *Raphanistrum flore melino* legi, elegantem varietatem, uti aliam *flore cæruleo* ostendit *Basilea* vir felicitis industrie STÆHELII.

a) Hort. Cliffort. p. 29.

b) In herb. vivo.

HELINVS. Sed utrumque non a) videtur differre a vulgari illo albo arborum, quod utique *Helvetia* multo familiarius est, quam nostræ *Germaniæ*. *Gernsheimi* in stagno cum *Hydrocotyle*, & *Salvinia* MICHELII, magnus est proventus *Tribuloidis*, cuius *stamina*, ut desiderato LINNÆI b) satisfaciam, sunt quatuor; *Tuba* vero ex rostrato ovario, una, recurvo apice, & virente.

§. XCIII.

Circa *Lauterburg*, in arenosa sylva, quæ *Spiram* ducit, ceperat comitem se addere euntibus *Stachas citrina*, ea ubique ad *Oppenheim* usque frequens est. *Spira Alysson* illud floribus profunde incis, quod *Tblaspi* incanum *Mecbliniense* dicitur LOBELIO a), & *Chondrilla viminea*, & *Eruca tenuifolia perennis*, quæ *Manheimii*, *Wormatiæ*, *Oppenheimi*, frequentissima est, *Genevæ* in ipsis muris urbis familiaris. Circa *Guntersblum* in fossis *Althea* officinarum frequens est, ad aggeres vero viarum *Oreoselinum minus*, & *Onobrychis echinato capite*, quæ nobis montanæ plantæ sunt: deinde proprius *Oppenheim Ammi* perenne sive *Falcaria* RAVINI, *Millefolium nobile*, & in ipsis ruderibus arcis uberrima copia *Daucus Alsaticus* CASPARI BAVHINI. De eo, cum non in vulgum notus sit, neque absque errore descriptus a quibusdam Botaniciis, aliqua, priusquam finem faciam, vitulum est addere.

P 3

Ei

a) Neque RATIO conf. *Syn.* III. p. 296. habet enim non habitum solum, sed & venas florum simillimas. Erit ergo exemplum, neque enim plurima sunt, floris absque cultu albo colore & saepe ludentis.

b) *Char. gen.* 899.

a) *Obs.* p. 108. in arenosis ubique, *Hannoveræ* similibus locis nascitur.

§. XCIV.

Ei *radix* unica est, non nimis aeris, dura defixa. *Caulis* ad humanam altitudinem, profunde sulcatus, ut etiam angulosus videatur, plerumque purpureus, admodum ramulosus, latis vaginis ad ramorum ortum, ut junior peculiarem habitum *Hippomarathri* RIVINI non male exprimat. *Folia* ad terram amplissima, & frequenter cubitalia, magnis & sulcatis costis. Numeravi ramosarum alarum *primarum* sex paria. In quavis earum, quæ inter primas sunt maximæ, *secundarum* ramosarum tria, quarum. In maxima *secundarum* petiolarum *tertiarum* unum par, sessile unum, In *tertiis* trilobatus habitus. *Lobus primus medius* denuo trilobatus, lobis *secundis* lateralibus bifidis, *medio* trifido. *Lobi primi laterales* inæqualiter quadrifidi, quinquefidi. *Lobi ultimi*, modo dicti, lati, ad sesquilineam, incisionibus ultimis profundis, rectis, laciniis spinula terminatis. Omnia firma, glabra, ex flavo viridia, aromatica. *Umbellarum* petioli longi, ipsæque raræ, neque pro portione plantæ, ex peculiaribus umbellulis pene duodecim. *Calyx* *universalis* aliquot foliolis non latis, per ætatem non reflexis, vagisve. *Calyx* peculiaris latiusculis aliquot foliolis. *Semina* immatura striata, videntur alarum rudimenta quadam habere. *Tubæ* due ex tumida *placentula* bifida, brevès. *Petalæ* quinque æqualia, integræ, cum virescunt luteolæ. Et ea quidem facies erat. In corbæ *Daucis* latere existimavi hanc plantam, neque tamen eruere potui. Ergo a *Dauco Asiatico* CASPARI BAVHNI a) initium feci, cujus icon non incommoda est. Nomen apud PARKINSONUMB),

RAIVM

a) *Prodrom.* p. 77. *Pin.* ex pratis palustribus. Noster sicco loco, in ruinis arcis antiquæ.

b) *Icones.* p. 900.

RAYVM c), MORISONVM d) exstat, & in *Schola Parisina*. Deinde JOHANNES & ipse pro nova dedit *Umbelliferam alaticam magnam* e), *umbella parva sublutea*, quod nomen RAYVS f) habet alibi. MORISONVS seminis aliqua similitudine delusus, *Thyfelino* non genere, sed ipsa specie conjunxit g). Inde factum est, ut RVPPIVS *Pastinacam* diceret, *palustrem altissimam folio Seseleos pratensis* h). LINNAEVS *Oreoselinum Thyfelinis* & nostrum utrisque conjunxit i), sed a *Thyfelino* quidem manifesto differt, floris petalis neque cordatis k), neque inaequalibus, *calyce* universali l) non reflexo, & quantum video in semine immaturo, semina & si alata sint, non plana sunt. Recte & ex suis notis, & ex ratione calycis videtur conjunxisse TOURNEFORTIVS *Oreoselinis* m). Eum BOERHAAVIUS n) & LINDERN o) secuti sunt,

§. XCV.

c) *Syll. plant. rar.* p. 114.

d) *Hist. Oxon.* III. p. 317.

e) III. p. 106. cum iconē & descriptione non malis. Inde CHARRIERS p. 393.

f) In *hiflor. plant.* p. 414. Ipse plantam vidit, in *Palatinatu*.

g) *Umbellif.* p. 84. cum neq; laesceat, neque multas radices habeat &c.

h) *Flor. Zeyns.* p. 221.

i) *Selinum* foliis pinnatis laciniatis, laciniulis trifidis obtusis bors, *Cliffort.* p. 92. conf. *char. gen.* 210. EX LINNAEO nomen conservavit ROYEN p. 106.

k) Apex replicatus est ex lata bracteola, sed vera incisio nulla. Dum vero observavit DILLENIUS, flores plantarum *Umbelliferarum* luteos regulares esse. *cat. plant. circa Gieff.* p. 7.

l) Qui in *Thyfelino* *Pituit* nostrate nullus est.

m) *Oreoselinum pratense cicuta facit.* I. R. H.

n) *Ind. alt.* p. 68.

o) *Tournef. Alsat.* p. 127.

§. XCV.

Jamque *Francofurti* eram, ubi comite D. SENKENBERGIO a) nuper *Archiatro Homburgensi*, floram ejus urbis a CLVSIO laudatam, & ipse invifurus, morbo impeditus fui, neque quidquam reftituto superfuit, quam ut GOTTINGAM redirem.

- a) Qui & *Francofurti*, & in *M. Hundsrück*. & in montibus fylvæ *Wefterwald*, & circa *Moguntiam*, paffim multas elegantes plantas legit, quarum aliquas ejus munere poffideo, ut *Carduum mollem laciniatum* L. CLVSII, *Pentaphylloides erectum* &c.



Tafel.

27. Tafel. Tafel. Tafel.



Cortesia.

Chrysanthemum boreale
fructu parvis integris
partim trifido.



Brion capillare
per caulem capillare

C. P. M. Bore. M. C. C.





§. I.

Pauculos elapsae aestatis dies inpendimus itineri per Hercyniam sylvam, quo suprema eius iugiter omnino superauimus, vidimus fodinas argentiferas Clausthalienses, antiquissimas Vitrioli, sulphuris, Cupri, Plumbique Venas Montis Rammeli, Montem tandem Bruçterum qui in hac boreali Germania altissimus habetur; atque pluſculas stirpes collegimus vel lectas olim a THALIO, sed postliminio demum in notitiam Botanicorum reuocandas, vel alioquin non vbique obvias, neque explicatas satis. Operae ergo precium duximus vt obscuriores stirpes, adeo incognitas hodie vt pene nouae sint, describeremus, enarraremus dubia synonyma aliarum, vulgatiores demum alias, sed montanas tamen, ipsis saltem nominibus indicaremus.

§. II.

In luco WEENDAE proximo, ad primum a *Goettinga* lapidem PETASITES nascitur non visus in *Helvetia*

vetia, & cuius nomen difficile fuerit eruere. Nascitur ad purissimam scaturiginem, quae roras agit molendini comminuendis in Chartam scriptoriam pannis destinati. A vulgari heluetico, qui *maior vulgaris* passim audit, non foliis adeo differt, sed spica floris longiore, laxiore, pedali, rara, pedicellis longis & saepe pendulis: *Calyce* non longo adeo, neque acutis, neque reflexis, sed subrotundis squamis facto, vnico concinno ordine flosculos presse circumstantibus: *Flore* in quacunque aetate albo & quasi sene, quod vix nisi pappus seminum vltra calycem emineat, multo exiliore quam in nostro *maiori*; *Flosculus* demum androgynis paucissimis, vno vel altero, subrubellis, qui multis femininis flosculis cinguntur, quorum semen & pappus eadem sunt, sed campanulae loco bifidus *Tubus* est, emittens absque omni stamine *Tubam*. Promptum est, & Character id suadere videtur, referre nostram stirpem ad primam speciem *Petasitidis maioris vulgaris*, quam RVPIVS a) dixit duorum generum flosculos habere. Eam BVXBVM b) repetit nomine *Petasitis in medio maioribus flosculis*, reliquis minoribus. In *synopsi stirp. Britannicar.* Ed III. c) vocatur *Petasites maior floribus longis pediculis insidentibus*; eodemque nomine pulcherrime depingitur in *Hort. Eltham.* d) Verum ab ea facile nostra distinguitur flore lato non ventricoso, & calyce, cuius in DILLENIANA icone squamae videntur multorum ordinum pingi, a nostra fabrica diuersissimae.

Missus

a) *flor. Jenens.* p. 153.

b) *Enum. plant. circa Halam nasc.* p. 258.

c) p. 179.

d) p. 309. ic. CCXXX.

Missus est hic ipse Weendensis Petasites pro *Petasiti-
de minori* C. B. P. Verum licet iste manifesto flosculos
duorum generum habeat, vti ex primi inuentoris CA-
MERARII e) icone adparet, & haud dissimilem a no-
stra aut RVPIANA stirpem a Germanis THALIO, f)
SCHWENKFELDIO g) LOESELIO h) HOFMAN-
NO i), VOLKAMERO k) DILLENIO l), a BESLERO
m) demum descriptam esse, vel ipsa locorum similitu-
do suadeat, certum tamen est n) *Petasitidem minorem* C. B.
Cacaliae tomentosae ad finem esse, & hinc molli lanugi-
ne obductum folium habere, inde satyre virens & gla-
brum paucis gossypio pubescens. Sed & I. B. aliam stir-

A 3

pem

- e) *Petasites flore albo* Epit. Matth. p. 593. Idem vocat *Petasitem nostrum* *Leucanthemon hort.* p. 122. qui licet odoratus ibi dicatur, descriptus equidem videtur a LVGDVNENSIBVS nomine *Petasitis odorati*, non vero depictus p. 1054, florum enim icon & situs omnino ad vulgarem pertinet.
- f) *Petasites flore candido* *bercyn.* p. 91. Andersbergae.
- g) *Petasites alpina*, *stirp. Silles.* p. 255. quem dicit flore esse sublateo.
- h) *Petasites minor* *Flor. Pruss.* p. 192.
- i) *Tussilago maior altera* sive *Petasites minor.* *Delic. sylv. Flor. Altd.*
- k) *Flor. Norimb.* p. 325. *Petasitem minorem* vocat.
- l) *Catal. plant. circa Gieff. nasc.* p. 37.
- m) in *hort. Hysletiens.* *Hybern.* Tab. V. f. II. vbi equidem icones commutatas esse & haec quidem vulgarem, quae vero vulgarem dicitur indicare illum *flore albo* exprimere videtur, si figuras florum propius spectes.
- n) *ex herb. viv.* Quare & SCHEVCHZERSVS noster *Itin. V.* p. 425. cum *Cacalia tomentosa* eum coniunxit,

pem videtur intellexisse o), qui sexus diuersitatem descriptione sua excludit. Diligentissimus tandem RA-IVS p) Genuae suam plantam descripsit, vt vix Germanici foli videatur. Quare nostram, neque pro CAMERARIANA q) neque pro RVPIANA stirpe tradere ausi, proponimus eruditorum disquisitioni: neque sustinemus pronunciare cuinam ex tribus propositis plantis conueniant synonyma AMBROSINI r), MORISONI s), HERMANNI t), SVTHERLANDI u), MAGNOLII x) TOVRNEFORTII y), PLVKNÉ-TII z), RALL aa) PONTEDERAE bb), LEMERYI cc), TILLI

- o) v. *Petasites albus anguloso folio*, *hist. plant.* III. p. 567. qui *Petasites folio anguloso; radice geniculata caule striato* dicitur CHABRAEO *Sciograph.* p. 513.
- p) *Syll. g. Plant. extra Brit.* p. 201. vti & I. B. pro exotica descripsit.
- q) Quam, Germanica cum sit, & Noribergae ab eius excessu perpetuo visa, proximam nostrae vel eandem esse auguramur.
- r) *Petasites minor* *Phytolog.* p. I. p. 419.
- s) *Petasites flore albo*, *Hort. Blef.* p. 156. *Petasites maior albus anguloso folio* *H. ox.* III. p. 95.
- t) *Petasites albus anguloso folio*, *H. L. B.* 438.
- v) *Flor. Bat. Petasites minor*.
- u) *Hort. Edimb. Petasites minor* p. 267.
- x) *H. R. M.* p. 157. eodem nomine.
- y) eod. *Schol. Bot.* p. 10. & I. R. H. eodem.
- z) *Almagest.* p. 288. nomine I. B.
- aa) eodem *Hist. plant.* I. p. 261. ex I. B.
- bb) eodem *Diff.* p. 159. vbi de stoculis femininis nulla fit mentio.
- cc) *Diction. de drog. simpl.* p. 416. *Petasites minor*.

TILLI dd), VAILLANTI ee), BOERHAAVII ff), MILLERI gg), WALTHERI hh) De vulgari maiori addere visum est, icones FVCHSII ii), TRAGI kk), MATTHIOLI ll), TABERNAEMONTANI mm), spicam nimis arctam & breuem facere, optimam vero esse, quam DODONAEVS nn), LOBELIVS oo), & CLVSIVS pp) proposuerunt.

§. III.

In omnibus circa Goettingam nemoribus, vmbrosis locis & in dumetis, prouenit Pyrolae species, cui Tuba recta est, minor quam altera cui stamina & Tuba declinata sunt, folio frequentius serrato, spica breviori, & densiori. Paulorarior obseruante RALO a) est haec altera, atque montana here-

dd) *hort. pisan.* 173. eodem nomine.

ee) *Memoir. de l'Acad.* 1719. p. 403. eodem.

ff) eod. *Ind. alt. hort. Lugd. Bat.* p. 118.

gg) *Gardener's Dictionary* nomine I. B.

hh) *designat. plant. hort. sui* p. 96. *Petasites maior fere alba.*

ii) p. 644.

kk) eadem p. 414.

ll) p. 849.

mm) p. 749.

nn) *Pempt. ed.* 1616. p. 597.

oo) *Icon.* p. 591.

pp) *Hist. plant.* p. CXVI.

a) *Catal. stirp. in ext. region* 1673. p. 59. & in altera Editione 1694. sine *Catal. stirp. Exterar.* p. 211. coniecturam addidit de diuersitate sexus, quam nemo lecutus est.

hercyniae sylvae nemora Iurassique coryleta amat, speciosâ altitudine, spica laxa longiori, Tuba probofscidis instar ex pendulo flore incurva, foliis vix serratis amplioribus. Difficile est synonyma inter utramque partiri, cum ante RALVM diuersitas earum neglecta fuerit. Manifestum tamen est, maiorem cui stamina & Tuba deflexa sunt, proponi a CAMERARIO. b) IOH. BAVHINO c), & post hos a RALVO d) RIVINO e), RVPPIO f) TOVRNEFORTIO g), LEMERYO h), DILLENIO i), ERNDELTIO k) LINNAEO l). Non ita certum est eandem proponi a LOBELIO m), aut utramque

- b) *Pyrola*. EPIT. *Matth.* p. 723. spica laxa, Tuba incurua, folia lusto longiora.
- c) *descript. Pyrolae*, ubi florem difformem & Tubam recurvam habet *biflor.* *Plant.* p. 535. Icon. ex DODONAEIO est obscurius diuersitatem exprimens.
- d) *HIST. plant.* II. p. 1233. & *synop.* III. p. 363. ubi maiorem Tuba recta distinguit, a maiori de qua agimus.
- e) qui diuersis iconibus, & nominibus *Pyrolae*, *Pyrolae folio rotundo* & *Pyrolae folio obtuso* maiorem nostram expressit *Pentapet. Irreg.*
- f) cui est *Pyrola maior* & *elatio* foliis oblongis pistillo florum incuruo, *flor. Ienens.* p. 236.
- g) *Mat. medic.* L. II. p. 140. L. III. p. 190. ex descriptione.
- h) *Pyrola Dist. des Drog.* p. 451. & T. 18. f. 14. ic. DODONAEI.
- i) *Cat. plant. circa Gies.* p. 94. *Pyrola*.
- k) ad mentem RIVINI *pyrolam* vocat, & denuo *pyrolam folio obtuso. Viridar. Warjav.* p. 99.
- l) *Pyrola flammibus* & *pistillis declinatis Fl. Lapon.* 169.
- m) *Pyrola a pyri folio Ic. stirp.* p. 294. similis CAMERARIANAE sed obscurior.

que distingui a CLVSIO n); neque satis eas distinxit
 BESLERO) aut MORISON p). Sed Tubam rectam adeo-
 que alteram speciem habent RIVIN. q) RVPIVS r), WAL-
 THER s), DILLENIVS t). Plane non liquet de stirpibus
 BRVNfelsii u), DORSTENI x), FVCHSII y) TRAGI, z),
 GESNERI aa) LONICERI, bb) MATTHIOLI cc), DODO-
 NAEI,

- n) Varietatem facit *Pyrolae vulgaris folio maiori & molliori*
 & aliam folio *minori & duriori*, PANN. p. 505. & *Hist.*
 CXVI. defer. sed veras notas distinguentes non tradit: Eas vari-
 etates curat C. B. P. & MOR.
- o) *Pyrola H. ERST. Aest. Ord. V. T. XI. f. 2. folia & exiguitas*
plantae respondent, Tubae aliae rectae, aliae incurvae.
- p) *Pyrola rotundifolia maior. H. Oxon. III. p. 504. habet de-*
scriptionem I. B., icones duas, aliam rectis, aliam incurvis
Tubis, hancque maiorem.
- q) *Pyrola minor. Pentap. irreg. bene.*
- r) *Pyrola rotundifolia maior. flor. Ienens. p. 235.*
- s) *Design. plant. hort. sui. nomine RIV.*
- t) *Catal. plant. circa Gieff. p. 94. eodem nomine, tum Synops.*
RAIANAE Edit. III. p. 363.
- u) *Pyrolae HIERONYMVS HERBAR. II. p. 312. facit marem*
& feminam. BRVNfels v. III. p. 88. obliquam dat Iconem,
- x) *similis icon. p. 225.*
- y) *Limonium c. 175. p. 457. Tuba brevis recta, sed spica rara,*
habitus altior.
- z) *Limonium silvestre p. 707. ead. Icon.*
- aa) *de collect. stirp. Pyrola, nihil distincti, neque Pyrola vulgo dicta*
hort. German. p. 272. b.
- bb) *Limonium pratense herbar. Germ. 1560. L., V. cap. 135. ha-*
bet icones DORST. & FVCHSII,
- cc) in DIOSC. p. 282.

NAEI, dd) CAESALPINI ee) CASTORIS ff) THALII gg)
 LVGDVNENSIVM hh), TABERNAEMONTANI ii),
 SCHWENKELDI kk), C. BAVHINI ll) PARKISONI mm)
 AMBROSINI nn), MEKRETI oo) LOESELII pp) ELSHOL-
 ZII qq), HOFMANNI rr) NYLANDI ss), COMMELINI tt)
 HERMANNI uu), KNAVTHII xx), MAGNOLI yy),
 FRANCI zz), SIBBALDI aaa) SVTHERLANDI bbb),
 PLVK-

- dd) *Pempt.* ed. 1616. p. 138. *Pyrola*,
 ee) *de plant.* L. VIII. cap. 32.
 ff) *Pyrola herb. nuovo* p. 363.
 gg) *hercyn.* p. 85. *Pyrola maior seu Beta sylvestris*,
 hh) *ex Dodon. bist. plant.* p. 84.
 ii) *Pyrola* p. 718. ad minorem Tubercula videtur pertinere
 ob folia crenata &c.
 kk) *Pyrola maior* p. 172. *styp. fles.*
 ll) *Pyrola rotundifolia maior.* C.B.P. & *plant. Basil.* p. 56.
 mm) *Pyrola nostras vulgaris* p. 508. cum icone Lobel.
 nn) *Pyrola maior sine beta sylvestris Phytol.* p. 450.
 oo) *Pyrola Pin.* ver. Brit. p. 99.
 pp) *Pyrola rotundifolia maior.* *flor. pruss.* p. 209.
 qq) *cod. nomine, flor. March.* p. 163.
 rr) *Pyrola Delic. sylv. altd.*
 ss) *nederl. Kruyt.* 6. p. 112.
 tt) *Pyrola rotundifolia maior.* *cat. pl. indig. boll.* p. 92.
 uu) H. L. B. p. 311.
 xx) *Enum. plant. circa kal.* p. 64.
 yy) H. R. M. p. 166.
 zz) *Pyrola limonium, Flora francica* p. 468.
 aaa) *Pyrola, spec. bist. nat. Scot.* p. 44.
 bbb) *Catal. plant. horti. Edinburg.* 281.

PLVKNETI ecc), VOLKAMMERI ddd), MVNTINGII eee),
TOVRNEFORTII fff), TITAE ggg), IOHRENI hhh),
TILLII iii), DALE kkk), LINDERI lll), BOECLERI mmm),
BVXBAVMI nnn), SIEGESBECKII ooo), VAILLAN-
TII ppp).

De maiori omnino loqui videtur TOVRNEFORT
qqq), & BOERHAAVIVS rrr).

De minori DUVERNOI sss), & MICHELI ttt).

B 2

Pf

ccc) *Almagest. Bot. p. 309.*

ddd) *Pyrola nostras vulgaris, Flor. Nor. p. 347.*

eee) *Pyrola officinarum vulgaris, waare cessenig p. 552.*

fff) *sebol. Bot. p. 5.*

ggg) *hort. Mauroe. p. 141.*

hhh) *Padem. botan. p. 169.*

iii) *hort. pisan. p. 141.*

kkk) *Pyrola pharmerol. p. 333.*

lll) *Pyrola rotundifolia maior. Tournef. Alsat. p. 100.*

mmm) *Mater. Med. p. 560.*

nnn) *enum. plant. circa Ital. p. 274.*

ooo) *Pyrola rotundifolia maior. Primlt. flor. Petrop. p. 92.*

ppp) *Botan. paris. p. 159.*

qqq) *IRH. conf. Tab. 131.*

rrr) *Ju. d. Alt. p. 278. Characterem enim genericum utriusque
subit Tuba incurva.*

sss) *Pyrola rotundifolia minor. Catal. pl. circa. Arc. Tub. p. 123.
in quo natali solo ipse legi minorem vulgarem, nunquam
eam, cuius nomen dedit AVCTOR, raram & montanam
stirpem.*

ttt) *Pyrola folio subrotundo leviter crenato apud TILL. hort.
pis. p. 414.*

Pyrola rotundifolia minor RVPPH uuu), quam cum duriori CLVSII, coniungit, videtur minoris varietas esse.

§. IV.

In sylvis inter *Nürten* & *Soeterobr* Fungus parvus lubricus, aureus, lamellis varis amplioribus pediculo crassiore 1) repertus est: cui pediculus flavus splendens, latus, in medio linea depressiori notatus: Capitulum leniter pulvinatum vel planum, totum viscidum, superius aurantium, lamellis raris, paucis, crassis pallidioribus. Eam vero sylvam egressi, in agello cis pagum *Soeterobr* elegantia sua spectabile vidimus *Papaver erraticum maius flore albo*, varietatem nempe vulgaris rubri, quam pro rarissima habuit C. BAVHINVS 2). Eius mentionem opinione pauciores visi sunt fecisse, MORISON 3), RAIVS 4), VOLCAMMER 5), TOURNEFORT 6), TILLI 7), VAILLANT 8), & BOERHAAVE 9). SUTHERLANDUS 10), copiosus florum albedine variantium nomenclator, hunc quidem non habet. Ungues flavi sunt, bracteae niueae.

§. V.

uuu) flor. *Jenens.* 1 c.

1) MICH. nov. gen. plant. p. 147.

2) PIN.

3) H. OXON. II. p. 277.

4) HIST. PLANT. p. 855. syn. III. p. 308.

5) flor. *Noric.* p. 317.

6) IRH.

7) hort. *pisan.* p. 131.

8) *Botan. Paris* p. 156.

9) *ind. alt.* p. 280.

10) *Vid. hort. Edinburg.* p. 260.

Pluvia intercescit diligentiae nostrae, quae ubi coelo sereniori excepta fuit, in pratis apricis sesquileuca cis Osterodam viae Regiae sinisterius adjacentibus, plantulas aliquas perelegantes legimus. Univerſum ſolum tegebatur *Trifolio Lupulino minimo*, quod primus diſtincta icone & deſcriptione ſufficiente adſervit DILLENIVS. 1) Sed primus id propoſuiſſe videtur THALIVS, cujus veſtigia legendo, non ſine voluptate aliqua plantas haud pauciſſimas reſtituere didicimus, quae vt laterent, fecit iconum defectus, deſcriptionum brevitās, ac ipſa ſaepe ubertas congenerum. Deſcribit nempe *Trifolium Lupulinum*, tum aliud, quod *Medicaginis ſpecies eſt*, ſed tertium addit, 2) *minus ſuffruticans ſerme, viticulis multis exiguis, gracilibus & ſtriatis in terra diſreptans, quosdam etiam dodrantali altitudine erigens, foliis brevioribus, humani ferè cordis (qua nempe figura vulgo pingi ſolet) aliquam ſimilitudinem exprimentibus, ac pulchrè ſuis nervis ſtriatis: capitulis ſtorum & racemis ſeminum iſſdem cum priori (Medicagine) Reperitur in aridioribus pratis, marginibus & ſecus vias. Sic ille. Folia cordis humani figura & ſtriae foliorum, maniſeſto indicant, non eſſe varietatem Medicaginis, cui folia molliora ſubhirsuta neque cordata ſunt. Deinde noſtrum eſſe, ipſe locus natalis indicat in apricis & ſiccioribus hercyniae ſylvae pratis, Quod capitula Medicagini ſimilia faciat THALIVS, videtur ex familiari ſeculo*

B 3

illo,

1) *Synopſ. III. p. 31. T. XIV. f. 4.*2) *hercyn. Saxono-Thuring. p. 124.*

illo neglectu minutioris observationis factum esse. Dignoscitur a reliquis facile, foliis concinne striatis hilo majori excisis, capitulo vix ultra novem flosculos habente, ipsa statura humiliori cum duritie tamen et fruticosa natura coniuncta. Si coniecturae locus esset, *Trifolium lupulinum alterum minus*, Catal. plant. circa Cantabr. p. 166. & Cat. Stirp. Angl. p. 290. omnino cum hoc nostro coniungerem. Ea enim RAIVS locis modocitatis dicit omnium Trifoliorum Anglicorum minima esse, cum *Trifolium Lupulinum alterum minus* in Hist. Plant. 949. & Syn. III. p. 330. canles habere dicat etiam ramosiores & maiores quam vulgare Lupulinum maius. Verum longe certiora synonyma sunt, *Trifolium luteum Lupulinum minimum* H. OX. 3) SVTHERL. 4) IRH. BVX-BAVM, 5) VAILL. 6) *Trifolium pratense Lupulinum annuum luteum omnium minimum, foliis cordatis, siliculis compressis, monospermis* MICHEL. 7) *Lupulinum minimum* RVPP 8) & GEMEINHART. 9).

§. VI.

Abundant ea prata imprimis Orchidibus. Inter quas solam excitare libuit *Monorchin*, cum altera, quae odore

3) Il. p. 142.

4) hort. Edimb. p. 341.

5) enum. plant. circa Hal. p. 325.

6) Botan. Parir. p. 196.

7) nov. gen. plant. p. 29. Annon huc etiam *Trifolium arvense Lupulinum supinum minimum sublateum folio cordato*. MICHEL. apud TILL. p. 168 ?

8) flor. Jenens. p. 207.

9) plant. circa Laub. 69.

odore hirci minor est. MONORCHIS equidem habuit & staminum fabrica Orchis est, differt galeae duobus foliis non ut in Orchide solent simplicibus, sed ex scutulo pallido spinulam producentibus 1), defectu calcaris, radice unica, substantiae paulo firmitioris. Odor suavis & melleus est. Admiratio subit, quando apud CB. unicum synonymon video CLVSII, 2) cum dubio de alio synonymo C. Gesneri. Namque praeterquam quod de C. GESNERI 3) stirpe dubium nullum sit, manifeste huic pertinet, *Satyrii VII. prima species in apricis montibus TRAGI.* 4) deinde *Triorchides LOBELIANAE*, quibus rotundi bulbi sunt. & quas nemo mortalium post GEMMAM distinctas vidit. Sunt haec *Orchis frisia littoralis* siue *triorchis lutea tertia LOBELII* 5) ex qua nata est *Orchis Frisia littoralis LVGDVN.* 6) PARKINS 7) AMBROSI- NI. 8) *Testiculus luteus: Orchis lutea TABERN.* : 9) *Orchis*

- 1) conf. opt. Icon. MICH. pro labello inferiori etiam IOH. BAVHINI.
- 2) *Orchis pusilla alba odorata EIVS Pann. p. 239. Orchis VII. biflor. p. 269.*
- 3) *Satyrii species quam monorchin dixeris GESN. hort. Germ. p. 279.*
- 4) *herbar. p. 782.* altera vero species in uliginosis pratis autumnis florens est *Orebidastrum MICH.* cuius & icon adest.
- 5) *Icon. 186. icon exterior: folia vero hirsuta valde anomala sunt. Nostram esse & radicum forma & floris effigies rudior indicat. Ejus autem Varietas Orebidastrum videtur.*
- 6) *bist. gener. p. 1550. ic. int.*
- 7) *Theatr. Botan. p. 1355.*
- 8) *Phytolog. p. 394.*
- 9) *Icon. p. 670.*

chis lutea hirsuta folio CB. 10) MORIS. 11) *Orchis Frisia lutea* MERRET. 12) *Orchis Frisia hirsuta* LB. 13) RALL 14) *Orchis Frisia hirsuta littoralis Lobelii* CHABR. 15) Deinde huc facit *Orchis minor Leodiensis* LOBEL. 16) AMBROS. 17) ex qua prouenerunt *Triorchis lutea Gemmae* LVGD. 18) *Triorchis lutea altera* CB. 19) RAI 20) *Triorchis lutea Leodiensis* PARKINSONI. 21) & vti plane videtur, *Triorchis lutea* I. TABERNAEM. 22) Tandem huc etiam referendā est *Triorchis lutea flore luteo sive Basilica minor, serapias* & *Triorchis Aeginetae* LOBELII. 23) quae eadem est *Triorchis lutea flore luteo Gemmae* LVGDVN. 24) *Triorchis lutea* II. TABERN. 25) *Triorchis lutea*

10) Pin.

11) H. Oxon. III. p. 497.

12) Pin. rer. Brit. p. 87.

13) Hist. univ. II. p. 769.

14) Hist. Plant. p. 1717. cum signo ignotas indicante

15) Sciagraph. p. 252.

16) icon. p. 187. in femine.

17) phytolog. p. 394.

18) Hist. gener. II. p. 1561.

19) Cat. plant. circa Basil. p. 23. indicata in monte Wassera Sall; ubi nemo vidit distinctam stirpem a *Monorchide* totius helvetiae familiari planta.

20) Cat. plant. exter. p. 193.

21) Theatr. p. 1355.

22) icon. p. 677. licet paulum a LOBELIANA inmutata sit,

23) icon. p. 187. exterior.

24) Hist. gener. p. 1561.

25) Icon. p. 677.

lutea folio glabro CB. 26) MOR. 27) RAI. 28) *Triorchis lutea altera Gemmae folio glabro* PARKINSON 29) Quare non erat, cur quinque nomina noua obrutae iam huius herbulae historiae inferret MENZELIVS 30) neque erat cur in MENZELIO confisteret MICHELIVS 31), ante quem tor fuerant huius Monorchidis descriptores, & inter eos eximius CLVSIVS atque I. BAVHINVS. 32) Alias etiam icones dederunt LOESELIVS 33) & RVPPIVS 34) non optimas tamen, & nomina PARKINS. 35) MORISON, 36) RAI 37) MERRET 38) PLVKNET 39)

- 26) *Catal. plant. circa Basil.* p. 23. circa arcem *Birsek*, ubi a nemine hucusque alia reperta est, & *Piu*.
- 27) *H. ox.* III. 497.
- 28) *Catal. plant. extr. Brit.* p. 193. & *Hist. Plant.* p. 1217. cum signo indicante sibi ignotam fuisse.
- 29) *Theatr. Bot.* p. 1355.
- 30) *Pugill. stirp. var. post Lexicon*, cum figuris mediocribus Tab. V. Eadem exstant etiam apud RAIUM p. 1216. 1217. & MOR. III. p. 497.
- 31) in ejus historia novo nomine proposita *nov. gen. plant.* p. 30.
- 32) cui est *Orchis parva autumnalis lutea* II. 768.
- 33) *Orchis colco unico seu monorchis flosculis pallide viridibus flor. pruss.* p. 154. Icon n. 61. an huc etiam referenda *Opobris monophylla bulbosa* id. p. 180. & Ic. 57?
- 34) *Flor. Jenens.* T. II.
- 35) *Orchis pusilla odorata Theatr.* p. 1354.
- 36) *Orchis odorata morchata sive monorchis* H. ox. III. p. 499. quo nomine & CB. & AMBROSINVS vsi fuerant.
- 37) *Hist. plant.* p. 1217. eod. nomine & Syn. III. p. 378. in *Cat. stirp. Angl.* p. 217. nomine PARKINS utitur.
- 38) *Pin. rer. brit.* p. 87. eodem.

39) SCHEVCHZER 40) vt mirabile sit longe magis, quod omiffa fit a TOVRNEFORTIO, Galliae forte non indigena. Nomen antiquum *Monorchis* efficax & breve videtur, neque in alium illud HERMINII quod inposuit CL. LINNAEVS 41)

§. VII.

Paulo propius speculam sed in eodem prato, fici-
ciori tamen loco, nascitur frequens *Orchis* odore *birci*
minor, cui *Folia* angusta cauli adpressa, *spica* florum laxa
odore cimum, *Cucullus* ita arctus vt trifolium esse
iurares, colore aut viridi aut obsoleto purpureo, aut misto
ex utroque, cum lineis saturationibus: Duo Petala
acutiora latent inter reliqua: *Apices* pallidi; *Barba*
trifida ad ovarium reflexa, segmentis lateralibus vno
alteroue dente insignibus, medio mucronato, viridis
aut ex purpureo virens, punctis in medio rictu purpu-
reis. *Calcar* purpureum parallelum ovario. Hanc spe-
ciem num DODONAEVS a) arque CLVSIVS b) de-
scri-

39) *Almag. Ber.* p. 271. nomine CB.

40) *cod. It.* VII. p. 516. cum charactere.

41) *Flor. Lapon.* n. 317.

a) *Minores testiculi huius generis* 4. (neque Morionum) DOD.
pl. Corsu. p. 216. & *Pemptad.* p. 236. videtur ex colore vario,
odore ingrato, & quod vix alia *Orchis* sit, cui hae voces
DOD. tribui possint.

b) *Pro Orchide* VI. *Hist.* p. 268. Convenit odor; sed
color, & *spica* arcta, non admodum respondent. Con-
iunxit tamen VALLANTIVS. Natae sunt ex stirpe CLV-

scripserint, non satis liquet; de LOBELIO c) vero res extra controuersiam est, cuius prima Icon, neque mala est, habitu etiam reflexo expresso, licet TABERNAEMONTANI d) figura etiam magis placeat. VAILLANTIVS e) non nisi flores dedit. Descriptio praestantissima est RAII f) Caeterum LVGDVNENSES g) CASPAR BAVHINVS, h) IOH. BAVHINVS, i) CHABRAEVS, k) PARKINSONVS, l) AMBROSINVS. m) MORISONVS n) NYLAND o), MAGNOL, p) TOVRNEFORTIVS,

C 2

TIVS,

SII. *Orcbis odore hirci minor spica purpurascens* CB. IRH. *spica purpurea* H. OXON. III. p. 492. *Orcbis Batavica* IB. II. 764. CHABR. p. 250. *Tragorchis batavica* Clusii PARK 1049.

- c) *Tragorchis minor* & *verior* C. *Gemmae f. coriariae* & *Coriophora flore inflar cimicium* LOBEL. Ic. p. 177.
- d) *Testiculus hircinus* III. *minor*. Icon. omn. stirp. p. 672.
- e) *Bot. Paris* T. XXXI. f. 30. 31. 32. absque nomine. Idem nomine a CB. adcepto describit *Bot. Par.* p. 149. & varietatem addit *flore subviridi*.
- f) *Hist. plant.* p. 1213. *Tragorchis minor flore fuliginosa*.
- g) *Tragorchis minor* & *verior Gemmae* LVGD. 1557.
- h) *Orcbis hirci odore minor* PIN.
- i) *Tragorchis minor flore fuliginosa* II. p. 764.
- k) *Sciagraph.* p. 250. eodem nomine.
- l) *Tragorchis minor* & *verior* Tabatr. p. 1349.
- m) nomine C. B. *Phytol.* p. 392.
- n) eodem H. OXON. III. p. 491. S. XII. T. 12. f. 10.
- o) *kleene Boekskullekens nederl. kruidb.* p. 279.
- p) *Bot. Monspel.* p. 192. H. R. M. p. 149. nomine C. B.

TIVS. q) PLVKNET, r) DILLENIVS, s) RVPPIVS, t) LINDERVS u) BVXBAVMIVS, x) TILLIVS, y) ERNDELIVS, z) &c. eius meminerunt, & hi fere in industria priorum adqueuerunt.

§. IIX.

Ad asperas rupes, quae ea prata finiunt, frequens est *Turritis minor*, quae & ipsa videtur descripta a THALIO, a) nomine *Pilosellae filiquatae maioris*. Adcedit locus natalis in aridis, folia ad terram longa & aspera, filiquae & flores. Id vnum non responder, quod caulem foliis pene carere dicat. Et eo videtur respicere icon b) D. quam CAMERARIUS *minori speciei* adtribuit. Prima a THALIO descriptio est I. BAVHINI,

q) *Hist. des Pl. aut. de Par.* 508. IRH. eodem.

r) *Orchis foetida III. f. hinc odor minor, Almag. Bot.* p. 271. quo & RAI *Catal. stirp. Ext.* p. 191.

s) *Cat. Plant. circa Giss. nasc.* p. 85. nomine C. B.

t) *Flor. Jencus.* p. 239.

u) *Tournef. Atlas.* p. 44.

x) *Enumer. plant. circa Hal. nasc.* p. 243.

y) *Hort. Pisav.* p. 124.

z) *Virid. Warsaw.* p. 85.

a) p. 84. neque videtur hanc praetervidere potuisse. Stirpem THALIANAM peculiarem facit C. BAVHINVS, dicitque *Bursae pastoris similem filiquasam maiorem seu maioribus foliis & conjungit Aizoon Telephium* LVGD. p. 1131. cuius icon mala est, descriptio non recedit. Inter stirpes CB. nulla planta reperta est hoc nomine insignita.

b) *ir.* VII. post *Tbal.*

HINL. c) Eadem macilenta tota obducit *Lichen* in *Alpibus* etiam visus, cui expansio est nigricans, tuberculosa, aliquando in sphaerulas ex cyaneo atras congesta, per quam denso ordine sparguntur scuta magna, variae figurae, rufa, in quibus frequentia puncta nigra absque lente conspicua. Pertinet omnino ad ordinem MICHELII xxxvi. qui adeo affinis est *Lichen-Agaricis* & inprimis *disci formi punctato nigro* qui in ligno arescente reperitur, ut diuersitatem exhibere non sit facillimum. An *Lichen pulmonarius saxatilis minimus folius foliis pulposi* MICHEL. d)

§. IX.

Supra OSTERODAM syluae incipiunt ex *Abiete* rubra, altae & late patentes. In iis adcliuibus locis, & ubi arbores excisae sunt, *Digitalis purpurea*, & *Chamaenerium vulgare latifolium* ubique nascuntur speciosa pulchritudine. Ad humecta vero viarum, frequens est per omnes *hercyniae* syluas *Cardamine annua exiguo flore*, quam THALIVS nomine *Nasturtii montani maioris* 1) primus descripsit, nisi eadem fuerit *Cardamine Alpina media* CLVSII, 2) quae tamen, cum folia dicatur habere hirsuta & aspera, non penitus respondet. Atque consimilibus locis prouenit *Cardamine IV. Dalechampii* 3)

C 3

siliquis

c) *Herba S. Alberti Barbarea muralis, de plant. a Divis nomen hab.* p. 9.

d) O. xxxvi. p. 107. n. 2.

1) *Hercyn. Saxonoebur.* p. 79. Icon non mala f. BAVHINI.

2) PANNON. p. 455. absque iconc.

3) quae omnino videtur primum etiam proponi a THALIO,

siliquis, semine, flore, simillima, sed caule & foliis hirsutis, foliis praeterea imis integris, superioribus non eleganter tridentatis, ut in priori, sed vagis, atque vage incis, pinnis rarius ad pediculos confluentibus. Vulgare etiam hic est *Equisetum sylvaticum tenuissimis setis*: Tum *Melampyrum montanum floribus minoribus flavis*. Hoc primum a BVRERO 4) dictum videtur, nomine *Melampyri parui Alpini*, id enim locus natalis indicare videtur, cum in Iurassi & alpium inferiorum sylvis, & vniuersa Hercynia frequens sit. Idem videtur *Melampyrum latifolium floribus paruis luteis* CELSII apud LINNAEVM. 5) Hanc stirpem pro varietate *Melampyri vulgaris* habet amicissimus LINNAEVS. Verum proportio diuersissima contrarium videtur indicare. Est nostro habitus ramosior, folia magis nutantia, floris hiatus magis patulus, flos tandem vniuersus altero tanto minor in stirpe etiam proceriore quam est vulgare, & aequabili flavo colore tinctus, qui in vulgari albus est rictu flavo. Quod autem noui generis loco sit proposita olim a nobis, visum est hic rationem indicare. Quum in sylvis Iurassi versus autumnum anni 1734. copiose id legerem, manifesto vidi labium inferius trifidum esse tribus nempe profundis dentibus incisum. Verum *Melampyri* Character

sub tertia specie *Symphriti aquatici* p. 107. quod iam suspicatus est I. BAVHINVS. Icon elegans pro paruo specimine CAMERARII EPIT. p. 370. pro *Sio Aquatico altero*.

4) ACT. SVECIC. ann. 1724. p. 508.

5) Flor. Lapon. p. 240.

raëter a TOVRNEFORTIO, 6) RAO, 7) BOERHAEVIO, 8) KNAVTIO, 9) ita erat constitutus, vt labium inferius integrum pro maxima distinctionis nota adesset. Quare existimavi, nactum me esse haud obscuram diversitatis notam, donec sequente aestate, sed emissam irreuocabili scheda, comperii, omnia nostra Melampyra eodem modo labium inferius habere tridentatum, manifestius quidem hoc & vulgarius *latifolium luteum*, & *violaceum* quod & RIVINI Iconibus exprimitur, 10) obscurius illud *coma purpurascens*, 11) verum & id satis etiam manifestum. Quare nouo argumento didici, nunquam alienis oculis videndum esse, nunquam praecipirandas obseruationes, quae a serioribus annis maturitatem in vsus publicos exspectant.

§. X.

Frequens in iisdem syluis omnibus est *Dentaria heptaphyllos baccifera*, quam vbique fere floribus atque fruticulis absque vlla sobolis generatione marcescentibus offendi, baccis vero ex aliquot acinis compactis ad alasforum sedentibus. Quae planta quociens superior scapus absque

6) IRH. p. 173. & icon. Characterist. T. 78. D.

7) Method. plant. p. 91.

8) Ind. alt. p. 236.

9) Meth. genuin. p. 108.

10) monop. Irreg.

11) cui labium inferius integrum pingitur a TOVRNEFORTIO l. c. & RIVINO.

absque foliis imis pinnatis decerpitur, fit iconi similis, quam pro *Coralloidis* alia specie videmus apud COR-
DVM, 1) & pro *Dentaria angustifolia baccifera* pecu-
liari apud BESLER. *Hort. Eyst.* 2) Ex qua nata est spuria
species, *Dentaria baccifera foliis Ptarmicae* CB. repetita
sed cum asterisco a RAI. 3) Obiter etiam notamus in
icone, quae a KENTMANNO communicata, adest in
CORDO pro *Coralloide*, 4) male baccas omissas esse
foliaque terna depicta; DODONAEVM 5) vero stir-
pem CORDI, quae certo nostra est, cum *pentaphylla*,
& *heptaphylla* minus recte coniunxisse: Helvetia enim,
vbi plurima nascitur *quinquefolia* & *septifolia* DODO-
NAEL, caret baccifera, cuius in vniuersum habitus multo
est minor & tenerior, & filiquae, si quidem perficiun-
tur, exiliores.

§. XI.

Sylvas vbi reliquimus, iam proximi oppido CLAVS-
THAL, prata humecta offendimus, in quibus inmen-
sa erat vis stirpis, quae insolita specie oculos perstrinxit,
quam ipsam sequentibus diebus frequentissimam ad riuu-
lum *die Innerste* prope opera metallica, & denuo
GOSLARIAE, semper ad aquas vidimus. Radices erant
graciles, repentes albae, *Caules*, alias erecti, procum-
bebant

- 1) *Hist. Plant. L. II. c. CXI.*
- 2) *Aest. Ord. VII. tab. 12. fig. 2.*
- 3) *Hist. plant. p. 785.*
- 4) *l. c.*
- 5) *Pempt. II. L. I. c. 7.*

bebant saepe admodum ramosi, glabri caeterum, teretes & striati. *Folia* virentia varia, ima subrotunda, angulosa, paucis dentibus incisa, subhirsuta: haec ex radice ante natum caulem, & ad laterales stolones. In imo caule alia, *Barbareae* foliis adfinia, praeter bracteam latam sinuatam recipientia aliquot graciles pinnas ad pedunculum eundem, haec glabra. Superiora denique glabra, satute virentia, ambitu dentato: vltima integra. *Flores* copiosi ad summos ramos non adpressi caulibus, sed vagi magis. *Calyx* quadrifolius, pallens, minor petalis. *Petala* quatuor subrotunda lactea. *Siliquae* sparsae & a caule recedentes, vnciales & ultra, seminibus incrementibus distinctae, vt pene articulae videantur. Quae cum viderem, a *Turritide vulgari ramosa*, cuius fere faciem prae se fert, distinxi facile, foliis & flore maiori: *A Leucoio verno perenni albo*, cui adfinis videbatur aliquo modo, foliis glabris & pinnatis tenuibus. In scriptis Botanicorum duae obuiae sunt stirpes nostrae similes. Altera *Thlaspios generibus cognata planta* THALH. 1) cui coniungo *Nasturtium montanum* SCHWENKFELDI 2) *Nasturtium Barbareae foliis* C. BAVHINI 3) PARKINSONI 4) RAIL, 5) *Nasturtium Alpinum Barbareae foliis* BVSERI apud C. BAVHINVM. 6)

1) *Heryn.* p. 122.

2) *Stirp. Siles.* p. 145.

3) *Pin.*

4) *Theatr. Bot.* p. 828.

5) *Caral. stirp. extra Brit.* p. 188. *Hist. plant.* p. 817. cum Allertico.

HINVM. 6) Atque de hac *Thaliana*, omiffa a recentioribus, neque vifa RVPPIO, DILLENIO, LOESELIO &c. dubium nullum erat, quin ipfa ftirps noftra efferet. Verum in recentioribus fcriptis offendi *Turritidem minorem foliofam* PETIVERI apud RAIM, 7) quae foliis imis hirsutis, fuperioribus glabris, filiquis a caule abfequentibus, noftrae fatis videbatur adfinis. Sed Icon *Brassicae spuriae exilis hirsutioris subrotundis foliis caule magis foliofo* PLVKNETI 8) admodum a noftra recedit, foliis rotunde dentatis, & habitu erecto, ita vt fi adiungas hirsutiem, fimilior fit *Turritidi minori*. Quare cum *Nasturtii* nomen ferri non poffit, *Sisymbrii* nomine insigniendam exiftimaui, quo *Turritis vulgaris ramosa* ob fparsas filiquas referenda videtur. Licet, vt veram fatear, limites *Leucoii*, *Hesperidis*, *Sisymbrii*, *Eryfimi* & *Erucae*, non ita conftituti videantur, vt certas diftinctionis notas fubpeditent. Dixi itaque *Sisymbrium palustre album, foliis imis Barbareae, reliquis integris dentatis*.

XII.

In iisdem elatioribus, fed humidis tamen pratibus frequens nascitur *ARNICA*, quam in fasciculos colligatam fub fenestris aedium ubique per fylvam hercyniam ficcari vidimus. Semiflofculi in ea femen habent pappo coronatum, quare a *Doronici* genere ad *Solidaginem* remota eft a VAILLANTIO, 1) & eandem ob

6) Prodr. p. 45. ex *Auftria*.

7) Synopf. p. 294.

8) *Atmag. Botan.* p. 70. & T. 80. f. 2.

1) *Solidago foliis oblongis nervofis plerumque conjugatis* Memoir. de l'Acad. des sc. 1710. p. m. 380.

ob rationem in proprium genus constituta ARNICAE nomine a Cl. MOEHRINGIO. 2) Quae eadem ratio *Doronicum latifolium magno flore* iurget *Solidagini*, contra quam visum est VAILLANTIO, 3) uti repetito in Alpibus Helueticis obseruavi. In hac stirpe a CLVSIO & IOHANNE BAVHINO, quod rarissime fit, & a LINNAEO dissentire cogimur, qui omnes duas faciunt huius stirpis species. Et CLVSIVS quidem, in *Pannonicis* proponit *Doronicum Austriacum* III. 4) caulis in summa parte ramoso, foliis plantagineis modice acuminatis, idque coniungit cum stirpe SIMLERI, 5) *Muttervurz* dicta, in Heluetae alpinis & subalpinis pratis frequente. Idem in magno opere, iconem eandem pro *Doronico Pannonico* VI. 6) cum alia descriptione ponit, descriptioni vero Austriaci quatuor novam addit iconem, folia exprimentem acutiora, atque florem unicum, altero tamen ex ala folii subnascente. In quibus evidens est, optimum Virum non satis sibi constare: Hoc etiam caput cum festinatione aliqua scriptum esse, vel inde adparet, quod sub finem *Quarta*

D 2

2) *hort. priuat.* p. 106.3) *l. c.* p. 390.4) *Pannon.* p. 520. & *ic.* p. 522. ut absque iusta ratione moveat I. BAVHINVS alienam iconem *Doronici* serrati adpositam esse, ea enim ad III. spectat, ipso titulo id indicante.5) *de Vales. Alp.* p. 333. quae tamen omnia ex ARETII, civis mei, Itinere per *Stockhorn* & *Nessum* montes exscripta sunt, ex p. 234. b. apud CORDVM editionis GESNERIANAE.6) *Hist. Plant.* p. XVIII.

tum Doronicum 7) cum SIMLERI stirpe coniungat, quod nempe quartum fuerat in Pannonicis, in historia num quintum an sextum sit, non satis liquet, quartum certe non est.

IOHANNES BAVHINVS descriptionem *Doronic* *Quarti* in Pannonicis, & V. in historia, recenset sub titulo *Doronic Germanici foliis binis ex aduerso nascentibus villosis*. 8) *Doronicum* vero nouum Pannonicum VI. cum stirpe MATTHIOLI & omnium Auctorum coniungit, nomenque facit *Alismatis Matthioli siue Plantaginis montanae*. 9) Vbi liquido adparet, a stirpe MATTHIOLI & aliorum scriptorum, male separari *Doronicum Quintum* CLVSII in historia, (vt quod in Austria, Francofurti & in Belgicae montanis nasci testatur CLVSIVS) & coniungi cum stirpe peculiari Hungarica. DALEVS certe ita secutus est CLVSIVM & IOH. BAVHINVM, vt *Doronicum germanicum* & *Arnicam officinarum* 10) suspectum habeat naturae venenatae; *Alisma* 11) vero officinarum pro egregio vulnerario laudet, excitatis locis in EPHEMERIDIBVS NAT. CVR. 12) manifesto de Arnica agentibus. CL. LINNAEVS vltimo loco causam egit CLVSII & IOHANNIS BAVHINI, & duas stirpes fecit aliam monanthon, 13) foliis acutis, quam *Doronicum foliis lanceolatis* vocat, & coniungit cum

7) p. XIX.

8) *Hist. Univ.* III. l. XXV. p. 19.

9) *ibid.* p. 20.

10) *Pharmacolog. suppl.* p. 51.

11) *ibid.*

12) FEHR. Dec. 1. Ann. IX. & X. Ob. II. cum Ic.

13) *Flor. Lapon.* 305.

cum Alismate IOH. BAVHINI, & cum *Doronico VI. Clusii*, sed praeterea cum eodem *Doronico III. in Pan-nonicis*, quod in *historia V.* est. Aliam vero speciem facit polyanthon foliis obtusioribus, quam dicit *Doronicum foliis oblongo ovalibus*, 14). eamque absque CLVSIANO (synonymo cum stirpe MATTHIOLI 15) SCHEVCHZERI 16). RVPPH 17) cum Arnica nempe officinarum coniungit. Quia in re vim infert optimus LINNAEVS CLVSIO, qui *Doronicum* suum V. *Germanicum* nunquam monanthon descripsit, sed ramis aliquot in summitate, neque depinxit etiam. Deside CLVSIANVM *germanicum in Austria, Belgio & Francofurti* nascens auellit a stirpe vulgata Germaniae RVPPIO, SCHROEDERO, MATTHIOLO & SCHEVCHZERO dicta, & peculiarem facit *summarum alpium*. Videtur omnino CLVSIANA enarratio confusionis habere aliquid, Iohannes vero BAVHINVS stirpem V. CLVS. in *histor.* exscripsisse sibi non cognitam; & plantam ramosam sibi visam, cum ramosa etiam VI. CLVSII pro distincta posuisse. Neque enim facile stirpes multiplicat, nisi quando post alios loquitur. LINNAEVS tandem varietates duas ante oculum habuit. Nos ipsi in *Gotthardo M. & Valle Vrserrana* *Doronicum* vidimus monanthon, foliis ad caulem aut minimis aut nullis, humile, foliis acutis asperioribus. In humilioribus vero *Vallis Haseliae*, & in sylua hercynia, *Doronicum* caule ramofo folioso multifloro, foliis

D 3 . . . liis

14) *Flor. Lapon.* 304.

15) *Ahrma*, ed. 1561. p. 233 9. 4.

16) *It. I.* p. 36. cum nomine CB.

17) *Flor. Ienens.* p. 141.

Iis mollioribus obtusis, plantaginels. Sed facillime per omnes intermedios 18) gradus demonstrare possumus, eandem esse stirpem quae in editis & frigidioribus uti fieri solet, aliam faciem induit ab ea, quam in riguis vallibus prae se fert. Quare cum CASPARE BAVHINO & VAILLANTIO, utramque stirpem CLVSII coniungendam esse censemus, & utramque praeterea LINNAEI, in admittendis varietatibus alioquin non facilis Botanici.

§. XIII.

Vberime in eisdem pratis provenit *Bistorta*, quam ab omni acuo in duas species distinxerunt, praecunte iam ciue nostro BRVNfelsio: 1) atque ita definiuerunt, ut alia radice magis complicata, folio vero planiori esset, qualis est icon CAMERARII 2) alia vero radice minus intorta folio vero rugoso & sinuato qualem pulchre expressit DODONAEVS. 3) Verum quando *Bistortae* exemplaria ex *Iurasso*, ex *Alpibus* variis, ex humidis ditionis *Bernensis*, ex *Bructero* & *flua bercynia*, vario loco

- 18) Aliquando enim Alpina specimina biflora aut triflora sunt, alias in humilioribus vallibus nascuntur uniflora. Folia etiam omnia peruosa, acumen per infinitos gradus variabile habent.
- 1) Follis rugosis *Nattertharz der münster* I. p. 62. follis vero planis *icon prior* p. 61. absque nomine.
- 2) ex GESNERIANIS *Epis.* p. 683. descriptio vero sinuata habet.
- 3) *Hist. Plant. Pempt.* III. L. I. c. IX. p. 332. bene, qua icona usus est LOBELIVS *Icon.* p. 292.

loco & tempore lecta confero, fateor, me quidem veram diuersitatem non reperire. Folia alias plana, amplissima & pedalia, exigua alias & plicata. Radix aut recta aut semel, bis, ter intorta, statura denique variant. Sed ita, vt alias plana folia cum 4) simplici radice (in BRVCTERO M.) alias folia sinuata cum radice ter intorta vifa sint. 5) Quare valde vellem veras & interiores diuersitatis huius notas edoceri.

§. XIV.

Altera die obuiimus operas metallicas, atque in pratis circa CLAUSTHALIAM, praeter *Violam tricolorem repentinam*, frequens vidimus GERANIVM, de quo dudum multa fuit nobis dubitatio. Habitus ipsi est pene qui *fusci*, foliis semper in lobos ad dimidium sectis, nunquam ad pedunculum vsque, *floribus* binatis, *calyce* glabro, aut subhirsuto, aut hirsutissimo, magna enim varietas etiam in eodem specimine est: *Petalis* ambitu rotundo, purpureis perpetuo sed vel obsoletis magis, vel saturationibus, nunquam coeruleis, picta lineis aliquot tinctoribus, umbilico albo; *Staminum* apices cyanei sunt; *Tubae* reflexae fissae purpureae, *Capsulae* monospermae vna cum rostris hirsutae. Hanc speciem in vniuersa heluetia vidi, nempe ad *Birsam*, & *Suzam* in valle *Delemontana* & *S. Imier*, prope *Bernam* in prato quodam adiacenti balneo exteriori, in *Argouiae* sepibus vdis, in *M. Boezberg* supra *Brugam*. in subalpinis ad *Thermas Leucenses*,

4) qualis fere est Leon prior BRUNFELS Ic. p. 62.

5) qualis icon est MATTHIOLI p. 246.

centes, in montanis circa *Canderseg*. Deinde in omni sylva hercynia in pratis, & *Göttingae* in prato inter sylvas *Heimholz* & *Göttingerholz* yberrime. Francofurto idem etiam misit D. D. SĒNKENBERG, semper ex loco palustri, & humecto. Ut facile adpareat, vulgarem & late nascentem stirpem esse. Quo magis mirum videri possit, difficillime eam extricari, atque ab adfinibus distingui posse. Ab eo quidem quod *Gratia Dei* germanorum dicitur. 1) distinguitur facile foliis simplicioribus, non ad pediculum adeo sectis, floribus neque coerulesis, neque pictis, minoribus denique. Loci certe natalis ratio efficit, ut necessario huc pertineat *Geranium batrachoides* *Dodonaei* flore purpureo magno THALII. 2) *Geranii tertia species similis montanae* GESNERI, 3) quam cum *bistorta* frequentem nasci dicit, & *Geranii montani species foliis asperioribus* quae *mas eiusd.* in append. 4) (ibi vero prior species, quae haec *mas asperior* esse dicitur, videtur ad *Geranium phaeum* siue *fuscum* 5) referri debere) *Gera-*

- 1) In *helvetia* hoc sponte nasci, & CB. in *Basl. catal.* p. 89. & IB. 111. p. 476. adfirmant. Nobis nunquam spontaneum visum est. Quare cum Fratres optimi hoc in *Helvetia* ponant, dubitare licet, an non idem ipsi viderint quod nos adeo frequens invenimus.
- 2) p. 44. loco natali eodem. vidit *albo* flore.
- 3) *hort. Germ.* p. 260. in pratis vdis cum *Bistorta*.
- 4) *app.* p. 292. 6. hoc PILLENIVS in *Hort. Elbham*, ad suum palustre flore sanguineo refert.
- 5) quod foliis est hirsutis & simillimis nostro, sed minus asperis, neque omni potuit GESNERO, cum in *Helvetia* non sit infrequens.

Geranium alpinum SCHWENKFELD 6); *Geranium Batrachoides parviflore* BURS. alt. Suecic. p. 332. ex syluis Heluetiae; *Geranium batrachoides maximum minus laciniatum folio Aconiti* LOH. BAVHINI 7); SCHEVCHZER 8) forte & reliquorum. *Gruinalis pratensis maxima folio aconiti minus profunde laciniato* RYPPH. 9); *Geranium Batrachoides montanum* RAI 10) & *montanum nostras* 11) eiusdem, cuius etiam descriptio simillima. Neque videtur fieri posse ut diuersum sit *Geranium Batrachoides alterum* 12) CLVSII, cuius & icon & descriptio conuenit, cum praeterea vix potuerit nostrum effugisse notitiam diligentissimi viri. Verum inde deducta sunt synonyma multa, quorum aliqua vix videntur admitteri

(6) *Stirp. Siles.* p. 35.

(7) qui & ipse cum Bistorta nasci dicit & descriptionem exhibet simillimam. Ex eo habet CHABRAEVS. p. 487. Monere debemus quod I. BAVHINVS Clusianam stirpem nunquam viderit, quare sibi obseruatam pro noua proposuit absque synonymo.

(8) *It. Alp.* p. 512. plane ex eisdem pratis, ubi nostram, & ego & I. GESNERVS, & HVBERS noster saepe legimus.

(9) *Flor. leuens.* p. 103.

(10) *Cat. Stirp. Angl.* p. 129.

(11) *Hist. Stirp.* p. 1062. optima descriptio, & *Synops.* III. p. 361. Stirpem suam in *Historia* cum dubii signo, in *synopsi* iam certior coniungit cum CLVSIANA. Ex eo MILLERVS.

(12) *Pannon.* p. 417. & *hister.* p. IC. & C. Icon equidem folia habet profunda & fere ad pedunculum diuisa, quod & RAI dubium fuit. Sed locus natalis alpinus & floris color & foliorum ratio reliqua conueniunt.

E

mitti posse. Huc nempe *Geranium batrachioides rubrum* minus CAMERAR. 13) Forte & III. eiusdem. 14); *Geranium sanguinarium* TABERNAEMONTANI 15); *Geranium Batrachioides aliud folio Aconiti nitente* I. BAVHINI 16); *Geranium Batrachioides maximum folio Aconiti nitente* CHABRAEI. 17) *Geranium Batrachioides aliud* I. BAVH. 18); *Geranium Batrachioides minus* PARK. 19) *Geranium Batrachioides folio Aconiti* MORISONI 20); & forte multorum aliorum, de quibus minus certos esse licet. Sed miscet hic C. BAVHINVS. 21) cum stirpe CLVSII exquisitis verbis excludentis coeruleum colorem, varietates flore coeruleo, & coeruleo & albo, sicque suspicionem mouet, haud leuem, ipsum non satis a *Gratia Dei Germanorum* hoc nostrum distinxisse. Quare neque C. BAVHINI neque TOVRNEFORTII 22) neque RVP-PII 23) neque TILLII 24) neque LINNAEI 25) stirpem ad

- (13) Hort. Med. Phil. p. 66.
- .. (14) in Spiz. p. 602. exhibitum pro Gratia Dei, sed foliis pa-
rum diuisis nostro propius.
- .. (15) Icon p. 62. fere ad CLVSIANAM.
- .. (16) III. p. 476. plane ex Clusio, nulla sua obseruatione.
- .. (17) p. 487.
- .. (18) Font. Boll. p. 206.
- .. (19) Theatr. p. 704.
- .. (20) H. Oxon. II. p. 114. ex CLVS. nomine CB.
- .. (21) *Geranium Batrachioides folio Aconiti* Pin.
- .. (22) IRH. eodem nomine.
- .. (23) *Gruinalis pratensis foliis Aconiti Ranunculiue, for. Ienens.*
p. 103.
- .. (24) Hort. Pisan. p. 66.
- .. (25) *Geranium petiolis bifidis, foliis peltatis multifidis, caule*
erecto

ad nostram referre ullo modo possumus, qui omnes eandem tamen CLVSII stirpem suae coniungunt. Tandem & id fateri debemus, nullas nos habere notas satis euidentis, quibus a nostro separemus *Geranium palustre flore sanguineo* DILLENII 26) VOLCAMERI, 27) HOFMANNI, 28) Calyx enim & capsulae glabrae non videntur sufficere, radix, folia & flos & locus natalis conueniunt. Cogimur ergo ab eruditis quaerere, primo, An detur *Geranium Batrachioides folio Aconiti coeruleo flore*, diuersum a *Gratia Dei* quod & a nostro diuersum dici queat; deinde, qua ratione a nostra diuersa sit stirps DILLENII.

§. XV.

In cliuis sterilibus & lapidosis, qui fluuiolo die innesse imminent, & ad arenosa viarum prope acervos lapidum tritorum, qui metallo omni iam priuati sunt, tum *Goslariae* similibus locis, magnus prouentus est *Alfines saxatilis* & *multiflorae capillaceo folio*. Hanc primus,

E 2

sed

erecto, flor. Lap. 266. ponit colorem ordinarium coeruleum, & admittit varietates ex albo, neque minus coniungit suam cum CLVSIANA & RAIANA stirpe.

(26) *Hort. Eltham. p. 160. T. 134. Geranium Geranii haematodes folio & facie C. G. nov. sp. p. 55.*

(27) *Flor. Noric. p. 186.*

(28) *Delic. Sylv. Flor. Altdorf. Reliqua synonyma a nostro non recedunt, uti icon Geranii sanguinaris maioris H. EYSTETT. Cl. Vern. Ord. herb. I. T. IX. f. 2. & aliud GESNERI. CLVSIANVM vero haematodes alterum omnino aliud videtur a Batrachioide altero, Pann. p. 422. & bisser. p. cit.*

sed breuissime, descripsit THALIUS, 1) & dixit *Alfines minoris aliam adhuc speciem*. BARRELERIVS, 2) iconem dedit *Anthyllidis Lychnitis annuae seu minoris angustifoliae flore albo*, quae nostram satis bene exprimit. HERMANNVS 3) *Alfinem glabram tenuissimis foliis floribus albis* vocauit, aliamque dedit iconem. Tertiam PLUKNETIVS, 4) sed minus laudabilem, dixitque *Alfinem caryophylloiden tenuifoliam flore albo punctato*. Quartam MAGNOL 5) sed absque flore, cui est *Alfine Saxatilis Laricis folio minor & minori flore*. Quintam & perfectissimam VAILLANTIVS, 6) *Alfines saxatilis & multiflorae capillaceo folio* nomine, quo & TOVRNEFORTIVS 7) & GARIDELLVS 8) vsi sunt. Alia etiam nomina habent 9) RAIUS, BOCCONE 10) TOVRNEFORTIVS, 11)

- (1) p. II. lin. penult.
- (2) *Stirp. Gall. Hispan. Ital. ic.* 180.
- (3) *Parad. Batav.* p. 12. bene.
- (4) *Almag. Botan.* p. 22. & T. 7. f. 3. inde RAI. III. p. 498.
- (5) *Hort. Reg. Monsp.* p. 11. & ic. eo nomine usus est TOVRN. in IRH. TILL. *hort. Pis.* p. 8. & ipse MAGNOL *Nov. Char.* p. 259.
- (6) *Botan. Paris.* T. II. f. 3.
- (7) IRH.
- (8) *hist. der plant. aut. d' Aix.* p. 24.
- (9) *Alfine pusilla pulchro flore tenuissimo nostrae seu saxifragae caryophylloides pusilla flore albo punctato Hist. plant.* p. 1033. *syn.* III. p. 350.
- (10) *Plant. ex scil.* p. 22. Tab. 12. *Alfine Bononiense non aculeata*, iuxta VAILLANTIVM, verum icon vix agnoscitur, neque nostra planta, etiam senex, aculeata est, neque so-

lia

VS, 11) SCHEVCHZER, 12) DILLENIVS 13). Differt elegans haec plantula ab *Alpine tenuifolia* L. BAVHINI 14) flore maiore, caule magis ramoso, & ramis adeo frequentibus, ut iuniorum foliolorum copia, non foliorum coniugatorum adeo, sed multiplici penicillo congestorum speciem prae se ferat. Ab *Alpine Alpina iuncea* folio C. BAVHINI. siue *Auricula muris tenuissimo folio pulchro flore* IOH. BAVH. 15) flore longe minore, foliis brevipribus minus rigidis & minus congestis. *A Tunica Alpina* BVRSERI 16) toto habitu & caractere, ea enim stirps ad Knawel ad cedit alio loco dicenda.

§. XVI.

Sub *Cellersfelda*, in sylvis quae supra *Goslariam* sunt, & in omni *Hercynia* sylva, frequens est *Filicina* planta, in peculiaribus cauliculis ad propria folia semen ferens

E 3

quam

Ha habent latitudinem qua pinguntur apud AMBROS (quem pungere videtur BOCCONE) nomine *Alpine spinosae minimae montanae* Phytol. p. 17.

11) ex BOCCONE.

12) *Alpine Alpina minima glabra* It. Alp. II. p. 129. quod nomen C. BAVHINVS diversissimae stirpi inposuerat, *Lycnidi* nempe *saxifragae alpinae glabrae pumilae* PLVKNETI.

13) *Spergula Caryophylloides tenuifolia* Catal. Plant. circa Giesf. p. 18.

14) III. p. 364.

15) III. p. 365.

16) in herb. vivo C. BAVHINI, & forte *Caryophyllus saxatilis*, *Polygoni minus foliis & facie, floribus albis, tanquam in umb. illa positis* BURS in *Act. suecic* v7 24. p. 507.

quam *Asplen. sylvestris* nomine primus descripsit & com-
mode depinxit TRAGVS: 1) Eam in his ipsis sylvis in-
uenit THALIVS: 2) & *Struthiopteridem* CORDI vocauit,
atque vix excusabili constantia adseruit a stirpe GESNE-
RI 3) & TRAGI diuersam esse. *Goslariensis* enim planta
cum nostra *Bernae* perquam vulgari in omnibus con-
uenit.

In iisdem sylvis nascitur *Filix Lonchitidis* adfinis,
IOH. BAVHINI, quam pro noua proposuit C. BAVHI-
NVS: 4) cum extra dubium positum sit eandem esse
Filicem feminam asperam GESNERI 5) *Filicem marem ter-
tiam spinosam seu aculeatam* THALI 6) *Filicem spinosam
seu aculeatam* SCHWENKFELDI 7)

Vulgaris in vniuersa hercynia est *Filix* mas non
ramosa petiolis tenuissimis & tenuissime dentatis CASP.
BAUHINI, 8) quam esse *Filicem feminam mollem* GES-
NERI, 9) *Pteridion masculum* CORDI 10) *Filicem marem*
secun-

1) *herbar.* p. 550.

2) *op. p. 21 & 9.*

3) GESNERVS CORDIANAE *Struthiopteridi* iconem & no-
men TRAGIANI *Asplen* iunxerat, CORD. *hisp.* L. II.
c. 179. p. 171, hunc adulat THALIVS & quoddam diuersissi-
mas stirpes iniscuerit notat; sed pro GESNERO descriptiones,
& ipse, locut natalis loquuntur.

4) *Filix aculeata maior* PRODR. p. 171.

5) *hort. app.* p. 292. b.

6) p. 43.

7) *Stirp. Silas.* p. 78.

8) *Cat. plant. circa Bas.* p. 99. & PIN.

9) *Hort. Germ. app.* 292. b.

10) *hisp.* L. II. c. 175. est enim diuersitas non ramosae, quare
nolim

secundam teneriorem & molliorem THALII 11) pene certo affirmamus.

Sed & *Dryopteris sine ramosa minor* & *Filix femina minor Thalii* 12) quae *Pteridion Cordi* 13) *Filix femina minor laeuior candidiorque* GESNERI 14) *Filicula saxatilis parua & elegans CAMERARII* 15) *Filix muraria seu minor SCHWENKFELDI* 16) *Adiantum folio filicis CASE. BAVHINI* 17) hic prouenit. Quae teneritate quadam fragili, diuisione terna, raris, neque pinnatis, sed rutae murariae similioribus lobulis, vltimisque acute incisfis, punctis flauis creberrimis distinguitur.

§. XVII.

In eadem sylua, & in Hercyniae nemoribus, tum circa *Gottingam* frequens est *Lactuca syluestris flore luteo*, quam repetito examinatam, vidimus habere *calycem* tubulatum, qui simplex videri possit, licet ad basim duo paria squamarum adcedentia habeat, *semen* vero latum nigrum compressum, vtriusque acuminatum, quod pappum gerit in *stipite* notabili. Is tamen stipes in iuni-

noliti cum THALIO ad *Adiantum album filicis folio* refertur quae ex genere *ramosarum* est.

(11) p. 43.

(12) p. 43.

(13) L. 11. c. 176. p. 170.

(14) *Hor. Germ. app.* 292. b.

(15) *Hor. Med. & Phil.* p. 60.

(16) p. 78.

(17) *Cat. Basil.* p. 98. & PIN. docente *Herbaris viuo*.

iunioribus stirpibus lactucarum omnium adeo brevis est, ut vix distinguatur. Qua in aetate, cum squamulis ad basin minimis, observata esse videtur Lactuca nostra a Cl. MARTYN, 1) indeque nata occasio nouo creando generi.

Suillus etiam in ea sylua visus est, bulbo crasso purpureo reticulato, Pileo ex ochroleuco subfusco, Poris minutissimis ochroleucis. Substantia & lamellae albae, coeruleum colorem cito induunt quando laeduntur. *An Suillus crassus superne fulvus & levis, inferne luteus pulpa rosea pediculo ex fulvo subrubente & velut reticulato*, MICHELL. 2) Difficile dictu, suilli enim etiam magis quam reliqui fungi colorem per aetates mutant.

§. XVIII.

Circa *Goslariam*, qua ad ad cuniculos montis *Rammelj* iter fecimus, frequens est *Statice*, quam ad pagum *sieber* supra *Herzbergam* denuo vidimus. Elegans etiam *Caryophyllus* ibi nascitur, quem primus descripsit CLVSIVS, *sylvestris septimi* nomine; 1) novam vero descriptionem nouo cum nomine dedit RAIVS, 2) histogiam eius perfecit tandem DILLENIVS. 3) Multi flores

1) *It. Phil. Trans.* n. 407. p. 21.

2) *nov. gen. plant.* p. 129.

1) *Hist. plant. rar.* p. 235.

2) *Caryophyllus minor repens nostrat*, *hist. plant.* p. 938. & *Syn. III.* p. 335.

3) *Hort. Eltham.* p. 402.

rus est. Petala pulchre purpurea sunt, inscripta ad vnguem circulo satore admodum purpureo, ultra quem frequentia puncta alba; Apices subcoerulei. *Caryophyllus humilis flore unico* 4) CASP. BAVHINI caule est erecto vniifloro, nudo, foliis angustissimis ad loricina adcedentibus, flore purpureo puro, radice maxima brachiata, a nostro diuersissimus & heluetiae indigena. Hunc *Goslariensem* magna copia extra *Wernigerodam* vidimus, similibus locis arenosis & iuxta vias publicas. *Vulnerariam flore ochroleuco* hic & circa *Göttingam* aequae vulgarem atque luteam illam. Videtur de *Lagopodio flore albo* 5) TABERNAEMONTANI dubitare IOH. BAVHINVS, 6) quum notet descriptorem ob omisum locum natalem: Sed huc omnino referimus. Cum mucrone vexilli carinae & alarum purpureo, frequentem circa *Thermas Leucenses* vidimus, sed albo penitus flore, quam videtur IOH. BAVHINVS ex *Gottardo M.* habuisse.

§. XIX.

Vitis *Goslariae* venis Vitrioli natiui & metalli misti ex Plumbo, Argento, Cupro & Sulfure, tum vberima minerarum omnis generis collectione SCHLUTERIANA, iis tandem fabricis quibus sulphur ex pyrite excoquitur, *Harzburgum* petiuimus ad pedem Montis
Bru-

4) huic stirpem suam coniungebat RAIVS. l. c.

5) Icon. p. 525.

6) *hist. plant. univ. II. p.*

Brucheri situm, ita tamen vt lenta adcliuitate per montanam planitiem dumetis obsitam, ad verum demum montem sero perueniatur. Ipse Mons, vt quia paludē dictus sit, vlginosus est totus, syluis nudus, circa verticem congestis absque ordine lapidibus, intercepitisque haud modicis foueis molestus. Vertice nudus & lapidosus, vndique libere oculos late per vrbes agrosque errantes dimittit. In eo culmine commodum exstructa est casa, ad nocturna frigora arcenda perquam necessaria iis, qui solius spectaculi gratia montem condescendunt. Altitudo rudi aestimatione, quae *Iurassē* fere, neque recedunt obseruationes Geometricae, est autem ea ad bis mille pedes Rhenanos. Descensus inde rapidus ad *Ilfsenburgum*, quo paucis admodum horis descendendo peruenitur per syluas abiegnas. Stirpes paucissimae Alpinae, sed aliae quaedam nostris inuitae, insolita sua pulchritudine mihi gratissimae fuerunt.

§. XX.

In primis nemoribus prope *Harzburg*, *Anagallis lutea nemorum*, in planioribus hic terrarum rarior, & *Dentaria baccifera* frequens est. Verum ad vias passim procumbit & serpit *Veronica supina Teucrii folio*, foliis suis rarioribus, rotundioribus, & amplioribus, floribus minus conspicuis rubellis ex alis foliorum erumpentibus, ouariis valde latis & compressis, caule humum non relinquente se distinguens a *rotundifolia minori*. Eam COLVMNA pulcherrime depinxit & nomen dedit *Alyssi Dioscoridis montani* 1) cuius Iconem

1) *Erythr. stirp. var.* L. I. c. 121, p. 286. Ex eo plerique alii, inde

in peruetusto codice visam non recedere a stirpe sua ad-
feuerat. Alia icon est RIVINI in posterioribus tantum
exemplaribus 2). Non in Italia solum, sed & in Germa-
nia nasci, diligentia IVNGERMANNI 3) RVPPII 4), DIL-
LENII 5) docuit, in Anglia etiam provenit RAIIO 6) teste.
Heluetia quidem, & *ager Parisinus* ea carent.

§. XXI.

In iisdem humilioribus sylvis non solum *Pyrola folio
mucronato serrato*, in vniversa Hercynia sylua frequens,
F 2 sed

inde enim nata *Chamaedry spuria* adfuit rotundifolia
scutellata C. BAVHINI. *Alyssum montanum* COL. PARKINS.
p. 590. *Veronica rotundifolia scutellata aut biseutata bederae*
folio H. OXON. II. p. 321. PLVKN. *Almag. Bot.* p. 334. *Veronica*
supina Teucrii folio ELEM. BOT. MAGNOL. H. R. M.
p. 203. LRH.

- 2) *Veronica procumbens. Monop. Irreg.*
- 3) nulla enim alia stirps ab eius excessu in Germania visa est,
cui conueniat nomen *Chamaedryos bederaceae* sine *Teucrii*
pratensis bederacis foliis HOFM. ex IVNGERMANNO.
Quare neque *Chamaedryos spuria bederacea sine Scutellata*
repens C. B. & RAII *hist. plant.* p. 847. vera & distincta
planta erit.
- 4) nomine TOVRNEF. *flor. Jeneus.* p. 197. habet & GE-
MEINH. *fl. Laub.* p. 41.
- 5) eodem nomine *Cat. plant. circa Gieff.* p. 92.
- 6) cui est *Chamaedryos spuria foliis pediculis longis insidentibus*
Cat. stirp. Angl. p. 64. *hist. plant.* p. 250. cum descriptio-
ne aucta: In *Syn.* vero II. & III. p. 281. *Veronica Chamae-*
dryoides foliis pediculis oblongis insidentibus.

sed pulchra etiam species illa *scapo unifloro* satis copiose nascitur, in sylvis supra *Wernigeroda* denuo visa, sed in Patria mea rarissima. Primus eam depinxit CLVSIVS cui *Pyrola minima* 1) est. Altera Icon est BESLERI 2). Tertia RIVINI 3), omnes satis bonae; ultima etiam stamina habet, sed diuersa ratione ab ea quam proposuit LINNAEVS 4). Habet enim RIVINVS 1. 2. 2. 3. 2. LINNEVS 1. 2. 3. 1. 3. Observationes meae pro LINNAEO faciunt, sed in iis minutis procul dubio aliquid sibi permittit Natura. Hoc vero difformitatis genus in floribus rarissimum est, nisi staminum numerus a numero segmentorum floris differat, ut in octostemonibus.

§. XXII.

Paulo altius in Montis *Winterberg* sylvis primum visa *Trientalis* CORDI, nunquam nos deseruit in toto monte *Brutero* gratissima comes, in Heluetia, Gallia, Italia, nunquam visa, & citra quinquagesimum gradum nullibi pronens. Descriptio LINNAEI omnino conuenit. *Caulis* simplex, ligulas foliaceas exiguas primum, in vertice vero maiores, tandemque in vera folia auctas producit, folia vero ad nouem usque numeravi. *Petiolos* unifloros & simplices & binos frequenter vidi. *Flos* plerumque sepremidus, ut raro aberrat, *calyce* septifido purpureo, *petalo* rotato plano exterius sub purpureo

1) *Passon.* p. 508. *hist. plant. rar.* p. cxviii.

2) *Hist. Eyst. Class. Verit. Ord.* XI. T. 12. f. 2.

3) *Penn. et. Irreg.* T. ult. *Pyrola flore singulari.*

4) *Fl. r. Lapm.* 157.

pureo intus lacteo. *Stamina septem aureis apicibus, globosis. Tuba simplex vnica. Elegancia stirpis facit, vt synonymorum historiam addere visum sit. Brevissima descriptio est inuentoris CORDI 1), a quo Herba Trientalis dicta est; bona & vberior THALII 2) tertia SCHWENKFELDI 3). CASPARVS BAVHINVS pro noua proposuit, *Pyrolam Alfine flore Europaeam* 4) dixit, & pro more suo fecit maiorem & minorem, maiorisque dedit iconem bonam, primamque. Sed folia & vniuersus habitus *Psyllii minoris* quod idem BAVHINVS depingit 5), ita se habent, vt capitula squamosa descriptionis, & fructus mori figura in iconem, non persuaserint LINNAEO, aliam esse stirpem a nostra *Trientali*. Frater IOH. BAVHINVS Cordi nomen retinuit 6). CHARRAEVS indigna similia, *Herbam Trientalem pyrolae speciem secundum quosdam* 7) vocauit. PARKINSONVS pro *Pyrola Europaea Alfine flore* 8) figuram nimis feratam dedit, ipsissimam vero *Casparis BAVHINI* iconem quae *Trientalem* exprimit pro *Pyrola brasiliiana Alfine flore maiori & minori* 9) Nomen CASPARIS BAVHINI*

F 3

reti-

- 1) *Sylv. obseruat.* p. 222. 2.
- 2) *Αλωανθημων* p. 15.
- 3) *Stirp. Silf.* p. 17.
- 4) *Prod.* p. 100.
- 5) *ib.* p. 59.
- 6) *Hist. Univ. plant.* III. p. 506.
- 7) p. 501.
- 8) *Théatr. Bot.* p. 509.
- 9) p. 510.

retinuit LOESELIVS 10) MORISON 11) RAI 12) & SV-
THERLAND 13). MERRETVS 14) *Pyrolam Alpinæ folio
minore* dixit, OELHAVEN *Alsinanthemon* 15), AMBRO-
SIVS *alsinanthemon vel alsinanthemon* 16). BARKELE-
RIVS *Pyrolam longo folio flore albo singulari* 17). PLVK-
NETVS *Pyrolæ affinem alsinanthemon nostram alpinam* 18).
RVPPIVS 19), qui primus Characterem dedit, *Trientalem*
CORDI & RIVINI. Idem nomen retinuit ERNDL 20)
BVXBAVM 21) SIEGESBECK 22). *Trientalem* demum
GEMEINHART 23) WALTHER 24) & LINNAEVS 25)
KRAMERI *Tentamen* nondum vidi. MOEHRINGIVS,
alsinan-

10) *Flor. Pruss.* p. 211.

11) *H. Oxon.* III. p. 505.

12) *Cat. stirp. Angl.* p. 245. *Hist. plant.* p. 1101, ubi *florem*
facit pentapetalum.

13) *Hort. Edim.* p. 281.

14) *Pin. rer. Brit.* p. 99.

15) *Catal. plant. circa Dant.* p. 3.

16) *Physiolog.* p. 35.

17) *Icon. plant. in Gall. Ital. Hist.* 1156. *Icon* propria non op-
tima.

18) *Almag. Bot.* p. 309.

19) *flor. Jemens.* p. 15. In Characteris floris segmenta & stami-
na omisit, fructum in tres carinas dicit dehiscere.

20) *Virid. Warsaw.* p. 122.

21) *Plant. circa Hal.* p. 333.

22) *Primis. flor. Petrop.* p. 106.

23) *plant. circa Laub.* p. 11.

24) *design. plant. hort. sud.* p. III.

25) *flor. Lapon.* 139.

26) *hort. priv.* p. 8. & 111.

alpinantemi nomine Characterem nuperrime dedit, segmenta floris incerto numero recenset.

§. XXIII.

In eadem sylva frequens est *Solidaginis* species, summis Botanicis, RAI0, TOVRNEFORTIO & VAILLAN-
TIO non cognita, licet omnino peculiaris sit. Flores
habet *solidaginis saracenicae*, *semisfoculis* raris & omni
charactere simillimos: Caulis & nascendi modus idem:
Folia differunt, serrata equidem, sed adeolatoria ut lon-
gitudinis latitudinis vix sit fesquitertia, molliora, & sub-
lanuginosa: In *solidagine* vero *saracenica*, folia habent
longitudinem latitudinis quintuplicem, dura praeterea
& glaberrima: Quare tota facies magis ad *Jacobaeam*
Pannonicam III. CLVSII accedit, a qua vero flore &
defectu aurium sub foliis, & folio minus rotundo ma-
nifesto differt. Videtur omnino inter *THALIANAS*
consolidae species esse, forte *Consolida saracenica* alia 1),
in qua tamen proportionem latitudinis nimiam facit.
Deinde *Consolida saracenica* maior LVGD. 2) ut pro
rudi icone satis nostram refert; Melior tamen est icon
Virgae Aureae siue *solidaginis latifoliae serratae* I. BAV-
HINI 3), quam CHABRAEVS 4) repetiit. Huc referre-
mus

1) p. 27.

2) *Hist. gener.* p. 1271. Flores dicit senecioni affines. Flores
tamen radiati indicant non esse *senecionem montium Avey-*
nise, dictum CHOMELIO.

3) *Hist. plant.* II. p. 1063.

4) p. 333. mutato nomine. *Virga aurea Solidago saracenica*
dicta latifolia serrata.

mus *Solida cinem sarracenicam dictam latifoliam ferratam* LOESELII 5) nisi destitui lanugine moneret. An sit *Virga aurea altera solidago saracenica* MORIS. PRAE-
LVD. 6) folia minus spillo, non satis liquet: *Virgae aureae montanae latifoliae hirsutae* H. R. P. & SCHÖL. BOTAN 8), sola nomina habemus. PLVKNETIVS 9) iconem & nostrae & LVGDVNENSIVM stirpi similem dedit, cum nomine IOH. BAVHINI. An *Iacobaea Alpina latifolia foliis longioribus ferratis* PONTEDER 10). Omnino videtur esse *Iacobaea nemorensis latiore rigidioris & hirsuto folio* RVPPII 11), BVXBVMI 12) ERNDTE-
LII 13), sub nomine IOH. BAVHINI & LISCHWIZIO 14), relata ad *Iacobaeas*. Verum similitudo nominum fecit, vt MORISONVS 15) & RAIVS 16) stirpem peculiarem I. BAVHINI miscerent cum vulgatissima *Virga aurea latifolia ferrata* fratris CASPARI diuersissima 17) certe & flores

5) *for. Pruss.* p. 186.

6) p. 323. probabile videtur. In *Historia* non habet.

8) p. 20. repetit MORISON *Hist. Oxon.* III. p. 124.

9) p. 390. T. 235. f. 1.

10) *Compend. Tab. Botan.* p. 140. non recedit.

11) *for. Jenens.* p. 142.

12) *Enum. plant. circa Hal.* p. 144.

13) *Virid. Warf.* p. 62. pluculas plantas rariores ex RVPPIO repetit, vt fungos suos ad verbum ex HOFMANNI *Delictis glaucis* descripsit.

14) *Diff. de Virg. Auris* p. 27.

15) *Hist. Oxon.* III. p. 124.

16) *Hist. plant.* p. 279. cum signo stirpem sibi non perspectam fuisse.

17) Cl. etiam LISCHWIZ stirpes LOBELII, & PARKINSONI,

flores gerente in spicas, quae a *Virga aurea latifolia* exterorum non ferrata, aut penitus non differt aut solis crenis: nobis enim nunquam tota absque crenis prouenit. Neque TOVRNEFORTIVS 18) neque VAILLANTIVS 19) errorem correxerunt. Iungenda fuerat apud VAILLANTIVM *Solidagini Saracenicae*, simillima sed diuersa species.

§. XXIV.

Cum ea nascitur *Virga aurea Broccenbergenfis* THALII 1), varietas humilior minus ferrata durior & glabra Virgae aureae vulgaris, qualem iconem elegantem dedit CAMERARIUS 2), & quae a BOCCONE 3) pro noua stirpe depicta est. *Acetosamontana maxima* 4) in iisdem syluis prouenit, speciosa varietas vulgaris *Acetosae*; iuxta LINNAEVM 5). Id monendum, reti-

SONI, veras Virgae Aureae varietates, ad suam veram Iacobaeam refert.

13) Qui stirpes fratrum coniungit secutus MORISONVM, p. 484.

19) nullam mentionem facit plantae IOH. BAVHINI.

1) p. 129.

2) EPIT. MATTH. p. 748.

3) *Virga aurea Alpina laurula rigidioribus foliis* Mus. de Plante p. 33. T. XVI. Inde IHR. BAL. *Hist.* vol. III. p. 167. VAILLANTIVS equidem peculiarem facit *Mém. de l'Acad.* 1710. p. 396. Sed repugnat stirps simillima iconi, toties in *Alpibus & Jura* villa, diuersitate notabili, sed per gradus decrefcente.

4) CB: *Oxalis maior Broccenbergenfis* THALII. p. 82.

5) *Fler. Lap.* 130.

retinere eam in hortis suam proceritatem neque unquam ad statutam pratensis speciei redire, vti in amoenissimis hortis Ill. HVGONIS vidi *Hanouerae*.

§. XXV.

Ingressi paludem, vix superabilem nisi per aggerem ligno stratum, quae accolis vocatur *Hunerbruch*, inmensam vim vidi *Linagrostidis alpinæ* vnica spica caulem terminante. Est ea absque controuersia *Gramen iuncum lanigerum* THALII 1) inuentoris, indicante id loco natali. *Iuncus Alpinus capitulo lanuginoso* C. BAVHINI in *Prodr.* 2) atque THEATRO. 3) qui & ipse ex Hercynia sylua habuit, *Iuncus capitulo lanuginoso siue Schoenolaguros* PIN. AMBROSINI 4) SCHEVCHZERI 5). *Iuncus alpinus cum cauda Leporina* IOH. BAVHINI 6), RAI 7) PLVKNETI 8), SCHEVCHZERI maioris, *Gramen Iuncoides alterum lanatum* Danicum PARKINS. 9) MORISONI 10). *Iuncus alpinus*
bom-

1) p. 75. *HERVAB. NOT.*

2) p. 23. cum iconc.

3) *Theatr.* p. 187. 188.

4) *Phytolog.* p. 303.

5) in *Agratogr.* p. 302. & ic. opt. Tab. VII.

6) l. p. 514.

7) *hist. Plant.* p. 1306. *Car. Angl.* p. 192. *Syn.* III. 436. minorem speciem non habet.

8) p. 200. *Almagest.*

9) coniungit Rai. & icon conuenit, *Theatr.* p. 1271.

10) *H. exon.* p. 224.

bombycinus PARKINS 11). (non vero C.B.) 12) *Linagrostis sylvatica spica simplici* RVPP. 13) *Linagrostis spica singulari alopecuroides* VAILLANTII 14). *Linagrostis Alpina maior capitulo singulari minori* MICHELI 15) Ab hac specie *Linagrostidis*, differt habitu humiliori, foliis paucis brevibus, spica aut aequae magna aut maiori, vaginis rarioribus, cespiti minori *Gramen tomentosum Alpinum* & minus CASP. BAVHINI 16) MORISONI 17) *Gramen tomentosum alpinum minus* PARK. 18) *Iuncus alpinus capitulo tomentoso maiori* SCHEVCHZERI 19) minoris, *Linagrostis alpina media capitulo singulari maiori*, MICHELI 20). Eam nos in M. Gorbardo, Scheidek & alibi in Alpibus lectam, ita comparuimus cum *Hercynica*, ut aliquanto latiora folia & culmum & spicam Alpina haberet, *Hercynica* haec omnia longiora. Id an a solo natali pendeat non dixerim. Vnam certe speciem fecit SCHEVCHZERS 21) maior,

11) certo *Theatr.* p. 1272.

12) quae rarissima stirps est summarum alpium, vid. SCHEVCHZ. *Agrostogr.* Tab. iam cit.

13) *Flor. Jenens.* p. 260.

14) *Bot. Paris.* p. 117.

15) *nov. gen.* p. 54.

16) *Theatr.* p. 60. ex Alpibus *Rhaetic.* & *Valis.*

17) *H. oxon.* III. p. 224.

18) *Theatr.* p. 1272.

19) *Agrostogr.* p. 304. & icon. T. VII.

20) l. c.

21) *Iuncus* enim Alpino cum cauda *Leporina* *Istin.* Alp. I. p. 41. quae maior species est, & humili quem addit in alpibus nasci, quae minor species est, nomina distincta non inponit.

ior, vnam LINNAEVS 22) nixus praeterea specimine BVRSERIANO sibi viso. Nos iuncos C. BAVHINI non vidimus.

§. XXVI.

Tota haec palus fit cespitibus ex *Sphagni* 1) duabus speciebus factis, cuius ideo meminimus, peruulgati equidem, quod ea ipsa capitula quae polline plena offendimus in *M. Bruëtéro*, offendamus descripta a THALIO 2) depicta vero a DODONAEO 3) & LOBELIO 4) Angustifolii iconem hucusque nullibi vidi, est autem diuersum omnino, & faciem suam diuersam in eodem loco natali seruans. Capitula, vti totus habitus minor est, minora, simillima tamen gerit.

§. XXVII.

Ad fluuioli *die Ecker* lapidosum litus, passimque in scrobibus summi etiam montis, prouenit *Ranunculus albo flore* 1), in Alpibus omnibus, sed in humiliorum earum

22) cui est *Eriophorum spica erecta caule tereti* Fl. Lap. 23.

1) *palustris candicans* &c. DILL. CG. 229. & *Synopf.* III. 104. nro. 1. & 2.

2) In *Broockenbergi iugo candida musci species . . . capitulum continens pusillum, cymbali versus superiora patens figura, coloris spadicea*, p. 78.

3) *Muscus palustris* Pempt. p. 472.

4) *Muscus terrestris vulgaris* eodem loc. Icon. II. p. 112.

1) *Ranunculus maximus Leucanthemum sive Aconitiformis* THAL. p. 101.

earum fede, & in *Jurasso* frequens, qui folio quinquelobato amplo splendente, caule alto brachiato, sapore non acri, floris demum colore satis se distinguit. Primus eum descripsit C. GESNERVS 2) MATTHIOLI 3) enim icon eo referri solita *Anemonoidi montano polyantho* longe est similior: deinde DODONAEVS 4) & alii longo ordine. Magna est apud me auctoritas ingenui & diligentissimi viri CAROLI CLVSII. Sed vix tamen possum a me obtinere, post tot per alpes itinera, vt credam diuersum esse a nostro *Ranunculum montanum* IIII. 5) in *Pannon.* & *Historia* descriptum. Facies enim, flos, sapor ipse, locus notatus conueniunt. humilior habitus, flos minor, praecocior eruptio in florem possunt a causis exterioribus profecta esse.

§. XXVIII.

Ad eundem riuum frequens nascitur, *Myrrhis Broccenbergensis* THALII 1) & *VOLCAMERI* 2) *Myrrhis montana* SCHWENKFELDI 3) *Meum Silesiacum* forte

G 3

- 2) *M. frast. deser.* p. 65. nomine albi maioris. In *Tabulis Colless.* vocat *Ranunculum syluestrem album Fidentisbe*, in *hortis Germaniae*, *Ranunculum montanum tertium Fidentisbe Arentii* p. 275. a., in *append. Ranunculum album maiorem soliti Platani fere syluestrem fore simplicis* p. 295. b.
- 3) *Ranunculus* IIII. p. 613.
- 4) *Ranunculus albus externorum* IIII. *bisf. plant. Coronar.* p. 288. ic. p. 286. *quintus Pempt.* III. LIV. c. 3. p. 430. ic. p. 429.
- 5) *Pannon.* p. 369. 370. *bisf. Plant. var.* p. 236.
- 1) p. 77.
- 2) *For. Noric.* p. 296.
- 3) *Stirp. Siles.* p. 142.

CAMERARI 4) : *Myrrhis palustris bereynica* IVNGER-
MANNI, HOFMANNI 5), RAI 6) THALIANAM stir-
pem neque C. BAVHINVS 7) neque FRATER 8), neque
RAIVS 9) notam habuit. Est vero certissime, cum omni-
bus Synonymis modo dictis, *Myrrhis palustris latifolia*
alba & rubra IRH. 10). Ad quam pertinere alibi dixi, *Seseli*
montanum, cicutae folio subhirfutum C. BAVHINI 11):
Cuius nomen repetiit, RAIVS 12) & MORISONVS 13),
plantam neuter cognitam habuit. De eo vero & ex her-
bario viuo, & ex itinere in locum natalem facto mihi
constat. An huc pertineat *Cicuta sylvestris maioribus*
quam vulgaris foliis CORDI 14) id ex paucissimis vocibus
definiri non potest. Id addendum, semina longa
bicorni Tuba sua insignia, striis conspicuis non notari;
sicque

4) hort. p. 101.

5) Flor. Altd. delit. sylv.

6) Hist. Plant. III. p. 257. & catal. stirp. ext. 1694. p. 185.

7) qui in Pinace recenset sub titulo *Myrrhis Brockenbergensis*
quid?

8) cui est *Myrrhis Brockenbergensis foliis Myrrhidis Italicae flore*
albo radice crassa nigra III. p. 78.

9) Hist. 431. cum Asterisco.

10) cuius pulchram iconem RIVINVS dedit nomine *Myrrhidis*
palustris.

11) Prodr. Theatr. p. 85. Cat. plant. circa Bas. p. 49. Pin.

12) Catal. plant. ext. 1694. p. 236. [Obiter obseruo *Müntens*
Wasserfall ibi dici vicinum *Scaphusiae*. Sed longe abest, *Basilea*
vix duobus miliaribus Germanicis distans.] Hist. plant.
p. 452. cum signo dubii.

13) Hist. Oxon. III. p. 286.

14) Sylv. obseru. p. 222. b.

sicque recte stirpem nostram ad *Chaerophylla* relatum esse ab optimo BOERHAAVIO 15) qui nuper rebus mortalibus creptus, omnibus veri bonique amantibus perpetuum sui desiderium reliquit: vir ex hominum memoria ingenii magnitudine, animi vero modestia & benignitate nemini secundus.

§. XXIX.

Speciosa *Sonchi species*, *coeruleus latifolius* 1), flore spicato, in ipsis crepidinibus eiusdem rivi frequens est, denuo visus nobis ad littora fluvioli *die kalte bode*, prope villam venatoriam *das Elend*. Eum THALIVS 2) etiam albo flore vidit.

§. XXX.

Inde ascendimus ipsum montem qua parte propria magis voce *der Broken* vocatur. *Bryum* ibi vidi & quod icon eius non exstet, sculpi curavi 1). Eius caules valde ramosi, erecti tamen neque ad *Hypni* speciem repentes; folia latiuscula non adeo acuta, nervo medio valde conspicuo, seriatim & imbricatum caulem contegunt,

15) *Chaerophyllum latifolium palustre flore albo & rubro*. Ind. alt. p. 70.

1) I. B. II. p. 1004, cuius pulchra icon, mutuo accepta a FRA-TRE, sculpta prostat apud CAMERARIUM *Epit. Math.* p. 230.

2) *Inrybus πλατυφύλλος βεργινica* p. 62.

1) fig. 2.

rigunt, atque in speciem ex terete polygonam ambiunt; adulta nigricant. *Setae* ex caulis longitudine, bulbis rarius conspicuis adscendunt, rectae & saepe aristarum instar intortae, viciales, raro ex summa stirpe prodeuntes. *Capitulum* erectum crassum ouatum fuscum, *calyptra* in acutissimam acumeducta. Retuli ad *Bryum hypnoides erectum montanum, erectis capitulis acutis* DILLENII 2). Ad ligna putrida frequens ibi proventus est *Lichenis*, qui modo simplex, modo prolifer coccineis fungosis verrucis ornatur. Eum non rarum certe, ideo nomino quia THALIVS 3) longe primus eum descripsit. Quid sentiendum de fungosis istis excrecentiis, an morbus aut exuberantis succi vicium? suadet figura irregularis, proventus in siccis & moribundis lichenibus, analogia Agaricorum. Repugnat constantia horum scutorum in eo. Lichenum genere, quod ramis arbusculas exprimit.

§. XXXI.

In eadem via, quae fluuiolum sinistriorem diu obseruat, *Polyporum* cespitosum ligno haerentem decerpimus. Tota substantia dura coriacea filamentosa fuit. Figura infundibuli, intus pilis in concentricos circulos dispositis fulvis pubescebat, externa facies albida & glabra, poris frequentibus distincta, quos efficiebant breuissimae & vix percipiendae laminae. *Polyporum* dicimus, ob adfinitatem & naturam ficiorem, tubuli
vero

2) Rat. Synopf. III. p. 94. nro. 12.

3) Lichen circa Andersbergam, p. 73.

vero Spillum faciunt, licet duplicem substantiam non habuerit. Non abfimiliserat Polyporo exiguo Alpino suluo infundibuliformi pediculo breviori) MICHELI.

§. XXXII.

Passim ibi *Osmunda lunato folio* proueniebat, & *Lichen terrestris folio Eryngii* BVKBVM¹⁾, cuius synonymia recenset MICHELI²⁾. Verum ante omnes scriptores, quos excitat, CORDVS³⁾ ipse hunc Lichenem viderat, dixeratque *Muscum crispae Lactucae similem*. CAMERARIUS⁴⁾ etiam iconem eius qualemcunque exhibuerat. Querit de eo LINNAEVS⁵⁾, quomodo possit in cibum recipi, cum SIBBALDO⁶⁾ & BORRICHIO⁷⁾ teste alium vehementer ducat. Respondet BORRICHIVS⁸⁾, & ROBINSON⁹⁾, vere primo purgare, reliqua aestate exsiccatum in farinam fieri edulem,

1) nov. gen. plant. p. 130. T. 70. f. 10.

2) Centur. plant. II. p. 11. T. VI. f. 1.

3) p. 83. T. 44. f. 4. qui & scuta vidit, oppido rara, & quae offedere nunquam mihi datum est.

4) Sylv. observ. p. 221. 2.

5) EPIT. p. 783. ic. 2.

6) Flor. Lapon. 445.

7) cui est *Muscus in Islandia purgans*. Prodr. hist. natur. Scot. p. 39.

8) Hist. Hafniens. A. 1671. p. 126.

9) ibid.

10) apud RAIUM. Hist. p. 114. cui est *Muscus Islandicus* EARTHOLINI.

dulem : exspirante forte ea quam semper in eo percepi summa amaritudine. Neque obstat, quod purgans cum sit, egregium vulnerarium & conglutinans dicatur a BREYNO 10), Gratiola enim, validum vrique Catharticum, pro summo vulnerario a rusticis nostris habetur.

§. XXXIII.

Plurimum ad terram ibi provenit *Lycopodium caule erecto spica glabra terminato* eximii LINNAEI 1) cuius inuentor videtur AGERIVS 2), mistum vulgari *Lycopodio*. Visi etiam *Idaeae* plura genera frequentia nascuntur per paludosa prata montis, proprie magis BRVCTERI nomen gerentis. Inuenimus ibi *Vitem Idaeam foliis oblongis crenatis fructu nigricante*. Deinde *Vitem Idaeam foliis subrotundis non crenatis baccis rubris*, ad quam aliquae observationes videntur addendae esse. Namque TRAGVM huius inuentorem fecit CASP. BAVHINVS, qui tamen in *Myrtillo exiguo* 3), non huius sed manifeste admodum *vulgaris fructu nigro* descriptionem dedit, cum iconē minus bona. Inde etiam factum est, ut sub titulo *Myrtilli exigui* AMBROSINVS 4) & TITA 5) no-

stram

10) *Muscum pulchrum terrestrem sanguineum* dicitur in E.N. C. Der. l. ann. III. Obs. 289. cum iconē non mala.

1) *Flor. Lapon.* 419.

2) apud I. BAVHINVM p. 767. sub *Musco terrestri foliis retro reflexis*.

3) p. 974.

4) *Phytolog.* p. 368.

5) *Hort. Maurocen.* p. 125.

speciem retulit CASP. BAVHINVS. Inuentor TRAGVS est, deinde du CHOVL 3) eius meminit, descriptionem & iconem primam dedit CLVSIVS 4). Baccæ nigrae sunt, iis inebriandi vim tribuit RVPIVS 5) quæ in vulgi sermonibus receptam de *Myrtillis* M. Bructeri, ad *Empetri* baccas refert THALIVS 6). In patria mea in vsus humanos non recipiuntur.

§. XXXV.

Paludes amat etiam *Oxycoccus*, sed humiliores, cum *Myrtillus grandis* in summas Alpes ascendat 1). Eum CORDVS 2) primus proposuit & nomine donauit. Prima icon est C. GESNERI 3), elegans. Flos manifeste monopetalos, sed in quatuor portiones profundissime secedens 4); antherae non cornutae. Baccæ cum saccharo edules apud Batauos 5), nobis in mensis ignotae 6).

Ad

- 3) *humilis frutex cuius baccæ Airelles, deser. Pilat. apud GESNER. fract. p. 74.*
- 4) *Vitis Idæa* II. Pannon. p. 77. 80. *Hist. rar. p. 61.*
- 5) *Vaccinium altissimum foliis subrotundis exalbidis flor. len. p. 39. post CAMERARIUM in hort. p. 128.*
- 6) p. 41.
- 1) in ipso *Gemmis* vertice & *Gothardo* visus.
- 2) *Oxycoccus Hist. plant. L. II. c. 63. cum bona descriptione.*
- 3) *ibid.*
- 4) quod recte obseruat eximius LINNAEVS. *flor. Lap. 145.*
- 5) *Dodon. Pempt. vi. L. II. c. 9. p. 770. Vaccinia palustris.*
- 6) uti neque apud Suecos & Lapones edules habentur LINN.

§. XXXVI.

Adfinis Vitibus Idacis est *Andromeda*, foliis contractis ad margines, vt superficiem pronam eleuatae orae ambiant. Prouenit propius iam verticem BRVCTERI in paludosis pascuis, amoeno spectaculo, recentibus germinibus corallinis, petiolis pendulis vna cum flore pulchrè purpurascens. Hanc omnino primus proposuit THALIVS, *Myrtumque tenuifoliam* dixit 1) IOH. BAVHINVS descriptionem & Iconem dedit, & dixit *Vitis Idaeae affinem polifoliam montanam* 2) quod nomen non corrumpit CHABRAEVS 3), vt saepe quidem solet. Est porro *Rosmarinum sylvestre nostras* PARKINSONI 4). *Vitis Idaea Rosmarini folio auersa parte candido & nervoso* LOESELII 5). *Erica foliis roris marini flore amplo* VESLINGII 6). *Erica alpestris roris marini incano folio flore purpureo* TITAE 7). *Rosmarinum sylvestre* MERRETI 8), *Erica roris marini folio* RAII 9), *Erica humilis Rosmarini folio Vnedonis flore capsula cistoides* PLVKNET 10). *Erica palustris flore purpurascens, pendulo, petiolo*

H 3

1) p. 78.

2) *Hist. Univ.* Vol. I. l. V. p. 525.

3) p. 41.

4) *Teatr.* p. 76.5) *Flor. Pruss.* p. 289.6) *Cat. plant. Patav.* apud TITAM.7) *Hort. Mauracen.* p. 68. omnino videtur. In *Itinere* vocat *Ericam alpinam palustrem Rosmarini folio flore purpureo.*8) *Pin. rer. Britan.* p. 106.9) *Hist. plant.* II. p. 1439.10) *Almag. Bot.* p. 136. T. 175. f. 1.

tiolo longo rubro rosmarini folio RVDBEK 11) *Ledum* palustre nostras arbuti flore RAI 12). *Poliifolia* BVX-BAVM 13) *Ledoides rosmarini* foliis rigidis superne laete viridibus inferne albis floribus dilute rubentibus SIEGESBECK 14), *Ericoides* flore rubro siue purpureo HEIST. 15) *Andromeda* foliis alternis lanceolatis margine reflexis LINNAEI 16). Flos *Ericae* figuram habet; Staminum proportio, fructus & numerus segmentorum floris *Chamaerhododendri* est. CAMERARII *Vitis Idaea* *Bavarica* baccis rubris insipidis huc non, videtur pertinere: vid. RAI ad eum titulum.

§. XXXVII.

Tandem & *Empetrum* versus verticem montis frequens nascitur, staminibus nunc onustum, & florens. Hoc a MATTHIOLO 1) primum descriptum, in *Brutero M.* inuenit AEMILIUS 2), deinde THALIVS 3) atque baccas inebriare atque deliria gignere monuit, quod quidem neque BORRICHIVS 4) neque LINNAEVS 5) admittunt.

Super-

- 11) *Catal. stirp. ex Lapon. in Afl. suecic.* 1720. p. 97.
- 12) *Syn. III.* p. 472.
- 13) *Afl. Petropol.* vol. II. p. 345.
- 14) *Primis. flor. Petrop.* p. 63.
- 15) *Catal. Hort. ann.* 1731. nonnate LINNAEO, synonyma enim desunt.
- 16) *Flor. Lapon.* 163. cum icona rami T. r. f. 2.
- 1) p. 154.
- 2) qui *Cerin Brockenbergicam* dixit apud THALIVM.
- 3) *Erica baccifera* Mattb. p. 41.
- 4) *Afl. Hafniens.* 1673. p. 161.
- 5) *Flor. Lapon.* 305. an THALIVS popularem famam, a *Myr-*

§. XXXIX.

Superatis dumetis quae vertici proxima sunt, & in ipso culmine montis, magna vis *Pulsatillae albae* provenit, plane similis illi quae in *Iurasso* & *Alpibus* frequens nascitur, flore albo, ad petalorum ortum exterius coeruleo colore tincto, foliis myrrhidis minute divisis. Est tamen in vniuersum habitus minus villosus & flos ipse minor. Inuentor CORDVS 1) est, icon prima CLVSII 2). *Pulsatilla Apii folio vernalis flore minore* SCHEVCHZERI 3) sub alieno nomine est eadem nostra, ut ex descriptione adparet.

§. XXXX.

Lapidibus in culmine copiose irrepit, *Bryum hypnoides capitulis plurimis erectum lanuginosum* DILLENII 1) foliis ex latiusculo ortu in pilum crispum eductis, capitulis exiguis ornatis in setis brevibus erectis per caulibus longitudinem frequenter provenientibus. Huc aliqui *Muscum montanum* TABERNAEM. 2) ex leui coniectura. An *Muscus capillaceus densissimus lanuginosus albouiridis apicibus niveis* SCHEVCHZERI 3)? non liquet, & fere malle

tullo *grandis* per errorem transiit in *Empetri* baccas? videtur.

1) *Ranunculi XI. species* hist. L. II. c. I. p. 121. b.

2) *Aucumne folio-frit II.* Hist. p. 244. cum icone, & *Aucumne montana pulsatillae folio* PANN. p. 382. descr.

3) *It. Alp.* IV. p. 339.

1) *Synops. Rel.* III. p. 97.

2) p. 802.

3) *It.* VII. p. 56.

mallem referre ad *Sphagni* 4) speciem. An *Muscus ericetorum hirsutiae canescens* & *ramosus* RVPPH 5)? non repugnat.

§. XLI.

Cum *Pulsatilla* vberime prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso*: cui *Radix* vix obsequens, lignosa, *Caulis* dodrantalis, aphyllus nonnisi ligulas quasdam graciles & sparsas paucasque adnatas habet. *Folia* cum flauedine virentia longos albos pilos educunt, longa, gracilia, ambitu alias integro, alias vagis dentibus sinuato. Ex villosissimo calyce nigro, cuius lanugo alba est, *Flos* flauus, petalis quinquedentatis. Inuentor THALIVS 1) est, qui *Hieracii minoris* speciem Brocckenbergo peculiarem vocauit. Iconem primam dedit COLVMA, cui est *Hieracium pumilum II.* Fr. Gregor 2). Ex eo prouenit *Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso* CB. 3) VAILL. 4) *Hieracium alpinum pumilum lanuginosum* 5) PARK. *Pilosella monoclonos non repens Alpina minor lanuginosa amplo flore* 6) MORISONI. *Hiera-*

4) quod in *syn. Rai.* quantum est p. 105.

5) *flor. tenens.* p. 292.

1) p. 17.

2) *Ephorat.* II. p. 29. *ic.* p. 30. exiguum specimen.

3) Pin.

4) *Memoir. de l'Acad.* 1719. p. 239. cum synonymo alieno PLVKNETI.

5) p. 799.

6) *H. Oxon.* III. p. 78. S. VII. T. 7. f. 5. ex COLVMA.

Hieracium alpinum pumilum II. RAI 7). *Dens Leonis* *Alpinus minimus pilosellae folio* TOVRNEFORTII 8) an & SCHEVCHZERI 9) *Hieracium alpinum angustifolium villosum* 10) SCHEVCHZ. ; *Hieracium alpestre pilosum angustis longioribus foliis flore pallente* TITAE 11) pro noua planta exhibitum. *Hieracium villosum alpinum flore magno singulari caule nudo* RAI 12) *Hieracium caule unisfolio & unisfuro calyce villosa* LINNAEI 13).

Ab hoc, caule folioso & foliis omnibus dentatis diuersum est, caeteroquin simillimum, *Hieracium alpinum folio acuto, molli, lanuginoso, dentato* BVRSEI 14) *Hieracium forte alpinum lanuginosum longifolium leuiter dentatum* VAILLANTII 15).

Huic denuo ita adfines est, vt proximum sit, aliud quod ab eo, quod in Bructero prouenit, foliis latioribus ad ipsum etiam ramosum caulem frequentibus, latiusculis, sinuatis & obtusis; a stirpe, quam BVRSEI tribuimus, foliis latis non dentatis differt, simillimum villo foliorum & calycis, ipsoque flore. Ea est *Hieracium*

7) *bijl. Plant.* p. 241. cum asterisco.

8) *bijl. des plant. ant. de Paris* p. 54. & IRH.

9) *It. IV.* p. 333. absque descriptione; verum cum nostra stirps in eodem itinere alio cum nomine recensatur, haec potius *Pilosella* videtur magis incana summarum *Alpium*.

10) in eodem *Itin. IV.* p. 336. certo.

11) *Itin. post bort. Mauroc.* omnino videtur.

12) *Syn. III. T. VI. f. 2*, bene nisi aliquid in habitu desideres.

13) *far. Lep.* 281.

14) *Afl. Suecic* 1714. p. 502. Ex Gemmo M.

15) *Memoir. l. c.* p. 241. cum synonymo I. BAVIUM, quod ad vicinam plantam statim dicendam pertinet.

cium alpinum hirsuto folio CLVSII in Pann. 16) alpinum
V. villosum in histor. 17) *Hieracium V. Pannonicum*
 CAMERAR. 18) *Hieracium alpinum hirsuto folio V.*
 CLVSII quodammodo incantum IOH. BAVHINI 19) exscri-
 ptum ex CLVSIO, & denuo *Pilosella* siue *Pulmonaria lutea*
angustiori folio valde pilosa duplex 20) eiusdem cum pro-
 pria descriptione & icone stirpis ex Montibus Geneuen-
 sibus petita, ubi & ipsi eam legimus. Priorem CHA-
 BAVEVS *Hieracium alpinum hirsuto folio flore hieracii lu-*
teo 21) vocat, in alterius nomine vocem *duplex* 22) solam
 omittit, idque nomen post CHABRAEVM MORISON 23)
 & RAIVS 24) retinuit. RAIVS alibi 25) *Philosellam* siue
pulmonariam luteam angustiori folio valde pilosam alteram
dixit. EXCLVSIANA demum stirpe natum est, *Hiera-*
cium alpinum latifolium villosum magno flore C. BAVHI-
 NI 26) PARKINSONI 27) MORISONI 28) HERMANNI 29)

RAI

- 16) p. 643. icon v. p. 646.
- 17) p. CXLI.
- 18) *Hort. Med.* p. 75.
- 19) Il. p. 1027. ipsum non vidisse stirpem CLVSII adparet.
- 20) Varietas nempe in foliis imis, quorum pediculus modo lon-
 gior modo breuior est, etiam nobis obseruata.
- 21) p. 310.
- 22) p. 325.
- 23) *H. exot.* III. p. 31.
- 24) *Hist. Plant.* p. 140.
- 25) *Catal. stirp. exter.* p. 204.
- 26) PIN.
- 27) *Theatr. Botan.* p. 359.
- 28) *H. exot.* III. p. 70.
- 29) H. L. B. 115, *Flor. Bat.* p. 11.

RAII 30) MAGNOLII 31) TOVRNEFORTII 32) TITAE 33)
SCHEVCHZERI 34) PONTEDERAE. 35) *Hieracium V.*
villosum Clusii MÜNTINGII 36) *Hieracium alpinum* la-
tiore folio pilosum flore maiore PLVKNETI 37) cum pro-
pria & bona Icone. A montano tomentoso 38) diuerfis-
simum est. Quae omnia quando collata sunt, adparet
tres stirpes modo descriptas, conuenire longo villo foli-
li, & calycis, huiusque nigredine, colore demum folii
fluido, & mollitie, magnitudine & colore floris: Ita ta-
men, ut primum caulem pene aphyllon, folia ad radicem
longiora & angustiora habeat: Duo reliqua caulem fo-
liosum & folia latiora. Et eorum prius quidem ser-
rata, alterum, quod simul ramosius, multiflorum & re-
liquis amplius est, integra. Secundum a primo vix satis
differt, a tertio euidenter, quod & a primo certis-
sime diuersum est. Primum in *Bructero* & *Gotthardo M.*
alterum in *Gotthardo*, tertium in omnibus culminibus *In-*
rassi & alpinis lectum est.

I 2

Circa

- 30) *Catal. stirp. ext. p. 114. hist. plant. p. 239.* cum nota qua
plantas sibi incognitas distinguit.
31) *H. R. M. p. 58.*
32) *I. R. H.*
33) *hort. Maurocen. p. 89.*
34) *St. Alp. l. p. 39.* bona descriptio.
35) *Dissert. p. 91.*
36) *waare oeffening van de Plant. p. 454.*
37) *Almag. p. 184. & T. 194. f. 2.* bona ic.
38) VAILLANTIVS hoc admiscet, breui suo tomento & toto habi-
tu distinctum, atque pulcherrime depictum in *Hort. Eltham*
ic. 181. Verum neque Icon *Hieracii latifolii pilosi coccinei*
umbellati Indici PLVKNET. T. 194. f. 4. villo modo stirpi
nostrae responderet.

§. XLII.

Circa casam in vertice Bructeri M. exstructam, stirpem denuo vidi, quam in Alpiniis pratis M. Scheidek & Nennenen olim inueneram, & ex Bohemiae montibus miserat amicissimus HAENELIVS Schneebergensium Medicus. Eam cum pro noua tunc haberem descripsi 1); sed cum aliqua festinatione. Quare nunc, & synonyma & descriptionem meliorem visum est addere. *Radix* ex multis teretibus fibris, absque conspicuo carpo in inum caulem coeuntibus. *Scapus* a dodrantali ad cubitalem, *folia* ad terram pluscula, lata, & obtusiora quam in plerisque Orchidibus, si *palmatam flore viridi* exceperis, ad caulem angustiora acutiora. *Spica* florum mediocriter densa, interiectis, vti in *Palmatis* fieri solet, foliolis paulo longioribus quam ouarium. *Ouarium* contortum de more, duarum linearum longitudine. *Flor* ex albo herbaceus dimidia parte longior. *Galeae* foliola quinque, quorum alia tria ex albo pallentia magis conspicua sunt, duo minora lutea ex virore. *Barba* 2) trifida, simplex recta protensa, segmento medio maiori. *Calcar* 3) inflatum conicum vnius lineae longitudine. *Cucullus* flaminum nihil peculiare habet. *Apices* lutei. Odore destituitur. Primus hanc stirpem proposuit LOESELIVS 4) deinde in montibus helueticis lectam SHERARDVS 5), cum BOBARTO communicauit, & BO-

- 1) *Orchidem palmatam alpinam spica densa alboutridi* vocauit, *Com. Lit. Phys. Techn. Med.* 1733. p. 20.
- 2) MICH. l. c. B.
- 3) ib. C.
- 4) cui est *Orchis palmata palmis inuersis flore albo*. *Flor. Pruss.* p. 182.
- 5) qui in *cat. inserto Catal. stirp. exterk. Rati.* 1794. vocat *Orchidem Palmatam montanam latifoliam fluitibus in spica densa albis tantillo lutei admixto* p. 400.

BOBARTVS 6) quidem cum *Orcbide pusilla alba odorata radice palmata* Angliæ indigena eandem fecit. PLVKNETVS 7) & RAIVS 8) videntur distinguere. Quam litem suam non fecit CHOMELIVS, neque nos definire possumus. CHOMELIVS pro noua planta descripsit, & ob radicis fibras in carpum non connascentes, *Limodoris* ad censuit, repugnante omni habitu, dixitque *Limodorum montanum flore albo dilute virescente* 9). MICHELIVS nouam iconem dedit, & nomen fecit *Pseudorchis alpina flore herbaceo* 10). Quamquam, ut verum fatear, radicis dignitas tanta esse non videatur, ut stirpem omni fabrica simillimam Palmatis, ab iis auellas. An etiam *Orcbis palmata thyrso specioso longo dense stipato ex viridi albente* RICHARDSONII 11)? non satis liquet. An *Orcbis flore albo minimo* MERRETI 12)?

§. XLIII.

In ferobibus ad verticem, *Polygonatum tenuifolium* COR-
DI 1) vidimus, quod quare *matus & minus* fecerit THA-
LIVS 2), non video. In decliui vero parte montis, quæ
pagum *Ilfsenburg* spectat, vnicam stirpem *Mri*. Neque præ-
terea aliquid singulare obuenit, ea die qua per *Ilfsenburgum*
pagum metallis celebrem, *Wernigerodam* petiuimus.

§. XLIV.

A *Wernigeroda* ad *Specum Baumannianam* iter facientibus
aliquoties visus est pilosus in *Hieracio murorum* *philosissimo*

I 3

tamor,

- 6) cui est *Orcbis palmata pusilla alba odorata* H. Oxen. III. p. 499.
- 7) *Almagest.* p. 271.
- 8) *Cet. stirp. angl.* p. 217. *Hist. plant.* p. 1225. *Syn. III.* p. 381.
- 9) *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1705. p. 517. ex *Aruerniæ* mon-
tibus.
- 10) *nov. gener. plant.* p. 30. & T. 26.
- 11) apud RAIUM *Synops.* III. p. 382.
- 12) *Pin. rer. Brit.* p. 86.
- 1) *Hist. L. L. c.* 86. p. 113.
- 2) p. 85.

tumor, qui fuluo crine, modo adfidens radici, modo angulis caulium, aliquam & rudem imaginem muscoli sedentis exhibet. In sylvis Brocomagi visus fuerat morbus ille elegans a TRAGO, dictus etiam 1) CHEMNIZIO 2) & RVPIO. 3) HEVCHERVS vero, vt nouum nomen ob eum tumorem faceret *Hieracio myophoro* 4) non admodum erant necesse. STOBÆVS 5) etiam, & LINNÆVS 6) eius meminerunt. In pratis, sub iisdem syluis, copiose provenit *Filipendula*. In supercilio *specus Baumannianae* ubique, *Geranium sanguineum maximo flore*, raro inter *Gerania* exemplo monanthos, cuius iconem non bonam CLVSIVS 7), optimam dedit BESLERVS 8).

§. XLV.

Plures omnino, pulchrasque stirpes alit Hercynia sylua, quod ex THALIO satis adparet, & certius persuasit nobis fasciculus plantarum indigenarum Hercyniae missus ab illustri Viro Aug. Iob. HVGONE Archiatro Britannico. Sed plures hoc in itinere non vidimus, obstabant praeter tempestatem pluuiam aliae quaedam difficultates. Alterius aetatis labor, vt speramus felicius erit. Comites autem nostri Itineris fuerunt *Fridericus Ludovicus Christianus CROPP*, qui hanc Dissertationem defendit, *Iohannes Christophorus Ludovicus SEIP*, celeberrimi medici Pyrmontani IOHANNIS PHILIPPI filius, *Carolus Philippus GESNER*, J. M. F. *Iohannes Arnoldus Iulius RICHERS*, Hoyensis, *Ioachimus FVRSEN Holsatus*, *Iohannes Henricus HOFMEISTER Hildesienfis*, *Fridericus Ludovicus ENGELSTAETTER* Dresdensis, omnes Medicinae Cultores. Iter exeunte Iunio perfecimus.

1) p. 77.

2) *Catal. plant. circa Braunov.* p. 43, cum propria iconē in *Appendice* n. 7.

3) *Flor. Ienens.* p. 163.

4) *Nov. prov.*

hort. Med. Wittēb. 1713. p. 74, cum iconē.

5) *Alt. Suevic. ann.*

1733. p. 415.

6) *Flor. Lapon.* 1759.

7) *Geranium haematoideum Pannoni.*

p. 419. *hiflor.* Cl. XII. Eadem iconē vsus est LOB. ic. 460.

8) *H. E. T. T. Parn. Ord. L. T. XVI. L. 1.*

THESES BOTANICAE.

I.

Methodus naturalis, coniungit stirpes ex maiori numero conuenientium characterum, licet unus vel alter manifesto differant; Afarum & Aristolochiam, Rutam, Moschatellinam & Hypopityn.

II.

Distinguit stirpes pluribus characteribus diuersas, etsi vnus vel alter manifesto conueniat, Veronicam a Pinguicula, Verbalcum a Digitali, Saxifragiam ab Umbelliferis.

III.

Methodus artificialis, coniungit plantas pluribus notis diuersas & vnica conuenientes: Veronicam & Salicem, Moschatellinam & Solanum, Valerianam & Echium.

IV.

Methodus artificialis, distinguit stirpes pluribus notis conuenientes, diuersas vnica, Echium separat. ab Asperifoliis, Saponariam & Caryophyllum a Lychnide, Ascyron ab Hyperico.

V.

An noua methodus petenda a proportionibus Staminum ad Tubas & ad petala, horumque ad calycem proportionem? Medetur malis quibusdam a numero ortis, sed manet artificialis, separat Alfinem mediam a reliquis, Myosotides a se inuicem &c.

THESES CHIRURGICAE.

VI.

Sectio calculi Raviaria vix vnquam aperit Vesicam ipsam.

VII.

Sed fit continuatio Sectionis adparatu magno, ita vt haec anterior sit & a Vesica remotior, Raviaria posterior & ipsos ceruicis terminos aperiat.

VIII.

Manet tamen eius praestantia, quod adtinet instrumentorum Iter facile, & minus incontinentiae atque lacerationis periculum.

IX.

Adparatus altus alias succedit, alias minime, nullo vitio Chirurgi, neque facile est distinguere quando felix futura sit operatio quando minime.

X.

Adparatus paruus a RAVIANO parum differt, & vix nisi quod directe admittat incisionem, Raviarius oblique.

XI.

THESES ANATOMICAE.

XI.

Vena alla Cordis perpetua a sinu dextro in ostium Mediae, recipiens saepe innominatas.

XII.

Vena anterior Cordis rarissima, sed visa est tamen inserta in coniunctione auris dextrae cum Vena Caua superiori.

XIII.

Visus est vere in homine ductus a BARTHOLINO descriptus, neque infrequens est.

XIV.

Incisivus ductus, in recente cadavere patulum est infundibulum fetam transmittens.

XV.

Vasa lymphatica a Ventriculo amplissima pene omnium, ad receptaculum abeunt.

THESES PHYSIOLOGICAE.

XVI.

Quid sit in systemate spirituum, de spiritu qui musculum in motum egit? An refuit ad cerebrum? minime, fieret sensus: an abit in venas? cur non prius?

XVII.

Per eadem vasa & transpirari & nutrirī necesse est.

XVIII.

Fit ergo vera transpiratio per Vasa generis minimi

XIX.

Diaphragma stringit Oesophagum utique, & relaxatur in vomitu.

XX.

Vomitus fit vel sola convulsione ventriculi, vel adcedente convulsione musculorum abdominalium.

⊙ (o) ⊙





248405

468



